

Thy 4.
96 m

40

<36626441720017 S

<36626441720017

Bayer. Staatsbibliothek

Die
ENTWICKELUNG
der
PFLANZENSUBSTANZ
physiologisch, chemisch und mathematisch dargestellt
mit
combinatorischen Tafeln der möglichen Pflanzenstoffe und den Gesetzen
ihrer stöchiometrischen Zusammensetzung.

Königlichen Preussischen Herausgegeben

von

Dr. Christian Gottfried Nees von Esenbeck,

ordentlichem Professor der Botanik auf der Königlich Preussischen Rheinuniversität
zu Bonn, Präsidenten der Kaiserlich Leopoldinisch - Carolinischen Akademie
der Naturforscher u. s. w.

Dr. Carl Gustav Bischof,

Professor auf der Königlich Preussischen Rheinuniversität zu Bonn, Adjuncten des
Präsidii der Kaiserlich Leopoldinisch - Carolinischen Akademie der
Naturforscher u. s. w.

Dr. Heinrich August Rothe,

ordentlichem Professor der Mathematik auf der Königlich Baierischen Universität zu
Erlangen, Mitglieder der Kaiserlich Leopoldinisch - Carolinischen Akademie
der Naturforscher u. s. w.


E r l a n g e n

bei J. J. Palm und Ernst Enke.

1819.

432.3

Die
ENTWICKELUNG
PFLANZENBESTANDS



physiologisch, chemisch und mathematisch dargestellt
mit
combinatorischen Tafeln der möglichen Pflanzenstoffe und den Gesetzen
ihrer stöchiometrischen Zusammensetzung.

Herausgegeben
von
Dr. Christian Gottfried Nees von Esenbeck,
ordentlichem Professor der Botanik auf der Königlich Preussischen Rheinischen Universität
zu Bonn, Präsidenten der Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinischen Akademie
der Naturforscher u. s. w.
Dr. Carl Gustav Bischof,
Professor auf der Königlich Preussischen Rheinischen Universität zu Bonn, Adjuncten des
Präsidenten der Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der
Naturforscher u. s. w.
Dr. Heinrich August Rothe,
ordentlichem Professor der Mathematik auf der Königlich Preussischen Rheinischen Universität zu
Erlangen, Mitgliede der Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinischen Akademie
der Naturforscher u. s. w.

Erlangen
bei J. J. Palm und Ernst Knecht
1819.

ENTWICKELUNG DER PFLANZEN SUBSTANZ

physiologisch, chemisch und mathematisch dargestellt

Sr. Excellenz

dem

dem

Ew. Excellenz haben Ihren Wunsch, die nachstehenden

Königlichen Preussischen Herrn Staatsminister, Ritter des rothen
Adlerordens erster Classe etc. etc.

Freiherrn von Stein zum Altenstein.

mit der Verpflichtung, einer solchen Günst zu entsprechen,
zugleich den Muth und die Liebe zu dieser Arbeit haben.

Darum wagen wir es, Ihnen diese Blätter als ein
Zeichen der Ehrfurcht, des Dankes und der reinen Hül-
figung zu weihen und dabei zu bekennen, dass, wenn
einiges Gute darin geschrieben steht, dieses kommt zu Ew.
Excellenz, als der wahren Quelle, wovon es unsere in
der Verehrung Ihrer hohen Verdienste um die Wissen-
schaft, vereinten Herzen geschöpft haben; zurückfließt.

St. Excellenz

dem

Freiherrn von Stein zum Alenstein

Ew. Excellenz haben diesen Versuch, die noch immer dunkle Lehre von den chemischen Mischungsverhältnissen der Pflanzenkörper durch unsere einträchtigen Studien zu fördern, schon im Entstehen einer huldvollen Aufmerksamkeit und Begünstigung gewürdigt, und dadurch in uns, mit der Verpflichtung, einer solchen Gunst zu entsprechen, zugleich den Muth und die Liebe zu dieser Arbeit belebt.

Darum wagen wir es, Ihnen diese Blätter als ein Zeichen der Ehrfurcht, des Danks und der reinsten Huldigung zu weihen und dabei zu bekennen, dass, wenn einiges Gute darin geschrieben steht, dieses hiemit zu Ew. Excellenz, als der wahren Quelle, woraus es unsere in der Verehrung Ihrer hohen Verdienste um die Wissenschaft vereinten Herzen geschöpft haben, zurückkehrt,

nicht als unser Verdienst, sondern als das Werk eines
höheren gesegneten Einflusses, der die Gemüther zu
einem Ziel hinlenkt und wohlthätig zusammenhält.

Mögen Ew. Excellenz uns diese Kühnheit ver-
zeihen und den Mängeln unserer Schrift Nachsicht ange-
deihen lassen!

Wir verharren in tiefster und schuldigster Verehrung

Ew. Excellenz

Bonn und Erlangen

den 20. April 1819.

unterthänigste

Dr. C. G. Nees von Esenbeck,

Dr. C. G. Bischof,

Dr. H. A. Rothe.

Die bisherigen chemischen Analysen der Pflanzenkörper scheinen bloß darum zu keinen klaren und entschiedenen Resultaten geführt zu haben, weil die Chemiker in der Behandlung vegetabilischer Körper unbedingt von dem Leben abstrahiren zu müssen glaubten. Es ist aber das Leben in Bezug auf die Materie eben so gut chemischer Art, als die sogenannte todte oder relativ äussere Natur, und seine Producte unterscheiden sich von den unorganischen lediglich dadurch, daß sie in dem *Abgeleiteten* als *ursprünglich* erscheinen, statt daß jene das abgeleitete Daseyn nur ins Ganze fortleiten, ohne je, von ihrer eigenthümlichen Stufe aus, anders als vermittelt mit den Grundelementen zusammenzuhängen. Es war daher eine natürliche Folge jener Ertödtung des Lebens für die chemische Ansicht, daß alle Gesetzlichkeit, die seit *Richter* durch die bekannten stöchiometrischen Gesetze in der chemischen Betrachtung der unorganischen Natur Platz zu greifen anfang, alsbald aufhörte, wenn von Producten chemischer Zerlegung organischer Körper die Rede war; daher selbst der treffliche *Berzelius* in seinen *Experiments to determine the definite Proportions, in which the Elements of organic Nature are combined*, den Satz aufstellen mußte, daß zwar ein jeder organische Körper in jeder Salzbasis, mit der er eine Verbindung eingeht, eine bestimmte und unveränderliche Menge Sauerstoff voraussetze — (chemische Beziehung zur Aussenwelt), allein daß nicht nothwendig in einer organisch chemischen Verbindung einer der Bestandtheile als Einheit auftreten müsse — (chemische Befreiung von der Aussenwelt, organische Innenwelt). Diese Einsicht, die vom chemischen Standpuncte aus einen tiefen Blick in das Wesen der organischen Mischung zu er-

öffnen scheint, indem sie zugleich den chemischen Gegensatz des Unorganischen und Organischen auf einen deutlichen Begriff zurückführt, dürfte, wenn sie weiter verfolgt wird, die Chemiker auf ihrem Wege eben dahin leiten, wohin die Verfasser eine vom vegetabilischen (polaren) Leben und seinen nächsten Producten ausgehende Untersuchung geleitet hat: nämlich auf die *combinatorische Zusammenstellung der innerhalb des Gebiets der Vegetation gesetzlich möglichen chemischen Verbindungen*. Wir geben unsere Untersuchungen so, wie sie sich von der ersten Anregung an stufenweise in uns entwickelten, theils um den Gang derselben durch die Individualität der Darstellung anschaulicher zu machen, theils und vorzüglich aber, um jede Seite dieser Betrachtung *vollständiger und gründlicher ausführen zu können*, als dieses möglich gewesen seyn würde, wenn wir unsere Arbeit zu einem gleichförmigen Ganzen durch *eine* schreibende Hand zu verschmelzen gesucht hätten. Wie diese Correspondenz hier steht, erscheint jeder Theil als ein für sich ungenügender Versuch des Einzelnen, ein Ganzes der Erkenntniß zu erstreben, und nur vollständig *durch* dieses Streben; jeder getragen und weiter geführt durch das Eingreifen verwandter Wissenschaft in einem Verein von Freunden, die ihr Leben diesen Wissenschaften einträchtig und theilnehmend gewidmet haben, — als das Ziel aber, eine Reihe practischer Arbeiten, die in ihrer fast unermesslichen Begrenztheit mehr als *ein* Menschenleben planmäfsig erfüllen und den Geist bei jedem Schritt zum Ziel durch die voraneilende Idee zugleich ermuntern und befriedigen kann.

S p e c u l a t i o n.

Magnalia naturae fere extra vias tritas et orbitas notas jacent.

Baco de Verulamio.

Specimen

Algebrae naturalis sive arithmeticae elementa

Baro de Fermat.

Nees v. Esenbeck an Bischof.

Ich bin in meiner Bearbeitung der Pflanzenphysiologie an der Lehre von der chemischen Grundmischung der Pflanzen angelangt, und so viel auch über diesen Punct vorgearbeitet zu seyn scheint: so muß ich doch fürchten, hier auf dem Grund sitzen zu bleiben, wenn ich nicht durch die Vermittlung der verwandten Wissenschaft befreit werden kann.

Lassen Sie mich also eine Frage an Sie richten, gestützt auf *die* Ansicht des Universitätslebens, daß es eine Vereinigung, (nicht aber eine Vereinzelung,) der Wissenschaften in tüchtigen Repräsentanten zur Einheit eines geistigen Staats sey, wo jeder die Noth und den Mangel in sich treuherzig und treu dem Andern vertraut und an seinem Reichtum ergänzt. Ich nenne dieses *academisch* arbeiten und setze jede Universität in dieser Hinsicht als Akademie, da sie die Bedingungen zur Erreichung academischer Zwecke, besonders für die Naturwissenschaften, reichlich in sich trägt. Und nun zur Sache. — Die Pflanze ist mir ein *dreikörperiger Organismus*, d. h. ein solcher, in welchem sich von den beiden Lebenspolen nur *einer* in relative Gegensätze organisch aufschließt, während der andere, stets in (relativer) Verslossenheit befangen, der Nothwendigkeit des irdischen Lebens heimgegeben bleibt.

Erst im Thier schließt sich auch dieser zweite Pol des Lebens organisch auf, — das Thier wird viergliedrig und bewegt sich.

Der *gebundene, verschlossene Pol* der Pflanze, gleichsam derjenige, der sein volles Gewicht ewig an sich trägt und folglich keine Kraft mehr darüber hinaus verbreiten kann, ist die *Wurzel*, die *unterirdische Pflanze*.

Der *aufgeschlossene Pol* ist die *oberirdische Pflanze*, die sich alsbald in Längsgebilde und Flächengebilde auflöst und so fortschreitet, bis sich die *zeitliche*, successive Spaltung der Breitefunction in den Blättern auf die *zeitlose* oder *gleichzeitige* der Blütenbildung, (Kelch, Blumenkrone und Nebenkrone), reducirt.

Nun ist die Längentendenz in der Fläche erloschen und das Wachsthum ergreift die dritte Dimension, — die Substanz selbst entfaltet sich zum *Geschlecht*.

Die Substanz der Pflanze aber ist *derselbe* Organismus, den wir äusserlich sich aufblättern und aufblühen sehen, *innerlich* angeschaut. Einen innerlichen Organismus nennen wir *Structur* und *Textur*. Die Structur der Pflanze ist ebenfalls dreikörperig, mit einem *aufgeschlossenen* und einem *verschlossenen* Pol.

Hier folge ich *Kiesern*. *) —

Der verschlossene Körper heisst *Holz*, den aufgeschlossenen nenne ich *Mark*, gemäß der einen Idee der Polarität, nach welcher jeder Pol das Minimum seines Gegenpols mit dem Maximum seiner eigenen Qualität ins Gleichgewicht setzt.

Der Character des Holzes ist durch das Spiralgefäßsystem ausgedrückt, das gestreckte Zellen mit sich verbindet: — diese sind gleich *Stengel*, jene gleich *Blatt*. Das Mark ist der Körper des *Zellsystems*, und wo das Zellsystem herrscht, ist *Mark*.

Das Zellsystem herrscht aber

a) in der Rinde,

b) in dem eigentlichen Mark.


Der Markkörper ist also in ein Aeusseres und in ein Inneres *gespalten* (entfaltet), und der Holzkörper liegt, als Indifferenzpunct, in der Mitte. Darum sage ich: die innre und die äufsre Pflanze entfalten sich *polar*, d. h., der Holzkörper, in dem das Blatt, das äusserlich Geschiedene, herrscht, ist hier das Verschlossene, ein —, und das Mark, der Zellenkörper, als das Ursprüngliche und Erste des Pflanzenlebens, das sich wie die Wurzel zur oberirdischen Pflanze, wie Stengel zu Blatt, verhält, ist das Aufge-

*) Mémoire sur l'organisation des Plantes etc. Harlem 1814. 4. — Elemente der Phytonomie. 1. Th. Jena 1815. 8.

schlossene, das +. Da, wo ein concentrischer Schnitt den ersten Ring von Spiralgefäßbündeln durchschneidet*), einen Theil gestreckter Zellen nach aussen wirft, und den inneren, größeren Abschnitt des Cylinders zu Holz steigert, liegt die Lösung des Geheimnisses, wie das *relativ* Innere absolut doch ein Aeusseres seyn könne; denn ungeachtet die Richtung der concentrischen Schichtung so läuft

Wie sich in den drei centralen Gebilden der Blüthe, — Nectarium, Staubfäden und Pistillen, —
— Mark, Holz, Rinde +

so ist doch, wenn wir das Holz nach seinen beiden Elementen nehmen und die Spaltung durch das Gefäßbündel führen, das reine Holz, absolut betrachtet, ein Aeusseres, wie es sich auch durch die jährliche Scheidung der Rinde, bei dem Aufsteigen des Safts an der Grenze des Bildungsheerdes aller fixen Pflanzensubstanz aus dem Cambium, lebendig bewährt:



Also auch der Markkörper umschließt einen Gegensatz, der sich verhält wie Stengel zu Wurzel, — nämlich den von Bast, und Rinden- und Markzellen. Der Bast ist gleich *Stengel*, die Zellsubstanz gleich *Wurzel*. Die Geschlechtstheile der Blüthe sind die Entfaltung dieser drei Körper.

Das *Nectarium* ist *Rinde*, (eigentlich Bast;)
die *Staubfäden* sind *Holz*, (Spiralgefäßbündel;)
die *Stempel* sind *Mark*.

*) *Kieser* Elemente der Phytonomie 1. S. 205. Tab. V. fig. 49. I. i.

Ihnen brauche ich hier nicht zu sagen, daß ich dieses in *organischem* Sinn nehme, so also, daß sich in jedem organischen Gebilde *alle* Systeme, nur auf den Stufen der Zerfällung mit immer größerem Ueberwiegen des einen oder des andern, finden.

Linné hat, was ich hier ausspreche, schon deutlich vor Augen gehabt, aber zu materiell aufgefaßt.

Wie sich in den drei centralen Gebilden der Blüthe, — Nectarien, Staubfäden und Pistillen, — die drei inneren Körper des Pflanzenleibs *äussern*, (exseriren): so zerlegt jedes derselben wieder in sich den Körper in seine Systeme; das *Nectarium* den *Rindenkörper* in *Bast* und *Rinde*, (Drüsen und Drüsenstützen), der *Staubfaden* den *Holzkörper* in *gestreckte Zellen* und *Spiralgefäße*, (Träger und Anthere), der *Stempel* das *Mark* in *Markring* und *Markzellen*, (Fruchtknoten mit Wurzel (Narbe), Stengel (Griffel) und Blatt (Germen), und Ovula).

Endlich scheidet der Gipfel eines jeden dieser Gebilde in sich die, 'seiner Stelle im Ganzen gemäß polarisirte, unreine Pflanzensubstanz selbst zu Tag, — das *Nectarium*, als *Honig*, — der *Staubfaden*, als *Pollenmasse* (Pollenin), — der *Stempel*, als Keimflüssigkeit des Eychens.

Wo aber die drei Urpolaritäten des Pflanzenkörpers rein und *gleichzeitig* gegeben sind, — da ist die Pflanze selbst *ursprünglich* gegeben, d. h., sie fängt von Grund aus zu leben an.

Dieser Grund ist die Erde, — der Embryo, — der Saame, als *Wurzel*.

So gut oder schlecht nun auch das bisher Vorgetragene zusammenhängen mag: so werden Sie doch bald bemerkt haben, daß es hierbei noch nicht still stehen könne, sondern daß nun erst folgende Fragen beantwortet, und noch eine schwere Aufgabe gelöst werden müsse.

Die *erste Frage* lautet so:

Ist die Substanz jeder (versteht sich, jeder individuellen) Pflanze wirklich zu setzen als *eine* und für das Leben derselben Pflanze *untheilbare*, nur durch das Leben selbst polarisch *geschiedene*, —

oder ist die Pflanzensubstanz *ursprünglich verschieden*, different, und eben dadurch Grund der Differenz des Pflanzenbaus?

Wäre das Erstere erwiesen, so folgte dann die *zweite Frage*: Wie verhält sich diese postulirte Pflanzensubstanz zu den Elementen der unorganischen Natur, wie sie uns die Chemie darstellt?

Die *Aufgabe* aber, die sich zuletzt angeschlossen, wäre: darzulegen, wie sich die durch den Lebensact der Pflanze polarisirte, — d. h., modificirte und unter allen innerhalb der Möglichkeit dieser Schranke liegenden Bestimmungen gesetzte — Pflanzensubstanz chemisch gestalte zu *besonderen pflanzlichen Substanzen*, und wie sich diese sodann verhalten

- a) zu den Urtypen des Pflanzenlebens,
- b) zu den chemischen Grundtypen der äussern, sogenannten unorganischen Natur.

Die erste Frage kann nur aus der *Idee des Organismus* erwiesen und in der Erfahrung aufgedeckt werden.

Organisch heisst, was sich, als ein Abgegrenztes, innerhalb dieser Grenze gegen das Ganze erhält. Sein eigentlicher Character besteht in der *Grenze*, — dass diese nämlich ein *Besonderes* umgrenze, nicht, dass blofs das Abgesonderte irgendwo *aufhöre*, wär's auch noch so regelmäfsig, wie z. B. der Krystall, der immer nur ein *freies*, herausragendes, abgesondertes Stück in höchster Vollendung darstellt.

Was sich so absondert, dass es sich zu dem, wovon es sich absondert, wie Inneres zu Aeusserem verhält, nimmt gegen dieses den Character der *Substanz* an, und das Aeussere erscheint gegen dasselbe als das Reich der *Accidenzen*.

Die organischen Wesen sind also zu betrachten als die *reine Darstellung der Substanz der accidentellen Welt*, daher wir ihnen auch Gesetzmäfsigkeit, d. h. Nothwendigkeit, — dieser (der Aussenwelt) aber (relative) Zufälligkeit zuzuschreiben gewohnt sind.

Sind aber die organischen Wesen nur die Darstellung der Substanz

der Welt, die Entäusserung ihres Innern, oder die Erinnerung (Bekehrung) ihres Aeussern: so verhalten sie sich zu ihrer Aussenwelt, der *Qualität* nach, gleich und nur der *Quantität* nach verschieden, d. h. polar, und müssen, da jeder Pol einem *mathematischen Punct* gleich zu achten ist, als eine *absolute Einheit* betrachtet werden. Jeder Organismus reducirt also die gesonderten Elemente der Natur *in sich* auf eine *relative Einheit*, und diese ist *seine Substanz*.

Er ist aber, der *Qualität* nach, seiner Aussenwelt gleich. Die Differenz seiner Substanz, als einer besonderen, z. B. *dieser* Pflanzenspecies, *dieses* Thiers, oder noch allgemeiner ausgedrückt, der *Pflanze*, des *Thiers* überhaupt, kann also nur in quantitativen, d. i., polaren Verhältnissen gesucht werden.

Polare Gegensätze finden aber nur statt *in* der Einheit und *durch dieselbe*, nämlich durch den *Indifferenzpunct*, auf den sie sich beziehen.

Die Substanz jedes Organismus besteht also und ist nur *als Eine*, obgleich sie die Vielheit aller Substanzen der Aussenwelt aus sich, ihrem Grundcharacter gemäß, herstellt. — So reducirt die Pflanze ihre Nahrung auf den einfachen Pflanzensaft, —

das Thier, die Nahrung auf den homogenen Chylus, und wir sind bei der *zweiten Frage* angelangt:

Wie verhält sich die organische (Pflanzen-) Substanz zu den bekannten, chemischen Elementen ihrer Aussenwelt?

Ich habe keck das Wort »Nahrung« ausgesprochen, als verstünde sich's von selbst. Es versteht sich aber nicht ganz von selbst, bevor man näher zusieht und bedenkt, daß der Organismus, von dem wir sprechen, ein *besonderer* in dem *Besonderen*, z. B. der Erde, — und daß alles Besondere in *zeitlicher* Existenz lebe und sey.

Der besondere Organismus erscheint sonach als ein *zeitliches Setzen* der *besonderen Aussenwelt* als *Substanz*. In ihm wird die Aussenwelt successiv Substanz, sie *erinnert* sich. — Die Aussenwelt wird Substanz heisst; sie wird *in einen Organismus* gesetzt.

Sehen wir das von der Seite des Organismus selbst an: so sagen wir: der Organismus setzt Aeusseres *in sich*, d. h., er *nimmt Nahrung ein*.

Treiben nach Nahrung ist die *erste Lebensäusserung*.

Der Begriff der Ernährung ist also ganz gleichbedeutend mit dem eines besonderen (endlichen) Organismus.

In welcher Form aber wird das Aeussere *in* den Organismus kommen?

Das Aeussere ist gesetzt als Accidenz, d. i. als *Vielheit*, — das Innere als Substanz, als *Einheit*.

Ideal angeschaut, ist also der Uebergang der Aussenwelt in den Organismus vermittelt durch das, was den Uebergang der Vielheit in die Einheit vermittelt.

Dieses Vermittelnde ist die Indifferenz des Gegensatzes, = o.

Nun ist aber die *Besonderheit*, als solche, *rein* betrachtet, *Qualität*.

Das Nahrungsmittel geht also in den Organismus nur über, indem es seine bestimmte Qualität *verliert* und o. Qualität annimmt, die aber, da diese o. Indifferenz ist, zugleich die unendliche Möglichkeit jeder Differenzirung (Qualitätsbestimmung) in sich trägt.

Mit andern Worten: Das Nahrungsmittel löst sich, um in den Organismus *einzu*gehen, (nicht blofs *ingerirt*, sondern wirklich *asfiliert* zu werden,) auf in die Urelemente der Aussenwelt, und diese erlöschen, dem Charakter der Organisationsstufe, die sie aufnimmt, gemäfs, in einem einfachen Product, das, absolut vor der Chemie verschlossen, nur der Idee noch zugänglich und aus den von ihm abstammenden secundären Producten zu erschliessen ist.

Dieses organische Urproduct kann nun aber theils *durch das Leben selbst* wieder in verschiedene Stufen zerlegt werden, die um so mehr sich dem Unorganischen nähern müssen, je weiter sie von dem Indifferenzpuncte der Grundsubstanz abliegen, — theils können aus ihm

nach dem Tode des Organischen dieselben Producte, welche die Aussenwelt ursprünglich aus den Urelementen combinirt, durch Natur oder Kunst wiedergeboren werden. Aller Unterschied der organischen und unorganischen Substanz beruht also lediglich auf der Verschiedenheit der *quantitativen Verhältnisse* der Verbindung der Urelemente, d. h., auf einer Verschiedenheit der *stöchiometrischen Gesetze* in und ausserhalb des Organismus.

Daher ist die chemische Erscheinung des Todes Reconstruction der organischen Substanz unter die Gesetze der äusseren Natur in den Stufen der Verwesung.

Daher ist, was die Chemie auch aus organischen Wesen darstellt *), *Product*, ja, alles, was nur von dem organischen Leben aus auf ein rein chemisches Reagens wirkt, wird unmittelbar in diesem Conflict schon geändert und das Product desselben huldigt den Gesetzen des Todes.

Halten wir das hier ganz im Allgemeinen Dargelegte nur etwas näher an die bekanntesten Erscheinungen des Pflanzenwachstums: so finden wir viele entsprechende Beziehungen.

Ich habe mich hier zunächst von *Saussure* **), *Steffens* ***), *Voigt* ****), *Treviranus* †), *Oken* ††), *Kieser* †††) und *Sprengel* ††††) leiten lassen.

*) Kali, Kalk, Kiesel, Metall etc.

**) *Theodor von Saussure's* chemische Untersuchungen über die Vegetation, aus dem Französischen übersetzt, mit einem Anhang und Zusätzen versehen von *E. S. Voigt*. 1805.

***) Beiträge zur inneren Naturgeschichte der Erde, von *Heinrich Steffens*. Freiberg 1801.

****) In dem Anhang zu *Saussure's* chemischen Untersuchungen.

†) *Ludolph Christian Treviranus* Beiträge zur Pflanzenphysiologie.

††) Lehrbuch der Naturphilosophie, 2r Th.

†††) a. a. O.

††††) Anleitung zur Kenntniss der Gewächse. Zweite Ausgabe. 1. Th. 1817.

Die Pflanze lebt von Wasser und Gasarten. Durch die Wurzel saugt sie *Wasser*, mit Kohlenstoff verbunden, ein, durch die Blätter, Wasser und atmosphärische mit Kohlensäure gemengte *Luft*.

Die Haarwurzeln sind geschlossen durch schwammige Mützen; die Poren der Oberhaut führen in so feine Gänge, daß zweihundertmalige Vergrößerung sie kaum dem Aug verräth;

auch in die geschlossenen Zellen des Zellgewebes tritt die Feuchtigkeit:

Die Pflanze ist also von ihrer Nahrung durchdrungen auf eine Art, die nur in der Idee einer stetigen Intussusception durch Decomposition und Composition angedeutet, aber nicht mechanisch erklärt werden kann. Sie nimmt ihre Nahrung auf, indem sie in jedem Puncte ihrer Substanz gleichzeitig die Elemente der Erde in sich hervorruft und bindet, etwa nach der Art, wie die *Volta'sche Säule* den electrochemischen Proceß in sich anfacht und fortpflanzt.

Die Nahrung der Pflanze läßt sich also zurückführen auf *drei* Gasarten: *Sauerstoffgas*, *Kohlenstoffgas* und *Wasserstoffgas*, wozu sich noch unter gewissen Verhältnissen *Stickstoffgas* gesellt.

Aus dieser einfachen Kost evolvirt sich eine ungemessene Menge von Pflanzenstoffen, die das Leben und die Kunst darstellen können, von deren keinem aber die Erfahrung die unmittelbare Aufnahme von Aussen, auch wenn sie organisch möglich wäre, nachgewiesen hat. Gräser, die in Baumwolle, in Badeschwamm etc. mit bloßem kohlen-säuerlichem Wasser erzogen werden, liefern eine beträchtliche Menge *Kieselerde*. — Woher nähme doch die Pflanze ihr Kali, als aus der Dammerde, und woher nehme diese ihre Kali, als aus der Pflanze? So geht der Kreis ins Unendliche.

Die Pflanze lebt also von den einfachsten Elementen der Natur, wie sie sie *findet*, und combinirt aus ihnen die Basis ihres materiellen Leibs.

Das Thier dürfte sich im Gegentheil dadurch auszeichnen, daß es das schon weiter componirte erst decomponirt und zur Lösung in die Elemente selbst *vorbereitet*. Beide aber, die Thiere und die Pflanzen, entsteigen dem Wasser, der Mutter des irdischen Lebens. Die *Wissenschaft* spricht also, wie Sie sehen, für die *Einheit* der vegetabilischen Substanz, *vor* und *über* der Chemie, unter der Obhut des Lebens.

Die *Erfahrung* steht im Einverständnisse, wenn wir nachforschen, wie sich die Aussenwelt im Uebergehen zur Innenwelt des Organismus verhalte. Sie zeigt da Zerlegung und Reduction der besonderen Substanzen auf die *letzten*, durch die Chemie bisher dargestellten *Elemente*. Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff machen die Basis der Pflanzensubstanz, — Stickstoff spielt hinein; — Wasserstoff, Kohlenstoff und Stickstoff scheinen die Basis der Thiersubstanz zu machen, in die der Sauerstoff im *minus* eindringt.

Physiologisch angesehen, ist die reine Pflanzensubstanz also gleich *Wasser* mit *Kohlenstoff*.

Aber das Leben der Organismen ist ein *Entfalten* ihrer Substanz in *homologen Producten*.

Die *eine* Substanz zerfällt in Producte von bestimmter Mischung, deren Grundcharakter die Chemie aus den Resultaten ihrer Analysen erschliessen, aber nicht in ihnen *darstellen* kann, weil Tod und Leben reine Gegensätze sind.

Hier ist es nun, wo sich dem Physiologen die oben berührte schwierige Aufgabe entgegenstellt: *Die chemische Gestaltung der in der Sphäre der pflanzlichen Individualität liegenden Ursubstanzen aus der quantitativen Combination ihrer bestimmten Elemente nachzuweisen und diese Combinationen sowohl mit den Urtypen der Pflanzenbildung, als auch mit dem System der unorganischen Körper in Beziehung zu setzen.*

Ich will *Ihnen* erzählen, wie ich hier verfahren, und wie weit ich gekommen bin.

Wie jede Pflanze für sich eine Einheit darstellt: so macht ein bestimmtes Verhältniß von Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff, — (wir wollen vorläufig vom Stickstoff abstrahiren, da dieser nicht zum Wesen der Pflanze, sondern nur zum Wesen der Organisation überhaupt gehört), als Einheit betrachtet, *ihre reine, organische Ursubstanz*. Wir dürfen dieses Verhältniß, ungeachtet es in Bezug aufs Ganze bloß *relativ*, d. h. partiell ist, an und für sich, in Bezug auf die Pflanze, als Einheit betrachtet, *absolut* nehmen, oder mit andern Worten, wir dürfen alle Modificationen der Pflanzensubstanz als eine bloße Vertheilung dieser absolut bestimmten Größen nach polaren Gesetzen betrachten.

Die reine, bloß ideale Einheit der Pflanzensubstanz nenne ich *Pflanzenbasis* (Phytoïne). Sie ist so verschieden, als das Pflanzenreich selbst in Arten verschieden ist, aber ihre irdischen Elemente heißen immerdar *Kohlenstoff* mit *Sauerstoff* und *Wasserstoff*.

Die Pflanzenbasis *entspricht* der *Wurzel*, dem verschlossenen Pflanzenpol; daher liegt so häufig die ganze und ungetheilte Kraft der Pflanze in ihrer Wurzel.

Chemisch entspricht dieser Basis am meisten der sogenannte *Extractivstoff*, der aber nicht rein, sondern nur in und mit Eyweißstoff auftritt: Inulin, Asparagin, Picrotoxicin, Urticin, Gossypin etc. sind Andeutungen dieses x in der abgeleiteten Pflanzensubstanz.

Wie die oberirdische Pflanze, als der andere Pol, das ruhende Wesen der Pflanze selbst zuerst zerlegt in den *Stengel*, als den centralen-, und in die *Blätter*, als den peripherischen Theil, bis zur Blume, — dann aber im Wachsthum sich selbst angreift und sein Inneres, seine Structur, Textur, ja seine erste und ursprüngliche Grundlage, die Zelle, in Bildung bringt und ans Licht fördert: so, dachte ich, müsse sich auch die *eine* Pflanzensubstanz in *besondere* Substanzen zu immer weitem Kreisen gliedern, deren letzter endlich unmittelbar mit der Aussenwelt verschmelze und die *chemische Aussenfläche* (Epidermis) der Pflanze darstelle.

Der Stengel, als der indifferente Pol der erschlossenen Pflanze, der Wurzel zugeneigt, müßte angedeutet werden durch ein solches Verhältniß der Elemente der Pflanzenbasis, in welchem zwar das zerlegende Element (das Licht) seine Gewalt schon äusserte, aber als einen Act in der Vergangenheit und mit der Neigung zum Gleichgewicht.

Eine Substanz, in welcher die Lichtaction untergegangen (vergangen) ist, ist ein *Oxyd*.

Als pflanzliche Substanzen, die dieser Sphäre, analog*) den Oxyden, entsprächen, erschienen mir

Amylum,

Zucker,

Gummi,

Schleim,

Holzfaser. (Rinde und Mark stehen schon im Uebergang zu differenteren Formen.)

Die chemischen Analysen gaben nicht unerfreuliche Uebereinstimmungen zu erkennen; nach *Berzelius***) enthalten nämlich

	Kohlenstoff	Sauerstoff	Wasserstoff
<i>Amylum</i>	34,327	49,583	7,090
<i>Zucker</i>	42,704	50,405	6,891
<i>Gummi</i>	41,752	51,456	6,792
<i>Schleim</i>	45,267	48,348	6,385
<i>Holzfaser der Eiche nach</i>			
<i>Thenard und Gay-Lussac</i> —	52,53	41,78	5,69
<i>der Buche</i>	51,45	42,73	5,82.

Alle diese Stoffe ergeben ein Product aus *Wasser* und *Kohle* mit einem nur sehr geringen + oder — des Sauerstoffs, so daß ich hier die

*) Es ist nur von Einheit der *Bedeutung*, nicht der *Form* die Rede.

**) *Experiments to determine the definite proportions, in which the elements of organic nature are combined, in Thomsons Annals of Phil. Vol. IV. u. V.*

erste, gleichmäſsigste Bindung der Pflanzensubstanz zu erblicken glaubte, — nämlich nicht mehr ein reines, indifferentes Product aus *Sauerstoff*, *Wasserstoff* und *Kohlenstoff*, sondern eine *Unterordnung* der Basis unter je *eins* der relativen Elemente.

Im *Amylum* tritt der Sauerstoff *zurück*, Wasserstoff *vor*, — es beginnt die Reihe der wasserstoffigen Pflanzensubstanzen.

In *Gummi*, *Zucker*, *Schleim* waltet der Sauerstoff; ich sah in ihnen die Reihe der sauerstoffigen Pflanzensubstanzen beginnen.

Im *Holze* drückt sich die Macht des Kohlenstoffs über die beiden anderen Elemente aus, und scheint ebenfalls eine Reihe von Evolutionen zu eröffnen. — Kork (Rinde) gewinnt wieder an Sauerstoff.

Endlich darf auch das *Eyweiß* nicht ganz übersehen werden, das den *Stickstoff*, als viertes Glied, zum Regiment bringt, gleichsam ein Hereinblicken der Thierheit in die Pflanzenwelt.

Thenard's und *Gay-Lussac's* erstes Gesetz *) schien mir also sehr sinnreich auf diesen ersten tieferen Kreis der pflanzlichen Substanzen zu deuten, wenn es solche Pflanzensubstanzen sich unterordnet, in welchen des *Sauerstoffs* und *Wasserstoffs* nicht mehr, als zur *Wasserbildung* erfordert wird, in die *Verbindung* mit dem *Kohlenstoff* tritt. *Wasserkohle* wäre der Character dieser Stoffe, die wirklich alle zum eigentlichen Leib der Pflanzen gehören und sich im Stamm und dessen Säften hervorbilden.

Das *Amylum*, reine, lebendige, freie *Pflanzenzellchen*, gleichsam vegetabilische Infusorien oder Atome in der Pflanzenzelle, findet sich reichlich schon in den Cotyledonen, in vielen Wurzelknollen, und nimmt im Stengel ab, bis es wieder in den Saamen hervortritt.

Zucker und *Schleim* gehören der Wurzel, dem Stengel, am meisten aber den reifen Früchten, die Blätter aber enthalten seltner diese Substanz.

*) *Recherches physico.-chymiques* T. II. p. 265 — 350.

Holzfasern ist Stengel - und noch mehr Blattgebilde. *Eyweiss* herrscht in Wurzelknollen, im Bildungssaft, in Früchten und Saamen.

Die *Blätter*, als der Inbegriff der peripherischen Gebilde der Pflanze, werden bezeichnet durch *peripherische Stoffe*, d. h. durch solche, die nicht zur inneren Bindung und Consolidirung gelangen und so in die Pflanze selbst eingehen, sondern die vielmehr aus ihr *herausstreben* — *Se-* und *Excretionsstoffe* der Pflanze. Der Character dieser Stoffe wird seyn, daß sie das äussere, unorganische Element immer mehr zur Herrschaft bringen, und den hydrocarbonischen Leib der Pflanze nach den schon in ihm selbst liegenden Richtungen weiter zerlegen, das heisst, *äusseren, polaren Elementen unterordnen*.

Die Ausscheidungsstoffe sind aber entweder *absolute*, d. i. solche, die unmittelbar in die Aussenwelt zurücktendiren und entweder *wirklich* und *räumlich*, oder doch durch die aufgehobene *Möglichkeit der Rückkehr* in den Pflanzenleib, in dieselbe übergehen, — oder *relative*, d. i. solche, die nur hervortreten, um, als Pole, den Conflict eines *neuen Pflanzenlebens* zu beginnen.

Aus der Reihe der ersteren kenne ich:

Harze,

Aetherische und fette Oele, (Miricin?)

Nectar,

Säuren.

Zur Reihe der zweiten gehören *Pollen* und *Keimflüssigkeit* des *Eychens*.

Es ist anziehend, zu bemerken, wie sich diese *nichtelastischen Excretionen* wieder nach dem Typus der indifferenten Pflanzensubstanzen gliedern.

Harze und *Oele* gehorchen dem *Wasserstoff*.

Nach

Nach *Thenard* und *Gay-Lussac* enthalten:

	Kohlenstoff	Sauerstoff	Wasserstoff
Tannenharz	75,944	13,337	10,719
Kopal	76,811	10,606	12,05 *)
Baumoel	77,213	9,427	13,360
Wachs (der Bienen)	81,784	12,697	5,544 **).

Wie viele Harze giebt es nicht, — wie viele ätherische Oele!
Hier beginnen die Lücken.

Im *Nectar* schwitzt fast reiner Zucker aus, doch verdiente er eine genaue Analyse, und zwar nicht in der Form des Bienenhonigs. Mit ihm hebt die Reihe der Säuren an, die einzige, wo die Beobachtung weiter reicht, aber doch nicht *weit genug*.

Ich will folgende Säuren nach *Berzelius* zusammenstellen:

	Kohlenstoff	Sauerstoff	Wasserstoff
Gallussäure etc.	56,96	38,02	5,02
Essigsäure	46,871	49,934	6,195
Citronensäure	41,270	55,09	3,634
Schleimsäure	34,164	60,818	5,018
Weinsteinsäure	36,888	59,200	3,912
Oxalsäure	33,217	66,290	0,493.

*) Die Benzoesäure ist ein Harz mit halbem Antheil Wasserstoff. Sie besteht nach *Berzelius* aus

Kohlenstoff 74,71. Sauerstoff 20,02. Wasserstoff 5,21.

$5,21 \times 2$ ist aber $= 10,42$, welches bis auf 0,29 dem Wasserstoffantheil des Harzes entspricht. So gehört also diese Säure zu den Mittelgliedern, die den Abstand der brennbareren Pflanzenstoffe von den indifferenten vermitteln helfen. Ihrer dürften noch viele entdeckt werden.

**) Das Wachs der Bienen ist kein rein vegetabilischer Körper, sondern offenbar durch die Verdauungskraft des Thiers verändert. Es bleibt also die wahre Mischung des Pflanzenwachses unbestimmt, bis genaue Analysen des Wachses der Wachspalme, des nordamerikanischen Wachsbaums (*Myrica cerifera*) u. s. w., das Nähere entscheiden.

Die sauren Säfte vieler Früchte sind als eine Art von Excretion zu betrachten, da sie nicht in den Kreis des Individuums treten, sondern mit den Früchten *abfallen*. Warum sind Wurzeln selten oder nie sauer?

Wenn ich nun auf die wasserstoffigen Se- und Excretionen *Thenard's* und *Gay-Lussac's* drittes Gesetz *) vollständig geltend machen kann: so dürfte vielleicht, in Hinsicht der Säuren, der geringere Ueberschuß an Sauerstoff, den die Berzelius'schen Analysen ergeben, dem zweiten Gesetz dieser geistreichen Chemiker **) weniger zu entsprechen scheinen. Es fragt sich, ob diese Analysen mit dem Gesetze geradezu im Widerspruche stehen oder nicht?

Im *Pollen* hat man thierische Mischung gefunden. Die bisherigen Analysen genügen nicht, weil sie nicht auf die Elemente zurückgehen. Erwiesen ist aber, daß sich hier die Herrschaft des *Stickstoffs* erweitert. Sollten die *Eychen*, — die Feuchtigkeit des Fruchtknotens, — der Narbe, — den *Kohlenstoff* vorwaltend zeigen: so wäre der *vierte Pol* der Zerstreuung des pflanzlichen Leibes gefunden.

Was liegt aber zwischen *Eyweifs* und *Pollen* ***)?

was zwischen *Holz* und *Keimflüssigkeit*?

was zwischen *Amylum* und *Harz*?

Auch zwischen *Zucker* und den Säuren sind noch große Klüfte?

Hier tritt also die Noth der Pflanzenphysiologie ein und sie muß zu dem Chemiker ihre Zuflucht nehmen, der in den stöchiometrischen Ge-

*) Diejenigen Substanzen, welche mehr Hydrogen enthalten, als erfordert wird, um mit dem in ihnen vorkommenden Sauerstoff Wasser zu bilden, sind entweder ätherische oder fette Oele oder Harze. a. a. O.

**) a. a. O. Pflanzensäuren sind diejenigen vegetabilischen Substanzen, welche mehr Sauerstoff enthalten; als erfordert würde, um den ihnen zukommenden Wasserstoff in Wasser zu verwandeln.

***) Sollte das Federharz in diese Reihe fallen?

setzen den Schlüssel gefunden hat, welcher ihm die Geheimnisse der analysirenden Chemie deutet und ein Gesetz in ihre Resultate bringt.

Es bleibt aber noch ein Kreis der Zerstreuung, — der nämlich, in welchem die letzte Welle, vom Centrum aus angeschlagen, in den Umfang verfließt.

Die Pflanzensubstanz entäussert ihr Inneres, ihre innere Structur, in den Gebilden des Geschlechts. Die Substanzen, welche dieser Stufe rein entsprechen sollen, müssen die *polare Spannung* so weit steigern, daß sie jedes der 4 Urelemente der Ursubstanz, mit dem intensiven Minimum der übrigen *) verbunden, nach Aussen kehren, d. h. *ausscheiden*.

Diese Ausscheidung erfolgt entweder in *Gasform*: *Geruch* — oder in *tropfbarer Form*: *Ausdünstung*.

Die *Gerüche* scheinen theils *wasserstoffhaltig*, theils *stickstoffhaltig*, wohin z. B. auch die Cyanogensäure zielt; die *Ausdünstungsstoffe* sind theils *gekohltes Wasser* (?), theils Säuren; z. B. Oxalsäure in den Drüsen der Kicher **).

So wäre auch hier eine vierseitige Spaltung und relative Zersplitterung der einen und ungetheilten Pflanzensubstanz angedeutet; aber die Chemie, die immer mehr zurücktritt, je weiter ich vorschreite, verläßt mich.

Wie diese Einheit, die ich ahne, aus einem bloßen Desoxydationsproceß des Kohlenstoffs in entgegengesetzter Richtung durch das Pflanzenleben, — in der Spannung des Urgegensatzes von Sonne und Erde unter der Potenz der Pflanze, — abgeleitet werden möge — diese

*) Ich sage *intensiven* Minimum; denn das bloße Gewichtsverhältniß scheint mir nicht allein den rechten Maafsstab zu geben.

**) Man vergleiche: *L. L. Treviranus über die Ausdünstung der Gewächse und deren Organe* in *R. u. L. Treviranus vermischten Schriften*. 1. Bd. 1816. S. 171.

höchste Aufgabe der Pflanzenphysiologie gehört nicht hieher. Sie läßt sich andeuten, — aber nicht lösen, bevor die Evolutionsreihen der Pflanzensubstanz vollständiger nachgewiesen sind; daher meine Frage:

1) *Was läßt sich zur Ergänzung der bedeutenden Lücken, die hier offen stehen, beibringen, um dem Gebäude dadurch Haltung, oder, — wenn der Ballast auf die unrechte Seite fallen sollte, den Umsturz zu bereiten?*

Wer so ziemlich Alles, was die Chemie, und besonders die neuere, ans Licht gefördert, gelesen hat, wie Sie, mein Freund! kann sich an Vieles erinnern, was mir nothwendig entgehen mußte.

2) *Was sagt die Stöchiometrie zu diesem Gebäude, — wenn Gott will, daß es stehen bleibe? Wird sie darin eine bequeme Herberge finden?*

3) *Endlich — wie verhalten sich wohl die Verbindungsstufen, nach Atomen ausgedrückt, zu meinen Evolutionsbasen, oder Körpern, des Pflanzenreichs:*


a) Wurzel;

b) Stengel, Blatt;

c) Befruchtungsorganen?

Ich schliesse, um meine Ansicht in einen leichteren Ueberblick zu fassen, noch folgende tabellarische Zusammenstellung der Pflanzensubstanzen, nach ihren allgemeinsten Gesichtspunkten, an.

*) Ich sage intentional Minimum; denn das bloße Gewichtsverhältniß scheint mir nicht allein den richtigen Maaßstab zu geben.
**) Man vergleiche: A. L. Tremann's über die Bedeutung der Gewächse und deren Organe in H. u. A. Tremann's wissenschaftlichen Schriften. I. Bd. 1816. S. 171.



Bischof an den Präsidenten Nees v. Brambach

Sie fordern mich in Ihrem Schreiben, das ich mit wahrem Vergnügen gelesen habe, auf, einen Versuch zur Entdeckung der Gesetzmäßigkeit in den Mischungsverhältnissen der Elemente der organischen und was zunächst der Pflanzenkörper an wegen. Diese Untersuchung, wenn sie anders meine Kräfte nicht übersteigt, nehme ich um so lieber an, da sie mit andern sehr verwandten Untersuchungen, von denen mein so eben vollendetes Lehrbuch der Systematik verhandelt, zusammenhängt. Schon längst habe II.

E m p i r i e.

die Verbindungsgesetze, die in der neuen Zeit in der vorgetriebenen Natur auf eine so glänzende Weise entlarvt worden sind, auch auf die organische Natur auszuwenden; allein ich kann bei der Furcht, daß die eben erwähnten Gesetze, welche die Natur in sich selbst zum Grunde liegen können, durch die Erzeugung solcher Naturkräfte und die Art, wie diese Erzeugnisse entstehen, weichen zu sehr von einander ab, als daß man hoffen könnte, auf einem Wege zum Ziele zu gelangen.

Res ardua, — novis auctoritatem dare, — dubiis fidem.

Plinius.

Ich beginne damit, einen historischen Blick auf das zu werfen, was in der Pflanzenkunde bereits versucht und geleistet worden ist. Es wäre vielleicht nicht unrichtig, hier in der grossen Abzählung so weit zurück zu gehen, als wir noch etwas über das Wesen und die Entstehung der Pflanzenkörper ausgesprochen finden; allein diese Untersuchung

.11

Em d i t i e

Bischof an den Präsidenten Nees v. Esenbeck.

Sie fordern mich in *Ihrem* Schreiben, das ich mit wahrem Vergnügen gelesen habe, auf, einen Versuch zur Entdeckung der Gesetzmäßigkeit in den Mischungsverhältnissen der Elemente der organischen und zwar zunächst der Pflanzenkörper zu wagen. Diese Untersuchung, wenn sie anders meine Kräfte nicht übersteigt, nehme ich um so lieber auf, da sie mit andern nahe verwandten Untersuchungen, wozu mich mein so eben vollendetes Lehrbuch der Stöchiometrie veranlafste, zusammentrifft. Schon längst habe ich selbst an die Möglichkeit gedacht, die Verbindungsgesetze, die in der neuern Zeit in der unorganischen Natur auf eine so glänzende Weise entziffert worden sind, auch auf die organische Natur auszudehnen; allein ich kam bald zu der Einsicht, daß nicht eben dieselben Gesetze, welche dort gefunden wurden, auch hier zum Grunde liegen können; denn die Erzeugnisse beider Naturreiche und die Art, wie diese Erzeugnisse entstehen, weichen zu sehr von einander ab, als daß man hoffen könnte, auf *einem* Wege zum Ziele zu gelangen. Mag es auch noch so verdienstlich seyn, den andern Weg aufzusuchen, der uns in der organischen Natur vielleicht eben dahin zu führen verspricht, wohin uns *Richter* und seine Nachfolger in dem Gebiete der unorganischen geleitet haben; ich würde es, aus Furcht, auf dem unbetretenen, dunklen Pfade mich zu verirren, doch nicht gewagt haben, wenn ich nicht hoffen könnte, daß da, wo meine Erfahrungen mich verlassen, die philosophische Ansicht der Natur mich leiten werde. So will ich's denn versuchen, die Aufgabe, welche *Sie* mir vorlegen, wo möglich aufzulösen.

Ich beginne damit, einen historischen Blick auf das zu werfen, was in der Pflanzenchemie bereits versucht und geleistet worden ist. Es wäre vielleicht nicht unwichtig, hier in das graue Alterthum so weit zurück zu gehen, als wir noch etwas über das Wesen und die Entstehung der Pflanzenkörper ausgesprochen finden; allein diese Untersuchung

die sich leicht sehr in die Länge ziehen könnte, möchte uns zu weit von dem Ziele abführen, das wir zu erreichen streben; ich begnüge mich daher, mit dem Zeitpunkte zu beginnen, wo die Chemiker auf rein experimentellem Wege die wahre Kenntniß von den Bestandtheilen der Pflanzenkörper erlangt haben.

Ehe man die Bestandtheile des Wassers und der Kohlensäure kannte, konnte nichts über die Bestandtheile der Pflanzenkörper mit Gewißheit ausgesprochen werden; also erst mit *Watt*, *Cavendish* und *Lavoisier*, denen wir die chemische Kenntniß des Wassers und der Kohlensäure verdanken, ging ein neues Licht über die chemische Natur der Pflanzenkörper auf. *Cavendish* *) hielt die fixe und phlogistische Luft nebst einem großen Theile Phlogiston und Wasser für die Bestandtheile der Pflanzen, weil, wie er bemerkt, bei ihrem Verbrennen in offner Luft, (wobei ihr Phlogiston sich mit dem dephlogistisirten Theile der Atmosphäre verbindet und Wasser bildet,) sie fast gänzlich in Wasser, und jene beiden Luftarten verwandelt zu werden scheinen. Da, wie weiterhin **) *Cavendish* bemerkt, die Pflanzen ihre Nahrung fast gänzlich aus Wasser, fixer und phlogistischer Luft ziehen, und durchs Verbrennen wieder in diese Substanzen zerlegt werden: so glaubte er annehmen zu dürfen, daß sie, ungeachtet ihrer ungeheuern Mannichfaltigkeit, fast ganz aus den verschiedenen Verbindungen des Wassers, der fixen und phlogistischen Luft bestehen. Uebersetzen wir die Sprache *Cavendish's* (der bekanntlich eine eigene äusserst scharfsinnige phlogistische Theorie aufstellte) in die *Lavoisier's*: so wird es uns klar, daß er mit der genauen Kenntniß von den Bestandtheilen der Pflanzen innigst vertraut war. Doch wir wollen auch *Lavoisier* selbst hierüber hören.

Dieser treffliche Chemiker, der sich's zur unerläßlichen Pflicht machte, stets mit Maass und Gewicht in der Hand, die Natur zu erfor-

*) *Crell's chem. Annal.* 1785. I. 341.

**) a. a. O. 345.

schen, zeigte durch unwiderlegliche Versuche, daß die wesentlichen oder wie er sich ausdrückt, bildenden Bestandtheile der Pflanzenkörper, Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlenstoff seyen; die Oele insbesondere bloß aus den beiden letztern Bestandtheilen, deren Gewichtsverhältniß er durch Verbrennungsversuche bestimmte, bestehen *). *Lavoisier* theilte aber nicht die Ansicht *Cavendish's*, daß die Pflanzenkörper aus binären, d. h. aus je zwei Elementen bestehenden Verbindungen zusammengesetzt seyen; sondern er bemerkt, daß genau genommen, sie weder Wasser, noch Kohlensäure, noch Oel, sondern nur die Grundtheile, woraus dieselben gebildet werden können, enthalten **). Die Erscheinungen, welche die Gährung, Fäulniß und die gänzliche Entmischung der Pflanzenkörper begleitet, wovon die ältern Chemiker nur höchst unvollkommene Vorstellungen hatten, wurden von *Lavoisier* zuerst auf theoretische Gründe zurückgeführt: er wies durch genaue quantitative Versuche nach, wie aus Zucker in der Weingährung Alkohol und aus diesem in der sauren Gährung Essigsäure entsteht.

Sie sehen hieraus, daß schon durch *Cavendish*, vorzüglich aber durch *Lavoisier* die Bahn zur genauern Kenntniß der Pflanzenkörper gebrochen war, und hätte man das einfache, zu einzig richtigen Resultaten führende Verfahren *Lavoisier's*, die Pflanzenkörper in verschlossenen Gefäßen zu verbrennen, und aus den Producten der Verbrennung auf ihre chemische Constitution zu schließen, weiter verfolgt: so würden wir gewiß in der chemischen Kenntniß der Pflanzenkörper weiter vorgerückt seyn. Allein bald kamen die Chemiker auf Abwege, verwandten Zeit und Mühe auf Pflanzenanalysen, die von der wissenschaft-

*) Mem. de l'Acad. roy. des scienc., à Paris. p. l'Ann. 1784. p. 593. fg.; übers. in *Crell's chem. Ann.* 1790. I. 518. Diese Versuche haben historisches Interesse, weil sie die ersten Pflanzenanalysen enthalten, welche das Verhältniß der Grundstoffe geben.

**) *Crell's chem. Ann.* 1794. I. 537.

lichen Seite betrachtet, wenig Gewinn darbieten konnten. Das Verfahren nämlich, das man befolgte, bestand darin: die Pflanzenkörper nach der Reihe mit verschiedenen Auflösungsmitteln, mit Wasser, Alkohol und Aether, sowohl im kalten als warmen Zustande zu behandeln. Dadurch wurden die, in den verschiedenen Menstruis auflöslichen, *näheren* Bestandtheile der Pflanzenkörper ausgezogen, und theils durch Verdunstung des Auflösungsmittels, theils durch andere Reagentien einzeln dargestellt. Auf diese Weise erhielt man das Stärkmehl, Gummi, den Zucker, Eiweißstoff, Kleber, Extractivstoff, die Holzfaser u. s. w. Manchmal äscherte man noch die, nach allen diesen Operationen übrig gebliebene Pflanzensubstanz ein, analysirte den feuerbeständigen Rückstand und fügte die Resultate der Analyse noch zu jenen hinzu.

Die Anzahl jener *näheren* Pflanzenbestandtheile hat sich in der neuern Zeit beträchtlich vermehrt, täglich finden die Chemiker noch mehrere auf, und es fehlt nicht viel, daß fast jeder eigenthümlichen Pflanze ein besonderer, ihre Eigenschaften bestimmender Stoff zugeschrieben wird. Vollständig finden Sie diese *näheren* Pflanzenbestandtheile aufgeführt, und zugleich ihr chemisches Verhalten, besonders zu den verschiedenen Auflösungsmitteln, angegeben, in *John's* chemischen Tabellen der Pflanzenanalysen. Nürnberg 1814. S. VIII — X. Aber seitdem wurden mehrere neue, theils in den Pflanzen wirklich entdeckt, theils in ihnen hypothetisch angenommen: wie z. B. die Emetine in der Ipecacuanha, das Morphinum und die Mekonsäure in dem Opium u. s. w., und wir dürfen erwarten, daß ihre Anzahl in der Zukunft noch sehr zunehmen werde.

Wenn diese *näheren* Bestandtheile feste und unveränderliche organische Verbindungen wären, die in jedem Pflanzenkörper in gleicher Beschaffenheit vorkämen, wenn man sie, so wie ihre Elemente, durch die Analyse qualitativ und quantitativ genau bestimmt hätte: so könnten wir hoffen, durch sie zur chemischen Kenntniß der Pflanzenkörper zu gelangen. Die Analyse auf die oben beschriebene Weise, kann aber hiezu

den Weg nicht bahnen. Davon überzeugte sich schon *Deyeux* *); denn er sah ein, daß die Resultate, welche man bei Anwendung jener Auflösungsmittel erhält, fast immer nur mit den angewandten Agentien gebildete Verbindungen sind, und daß sie, anstatt die Wahrheit, welche man zu entdecken sucht, darzustellen, oft nur denjenigen in Irrthümer führen, welcher sie als Producte einer genauen Analyse betrachtet. Noch mehr aber zeigten *Proust* **), *Berzelius* ***) und *Chevreul* ****), daß alle die Pflanzenstoffe, welche bisher für allgemeine nähere Bestandtheile der Vegetabilien gehalten worden, in ihrer Natur eben so sehr von einander abweichen, als die Pflanzen selbst, aus denen man sie dargestellt hat. So hat zwar alles das, was wir *Gerbestoff* nennen, gewisse allgemeine chemische Eigenschaften mit einander gemein; es weicht aber von einander auf eine sehr merkliche Art, nach der Natur und Verschiedenheit der Pflanzen ab, durch die es erzeugt worden ist: so müssen wir den Gerbestoff der Galläpfel, des Cachou, der Uva Ursi, der Weidenrinde etc. für lauter verschiedene Arten desjenigen Stoffs nehmen, den wir Gerbestoff nennen. Dasselbe findet bekanntlich bei den flüchtigen und fetten Oelen, den Harzen, und nicht minder bei dem Gummi, Zucker etc. Statt. Hiezu kommt noch, daß wir selten einen Stoff von dem andern ganz rein zu scheiden vermögen, indem man fast immer nur Verbindungen von zwei Stoffen mit Ueberschuß des einen erhält, und, wie *Chevreul* bemerkte, Verbindungen aus zwei Bestandtheilen nach verschiedenen Verhältnissen sich nicht immer auf einerlei Art zerlegen lassen. Mehrmals hält man auch Verbindungen, die ein Product der Analyse sind, für unmittelbare Bestandtheile der Pflanzen, und häufig

*) *Scherer's Journ. d. Chem.* II. 273.

**) *Gehlen's Journ. f. Chem. u. Phys.* II. 77.

***) *Gilbert's neue Annal. der Phys.* XII. 76.

****) *ebend.* XI. 346, und XII. 327.

begnügt man sich mit einigen, oft ziemlich unbestimmten, Kennzeichen zur Characteristik solcher nähern Bestandtheile. Wie schwankend überhaupt manche Chemiker solche Substanzen characterisiren, ersieht man schon aus den Benennungen, die sie ihnen geben: so z. B. findet man öfters unter den nähern Bestandtheilen eines Pflanzenkörpers, einen *thierisch-vegetabilischen Stoff* aufgeführt. Zu verstehen ist darunter wohl nichts anders, als eine Substanz, die vegetabilischen Ursprungs ist, aber Stickstoff in ihrer Mischung hat; wie unendlich viele Arten solcher thierisch-vegetabilischer Substanzen lassen sich aber wohl nicht denken? —

Aus diesem allen geht zur Genüge hervor, daß jenes, bisher gewöhnlich angewandte, Verfahren zur Analyse der Pflanzen und Pflanzentheile, zwar für die Pharmacie, Therapie, Branntweinbrennerei, Gerberei etc. nützliche Resultate gewähren; für die wissenschaftliche Kenntniß von der chemischen Constitution der Pflanzenkörper aber von weniger Nutzen seyn kann.

Da wir wissen, daß die Grundstoffe aller Pflanzenkörper, Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlenstoff sind, wozu bei einigen noch der Stickstoff kommt: so scheint ihre so große Verschiedenheit, bei gleicher Qualität nur in verschiedener Quantität, d. h. in den verschiedenen Verhältnissen jener Elemente, begründet zu seyn. Wir müssen daher zur Erreichung unsers Zwecks, diejenigen Analysen betrachten, welche uns das Verhältniß jener Grundstoffe in den Pflanzenkörpern lehren. Analysen dieser Art besitzen wir nur wenige, die, welche von *Lavoisier* herrühren, der zuerst diese Zerlegungsmethode einführte, konnten, da ihm die hiezu nöthigen Instrumente fehlten, noch nicht den gehörigen Grad von Genauigkeit erreichen. Erst seitdem *Volta's* Wasserstoff-Eudiometer erfunden worden, durch das die gasförmigen, durch Verbrennung organischer Körper erhaltenen, Producte zerlegt werden können, ist es den Chemikern möglich geworden, in diesem Felde der Chemie einige Fortschritte zu thun. Dennoch sind mehr als zwanzig

Jahre verflossen, ehe von diesem trefflichen Instrumente zur Analyse organischer Substanzen Gebrauch gemacht worden. So viel ich weiß, war *Theodor von Saussure* der erste (1807), der bei seinen Analysen des Alkohols und Schwefeläthers diesen Weg eingeschlagen hat. Er befolgte zuerst *Lavoisier's* Methode, den Alkohol mittelst einer Lampe, unter einem mit einer Mischung von gemeiner Luft und Sauerstoffgas angefüllten Recipienten, zu verbrennen, und die erhaltenen Producte zu untersuchen. Diese Zerlegung gab ihm aber die am wenigsten genauen Resultate. Dann zersetzte er den Alkohol in *Volta's* Wasserstoff-Eudiometer durch augenblickliche Verpuffung des elastischen oder gasförmigen Dampfs desselben mit Sauerstoffgas. Endlich bewirkte er noch die Zersetzung des Alkohols in einer glühenden Porcellanröhre *).

In dem Zeitraum zwischen *Lavoisier* und *Saussure* kam nichts erhebliches dieser Art zum Vorschein. *Tingry* und *Fourcroy* zerlegten zwar mehrere Vegetabilien durch trockne Destillation, ohne aber auf die gasförmigen Producte zu achten, welches auch, wenn es geschehen wäre, nichts genützt haben würde, da sie ermangelten, eine vollständige Verbrennung der Pflanzenkörper zu bewirken **). Gleichwohl äuserten damals mehrere Chemiker Meinungen über die Natur mancher Pflanzenkörper, welche, wenn sie auch eine unrichtige Vorstellung andeuten, wenigstens spätere Untersuchungen vorbereiteten. So schloß *Deyeux* aus seinen Untersuchungen der Galläpfel, daß die Gallussäure bloß aus Kohlenstoff und Sauerstoff bestehe ***); Dr. *Hallé* aus der Verwandlung vegetabilischer und thierischer Substanzen, daß dieselben durchaus einerlei Bestandtheile zur Grundlage haben ****). *Berthollet*

*) *Gehlen's* Journal für Chemie und Physik B. IV. S. 48. fg. wie auch *Gilbert's* Annal. B. XXIX. S. 268. fg.

**) *Crell's* chem. Annalen 1790. II. 68. u. 1794. I. 421.

***) ebend. 1794. I. 42.

****) ebend. 1795. I. 438.

stellte Versuche mit dem Alkohol an, die ihn fast auf die Entdeckung des ölerzeugenden Gases geführt hätten *); die eigentliche Entdeckung dieses Gases blieb aber erst den holländischen Chemikern, *Deimann, van Trostwyk, Bondt* und *Louwrenburgh* vorbehalten **).

Gegen Ende des ersten Jahrzehend dieses Jahrhunderts bereicherten die beiden französischen Chemiker, *Gay-Lussac* und *Thenard*, die Wissenschaft mit einer Reihe sehr sorgfältiger Untersuchungen vegetabilischer und thierischer Körper ***). Die Methode, welche sie befolgten, war folgende: Sie verbrannten die organischen Substanzen, mit Hülfe des überoxydirtsalzsauren (chlorinsauren) Kali, dessen Sauerstoff die vollständige Verbrennung alles Wasserstoffs und Kohlenstoffs bewirkte, in einer verschlossenen gläsernen Röhre von sehr zweckmäßiger Einrichtung, und fingen die sich entwickelnden gasförmigen Producte über Quecksilber auf. Diese Gasarten analysirten sie dann in *Volta's* Wasserstoff-Eudiometer über Quecksilber, indem der vierte Theil ihres Volumens an reinem Wasserstoffgas zugesetzt, die Gasmischung durch den elektrischen Funken entzündet, und aus der gebildeten Kohlensäure und Wasser, nach Abzug jenes hinzugefügten Wasserstoffgases und des von dem überoxydirtsalzsauren Kali herrührenden Sauerstoffgases, das Verhältniß der Grundstoffe des zerlegten Körpers berechnet wurde. Auf diese Weise analysirten sie: den Zucker, das Arabische Gummi, die Stärke, den Milchzucker, das Eichenholz, das Büchenholz, die Schleim-

säure

*) ebend. 1791. II. 86.

**) ebend. 1795. II. 310.

***) Méthode pour déterminer la proportion des principes, qui constituent les substances végétales et animales, et application de cette méthode à l'analyse d'un grand nombre de ces substances. Présenté à l'Institut le 15 janvier 1810 in den Recherches Physico-Chimiques von *Gay-Lussac* und *Thenard* II. 265—350. Im Auszuge in *Gilbert's* neuen Annal. VII. 401. u. fg.

säure, die Sauerklee - die Weinstein - die Citronen - die Essigsäure, das Terpenthinharz, den Kopal, das Wachs und das Baumöl, ausserdem noch den thierischen Faser - Eiweiss - und Käsestoff und die Gallerte.

Aus den Resultaten dieser Analysen leiteten *Gay-Lussac* und *Thénard* die von Ihnen, in Ihrem Schreiben schon berührten drei Gesetze ab:

- 1) daß alle Pflanzenkörper, in welchen des Sauerstoffs im Verhältnisse zum Wasserstoff mehr, als im Wasser vorhanden ist, Säuren sind;
- 2) daß alle Pflanzenkörper, in welchen des Sauerstoffs im Verhältnisse zum Wasserstoffe weniger, als im Wasser vorhanden ist, harziger, ölicher, oder alkoholischer Natur sind;
- 3) daß alle Pflanzenkörper, welche Sauerstoff und Wasserstoff genau in eben dem Verhältnisse enthalten, worin sie im Wasser vorhanden sind, weder saurer noch harziger Natur sind, sondern zur Classe des Zuckers, Gummis, der Stärke, des Milchzuckers, der Holzfaser und des krystallisirbaren Stoffs der Manna gehören.

Diese Chemiker setzen hinzu: „Wenn man annimmt, was wir in-
deß weit entfernt sind, für wahr zu halten, daß sich der Wasserstoff und Sauerstoff im Zustande des Wassers vereinigt in den Pflanzenkörpern befindet: so würden die Pflanzensäuren aus Kohlenstoff, Wasser und Sauerstoff; die Harze, Oele, Alkohol und Aether aus Kohlenstoff, Wasser und Wasserstoff; und endlich Zucker, Gummi, Stärke, Milchzucker, die Holzfaser und der krystallisirbare Stoff der Manna bloß aus Kohlenstoff und Wasser, nach verschiedenen Verhältnissen, bestehen.“ (Denn diese letztern sechs Pflanzenstoffe enthalten, nach ihnen, den Sauerstoff und Wasserstoff genau in dem Verhältnisse, in welchem sie im Wasser enthalten sind.) „Da nun,“ fahren sie weiter fort, „alle Pflanzen fast ganz aus Holzfasern, Pflanzenschleim und den ähnlichen Stoffen bestehen, welche Sauerstoff und Wasserstoff genau in dem, im Wasser herrschenden Verhältnisse in sich schliessen: so folgt hieraus, daß das Was-

ser, welches die Pflanzen in dem Acte der Vegetation einsaugen, in dem Innern derselben mit dem Kohlenstoffe zu der Substanz der Pflanze sich verbindet. Vermöchten wir daher, das Wasser und den Kohlenstoff nach allen Verhältnissen mit einander zu vereinigen, und ihre Theilchen einander gehörig zu nähern: so würden wir ohne Zweifel alle Pflanzenkörper, welche auf der Zwischenstufe zwischen den Säuren und Harzen stehen, wie Zucker, Stärke, Holzfaser u. s. f. durch Kunst erzeugen können.

Diesen, von *Gay-Lussac* und *Thenard* aufgestellten, Gesetzen widersprechen die Resultate der analytischen Untersuchungen mehrerer Pflanzenkörper, womit der berühmte schwedische Chemiker *Berzelius* die Wissenschaft bereichert hat *). *Berzelius* fand nämlich das Verhältniß des Sauerstoffs zum Wasserstoff in der Essigsäure und Gallussäure, sehr nahe so wie in dem Wasser, was dem 1sten und 3ten jener Gesetze widerspricht, und in der Benzoessäure fand er des Sauerstoffs im Verhältnisse zum Wasserstoff viel weniger als im Wasser, was dem 2ten jener Gesetze widerspricht. Diese Abweichungen leitet *Berzelius* von dem Umstande her, daß *Thenard* und *Gay-Lussac* keine Rücksicht nahmen auf das mit mehreren organischen Körpern verbundene Wasser. Diese Chemiker begnügten sich, diese Substanzen bloß in der Siedhitze des Wassers zu trocknen, ohne darauf zu achten, ob sie noch Wasser enthalten oder nicht: zieht man diese Wassermenge von ihren Resultaten ab: so stimmen sie im Allgemeinen mit *Berzelius's* Analysen überein.

Später erinnert *Gay-Lussac* selbst, gegen die von ihm und *Thenard* aufgestellte Classification der Pflanzenkörper, daß sie Ausnahmen zulasse **); daß es, wenn der Körper, welchen man als ein säuerndes

*) *Thomson's Annals of Philos.* Vol. V. P. 178; wie auch *Gilbert's n. Ann.* X. 253.

**) *Annales de Chimie* Vol. XCI. P. 148. daraus in *Gilbert's n. Ann.* B. XVIII. S. 361. und *Schweigger's Journ.* B. XIV. S. 495. und *Ann. de Chim. et de Phys.* T. V. p. 295. Note und *Schw. Journ.* B. XXII. S. 446. N.

Princip betrachtet, im Ueberschuß vorhanden ist, nicht hinreichend sey, den Säurecharacter in einer Verbindung zu bestimmen; sondern daß es noch eines besondern Verhältnisses und einer ganz eigenen Disposition aller die Verbindung constituirenden Molécules bedürfe. Er fand z. B., daß die Essigsäure und der Holzstoff genau dieselbe Zusammensetzung haben, und doch sind die Eigenschaften beider Pflanzenkörper gar sehr von einander verschieden. Es ist dies, sagt *Gay-Lussac*, ein neuer Beweis, daß die Anordnung der Molécules in einem zusammengesetzten Körper den größten Einfluß auf den neutralen, sauern oder alkalischen Character desselben hat. Zucker, Gummi und Stärkmehl gehören gleichfalls hierher; denn diese Stoffe, obgleich aus denselben Elementen und in gleichem Verhältnisse zusammengesetzt, zeigen doch sehr verschiedene Eigenschaften.

Diese von *Gay-Lussac* ausgesprochene Ansicht von dem Einflusse der Anordnung der Molécules (arrangement des molécules, corpuscular arrangement) auf die chemische Beschaffenheit eines organischen Körpers, diese Ansicht, welche ich von mehreren andern ausgezeichneten Chemikern gleichfalls ausgesprochen finde *), erhält, wie ich glaube, nur dann eine bestimmte Deutung, wenn Sie meine Ansicht von der Grundmischung der Pflanzensubstanz, die ich weiter unten entwickeln werde, zum Grunde legen.

Fast gleichzeitig mit *Gay-Lussac* und *Thenard* arbeitete auch *Theodor von Saussure* in diesem Felde der analytischen Chemie, und wenn auch die Anzahl der Untersuchungen, die wir ihm verdanken, nicht sehr groß ist, so sind sie doch nichts desto weniger von entschiedenem Gewinn für die Wissenschaft. Er klärte die Natur des ölerzeugenden Gases auf, indem er zeigte, daß es ein wahres Kohlenwasser-

*) Vergl. *Hy. Davy* in s. Elem. der Agrikultur-Chemie übers. von *Wolff* S. 145. auch *Gilberts* neue Annal. B. XXIV. S. 377. *Berard* in den Ann. de Chim. et de Phys. T. V. 297. u. s. w.

stoffgas ist, welches aber doppelt so viel Kohlenstoff als das gewöhnliche, schon längst bekannte, Kohlenwasserstoffgas enthält *). Er stellte sehr interessante Versuche mit der Stärke, und dem daraus, durch langes Kochen in sehr verdünnter Schwefelsäure, erzeugten Stärkezucker an, wobei er auf analytischem und synthetischem Wege fand, daß letzterer nichts anderes als eine Verbindung von Stärke mit Wasser in fester Gestalt ist. Er verbrannte die vegetabilischen Substanzen in mit Sauerstoffgas gefüllten gläsernen Röhren, und verpuffte das Gasmisch in *Volta's* Eudiometer. Auf diese Weise analysirte er ausser der Stärke und dem Stärkezucker, den Weintraubenzucker, den Mannazucker, den Milchzucker, das arabische Gummi und den Tragantschleim. *Saussure* fand zwar in den drei ersten dieser Substanzen den Sauerstoff stets in einem größeren als zur Wasserbildung erforderlichen Verhältnisse; allein er glaubt doch nicht, daß der Ueberschuß des Sauerstoffs in diesen Pflanzenkörpern groß genug sey, um jenes 3te Gesetz *Gay-Lussac's* und *Thenard's* zu entkräften; gleichwohl gab ihm die Analyse der drei letzten Substanzen einen ziemlich beträchtlichen Ueberschuß an Sauerstoff. Und dann bemerkt er noch selbst, daß die überschüssigen Mengen von Sauerstoff und auch von Wasserstoff über das elementare Wasser wesentlich größer seyn können, als seine Analysen sie ihm gaben, weil die Siedhitze des Wassers, in der er die Pflanzenkörper trocknete, nicht hinreicht, sie vollkommen auszutrocknen und alles Wasser fortzutreiben. Dieses zufällige Wasser ergibt sich in den Analysen zugleich mit dem elementaren, und macht die Menge desselben im Vergleich mit den übrigen Bestandtheilen zu groß **).

*) *Annales de Chimie* Avril 1811; übers. in *Gilberts* n. Ann. XII. 349 fg. Vergl. *Berthollet's* ältere Untersuchungen mit brennbaren Gasarten, die er durch Destillation nasser Kohle und durch Zersetzung von Oel und von Kampher erhalten hatte; ebend. IV. 390 fg. und *Thomson* über das brennbare Gas, welches sich während der Destillation von Torf bildet; ebend. 417 fg.

**) *Bibl. britann.* 1814; übers. in *Gilb.* n. Ann. XIX. 129 fg.

Sie sehen, daß *Saussure* auf jene Gesetze viel zu halten scheint; indessen da die Resultate seiner und *Berzelius's* Analysen Ausnahmen zulassen, und ihr Urheber selbst an ihrer Allgemeinheit zweifelt: so bleibt uns wohl nichts anders übrig als sie zu verlassen, und zu versuchen, auf anderem Wege die Gesetze in der chemischen Organisation der Pflanzenkörper aufzufinden. Ich will aber, ehe ich Ihnen meine Ansichten hierüber mittheile, fortfahren, die weiteren Arbeiten der Chemiker in unserm Felde zu beleuchten.

Keines Chemikers Gedanken und Meinungen können unsere Aufmerksamkeit mehr spannen, als die des berühmten schwedischen Forschers, der der Verdienste so viele in Aufsuchung der Gesetzmäßigkeit in den Verbindungen der unorganischen Natur sich erworben. *Berzelius* stellte eine Reihe von analytischen Versuchen mit Pflanzenkörpern an. Sein Verfahren weicht etwas von dem der beiden französischen Chemiker ab. Er bediente sich jedoch wie diese, zur Verbrennung des zu untersuchenden Pflanzenkörpers, des überoxydirt salzsauren (chlorinsäuren) Kali, das er aber mit dem neun - bis zehnfachen Gewicht Kochsalz, welches vorher im Platintiegel geschmolzen worden, vermengte, um die Heftigkeit der Verbrennung zu mäßigen. Der Glasröhre, in welcher die Verbrennung geschah, wurde eine andere mit geglühtem salzsauren Kalk gefüllte, zur Absorption des sich erzeugenden Wassers, angepaßt; das sich entwickelnde Gas wurde in einem mit Quecksilber gefüllten Recipienten aufgefangen, und die Kohlensäure durch ätzendes Kali, in einem genau gewogenen, gläsernen Gefäße, das sich in dem Recipienten befand, absorbirt. Da *Berzelius* bei mehreren Versuchen, in dem entbundenen Sauerstoffgas auch nicht die kleinste Spur von Kohlenoxydgas entdecken konnte: so geht daraus hervor, daß die Verbrennung des Kohlenstoffs vollständig erfolgt, und der Pflanzenkörper, mittelst des Sauerstoffs vom überoxydirtsalzsauren Kali, ganz in kohlen-saures Gas und Wasser zerlegt worden war; weshalb auch das entbundene Gas im Wasserstoff - Eudiometer keiner weiteren Untersuchung be-

durfte. Auf diese Weise bestimmte er den Kohlenstoffgehalt aus dem kohlen sauren Gas, den Wasserstoffgehalt aus dem Wasser, und den Sauerstoffgehalt aus diesen beiden Verbindungen und dem überschüssigen Sauerstoff, nach Abzug desjenigen, der von dem überoxydirtsalzsauren Kali herrührte. *Berzelius* zog es vor, die Menge des kohlen sauren Gases dem Gewichte nach zu bestimmen; mir scheint freilich die Bestimmung nach dem Volumen genauer zu seyn; das erzeugte Wasser läßt sich übrigens auf keine andere Weise als durch Wägen schätzen, und es ist hier nur darauf zu sehen, daß alles genau gesammelt werde. *Berzelius* hat übrigens mehr Sorgfalt als die französischen Chemiker darauf verwendet, alles ausserwesentliche Wasser der vegetabilischen Substanzen zu entfernen, indem er sie in einem Sandbade, unter dem Recipienten der Luftpumpe durch Schwefelsäure, auf die bekannte Art entwässerte. Dadurch hielt sich *Berzelius* für versichert, daß die Pflanzensubstanzen, besonders wenn sie, wie er häufig that, im gebundenen Zustande, z. B. mit Bleioxyd, angewandt wurden, von allem Wasser befreit werden mußten. Einige Cautelen, die *Berzelius* theils selbst angiebt, theils aus dem Verfahren sich ergeben, sind übrigens zu beobachten; indess die ungemeine Sorgfalt und Genauigkeit, welche alle Arbeiten dieses trefflichen Chemikers auszeichnen, berechtigen uns, die Resultate seiner Analysen, der Wahrheit so viel wie möglich sich nähernd zu betrachten.

So viel, glaubte ich, hier von dem Verfahren *Berzelius's* anführen zu müssen, um wenigstens einigermaßen die Genauigkeit seiner Resultate beurtheilen zu können. Er analysirte auf diese Weise den Rohrzucker, die Stärke von Erdäpfeln, den Gerbestoff von Galläpfeln, das Mimosen-Gummi, den Milchzucker, die Benzoe-Schleim-Weinstein-Galläpfel-Zitronen-Essig-Bernstein- und Sauerkleesäure. Ich komme nun darauf, Ihnen seine Ansichten von der Gesetzmäßigkeit in den Mischungsverhältnissen der Pflanzenkörper mitzutheilen.

Der Unterschied zwischen der Zusammensetzung organischer und

unorganischer Körper, glaubt *Berzelius*, besteht darin, daß in der unorganischen Natur die Verbindungen der ersten Ordnung allezeit *zweifache* (binäre) sind, und daß in allen wenigstens einer der Bestandtheile als ein einfaches Atom oder Volumen (als Einheit) auftritt. Die organischen Körper hingegen sind insgesamt Verbindungen aus zwei oder mehreren brennbaren Körpern (Wasserstoff, Kohlenstoff, und, wo thierische Mischung Statt findet, Stickstoff) mit Sauerstoff, der gewöhnlich nur zureicht, einen von ihnen zu oxydiren, und in keiner solchen organischen Verbindung tritt nothwendig eines der Elemente als einfaches Atom oder Volumen (als Einheit) auf. Während also in der unorganischen Natur die größtmöglichste Einfachheit in der Zusammensetzung herrscht, werden die Verbindungsgesetze in der organischen immer verwickelter, je mehr die Zahl der Elemente wächst. Gleichwohl folgen die oxydirten Körper organischen Ursprungs, wenn sie sich mit einander oder mit zweifachen (binären) unorganischen Oxyden vereinigen, denselben Gesetzen, die bei Verbindungen unorganischer Körper herrschen; nämlich es ist stets der Sauerstoff in dem einen, ein Vielfaches von dem in dem andern, nach einer ganzen Zahl. *Berzelius* will die organischen Substanzen durchaus nicht betrachten, als Zusammensetzungen aus zwei oder mehreren binären Verbindungen, wie die Neutralsalze und Mineralien sind, sondern als drei- oder vierfache Oxyde, d. h. als Vereinigungen von zwei oder drei brennbaren Radicalen mit Sauerstoff.

Wasserstoff und Kohlenstoff mit Sauerstoff bilden die dreifachen Oxyde des Pflanzenreichs; kommt der Stickstoff hinzu: so entstehen die vierfachen Oxyde des Thierreichs (wiewohl auch der Stickstoff in Pflanzenkörpern gefunden wird, welche thierische Mischung haben). Je vollständiger aber die Organisation wird, desto mehr wächst die Zahl der Elemente; es kommen besonders noch diejenigen hinzu, welche in äußerst kleinen Quantitäten in die Verbindung eingehen. Solche Elemente sind: der Schwefel, Phosphor, das Kalium, Natrium, Calcium, Eisen, Silicium und Mangan. *Berzelius* nennt diese, *secundäre Elemente*,

worunter er übrigens nicht verstehen will, als seyen sie minder wesentlich für die Beschaffenheit der Körper, als die *primären*: nämlich Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff und Stickstoff.

Die Hauptbedingung der organischen Bildung scheint ihm eine elektrochemische Modification in den Elementen zu seyn, welche von der abweicht, die ihnen ursprünglich in der unorganischen Natur zukommt, und in dem Augenblick der Bildung eines organischen Körpers scheint diese neue elektrische Modification zu entstehen, von welcher hauptsächlich dessen chemische Eigenschaften abhängen, wiewohl das Verhältniß der Elemente nicht ohne Einfluß seyn wird. Kaum sind aber die Elemente aus dem organischen Körper entfernt: so streben sie ihre ursprüngliche elektrochemische Modification wieder zu gewinnen, und es ist eine Wirkung dieses Bestrebens, welches macht, daß sie gähren, und daß sie in Berührung mit Luft und Wasser, und in erhöhten Temperaturen sich zersetzen *).

Der Unterschied, den *Berzelius* zwischen Verbindungen der unorganischen und organischen Natur setzt, scheint mir nicht hinlänglich begründet zu seyn; denn es giebt auch unorganische Verbindungen, in denen nicht nothwendig einer der Bestandtheile als Einheit auftritt: z. B. das basisch schwefelsaure Kupferoxyd besteht, wenn man es nicht aus 1 Atom (nach *Berzelius* Volumen, nach *Richter* sehr passend Massentheil) Schwefelsäure und $1\frac{1}{2}$ Atom Kupferoxyd betrachten will, aus 2 Atomen Schwefelsäure und 3 Atomen Kupferoxyd; worin also weder die Schwefelsäure noch das Kupferoxyd als Einheit auftritt. Ich verweise Sie deshalb, um mich nicht zu weit von unserm Gegenstande zu entfernen.

*) Experiments to determine the definite Proportions, in which the Elements of Organic Nature are combined. By *Jac. Berzelius* in *Thoms. Annals of Philos.* Vol. IV. P. 323 fg. P. 401 fg. Vol. V. P. 93 fg. P. 174 fg. P. 260 fg.

entfernen, auf den hierüber von *Dalton* und *Thomson* auf der einen und *Berzelius* auf der andern Seite, geführten Streit *).

Die einzige Gesetzmäßigkeit, welche *Berzelius* in der organischen Natur zu finden glaubt, setzt er in die Vielfache der Sauerstoffantheile in den Verbindungen der organischen Körper; wie er überhaupt alle Gesetzmäßigkeit in chemischen Verbindungen, wenigstens der Art ihrer Berechnung nach, auf den Sauerstoff bezieht. Wenn *Berzelius* von den bestimmten Verhältnissen in der organischen Natur spricht, und sie auf ihr Verhalten zu unorganischen Körpern bezieht: so sagt dieß weiter nichts, als daß die organischen Körper, wenn sie unorganisch werden, den Gesetzen der unorganischen Natur gehorchen; wenn z. B. die Sauerkleesäure mit dem Bleioxyd oder mit irgend einer andern Base sich verbindet: so wird doch wohl Niemand glauben, daß sie in einer solchen Verbindung als organischer Körper enthalten seyn könne? — Die Sauerkleesäure wirkt hier lediglich als eine Säure, und es ist gleichviel, ob sie mineralischen oder vegetabilischen Ursprungs ist. Jenes Gesetz sagt also durchaus nichts anders, als daß ein organischer Körper, so wie er aufhört, organisch zu seyn, den Gesetzen der todten oder unorganischen Natur gehorchet; es stellt daher bloß die Beziehung des Körpers zur Aussenwelt dar. Ich meine, es ist ganz einerlei, ob Luft, Wasser und eine erhöhte Temperatur auf die organischen Körper *zersetzend* einwirken, oder ob unorganische Körper auf *chemischem Wege* sich mit ihnen verbinden: in beiden Fällen nämlich verlieren sie ihr Assimilirungsvermögen, vermöge dessen sie die todte Materie mit ihrer Substanz verbinden; sie legen ihre organische Natur ab und gehorchen den Gesetzen der unorganischen. Und wenn uns auch jenes Gesetz einen Maassstab für die Mischung der Pflanzenkörper abgeben könnte: so würde sich dieser doch bloß auf die wenigen Pflanzenkörper beschränken, die sich

***) Vergl. mein *Lehrbuch der Stöchiometrie*. Erlangen 1819. §. 49. S. auch S. 141.

mit unorganischen Körpern wirklich chemisch vereinigen lassen; also besonders auf die vegetabilischen Säuren, die nach *Berzelius's* eigener Aeusserung gleichsam den Uebergang von der unorganischen Natur in die organische bilden. Zwar besitzen auch einige andere vegetabilische Substanzen, als Zucker, Milchzucker, Gummi und Stärkmehl diese Fähigkeit; allein alle diese Substanzen sind nur nähere Bestandtheile der Pflanzenkörper, und nach *Berzelius* selbst, keine unveränderlichen, festbestehenden Verbindungen. Wie würde uns endlich jener Maassstab dienen können, wenn wir das Mischungsverhältniß einer Pflanze als Einheit ihres Seyns, betrachten wollten, deren nähere Bestandtheile wir nicht kennen, und die, wie oben gezeigt worden ist, auf keine Weise erforscht werden können? — *Berzelius* scheint ein besonderes Gewicht darauf zu legen, daß der Sauerstoff in einer organischen Verbindung gewöhnlich nur zureiche, einen von den brennbaren Körpern zu oxydiren, und dieser Umstand scheint ihn bewogen zu haben, sich die organischen Körper als zwei- oder dreifache Oxyde zu denken. Mir scheint, wie ich unten darthun werde, dieser Punct nicht von so großer Bedeutung zu seyn. Ich halte es endlich auch nicht für statthaft, in den Elementen der organischen Körper eine besondere elektrochemische Modification vorauszusetzen, die von der abweicht, die ihnen ursprünglich in der unorganischen Natur zukömmt; denn ich hoffe unten zu zeigen, daß wir damit ausreichen, eine und dieselbe elektrochemische Modification in beiden Naturreichen anzunehmen: nämlich die, welche auf den rein elektrischen Gegensatz gegründet ist.

Es ist mir nun noch übrig, ehe ich es wage, die Fragen zu beantworten, welche Sie mir vorlegen, die Ansichten einiger anderer Naturforscher von der chemischen Constitution der Pflanzenkörper, etwas genauer zu entwickeln. *Meinecke* sucht wie *Gay-Lussac* und mehrere andere (s. oben S. 35.) die Verschiedenheit organischer Körper, die einander vollkommen gleichen an Zahl und Menge der Bestandtheile, in der besondern Anordnung der Bestandtheile jedes solchen Körpers. Um

z. B. die Verschiedenheit der Stärke, des Gummis und des Zuckers, deren Bestandtheile nach den Analysen qualitativ und quantitativ einander völlig gleich sind, zu erklären, denkt er sich die Stärke aus gleichen Antheilen Kohlenstoff und Wasser, das Gummi aus einer Verbindung von gleichen Antheilen ölerzeugenden Gas, Kohlenoxyd und Wasser, und den Zucker aus gleichen Antheilen Kohlenwasserstoff und Kohlensäure, zusammengesetzt. Auf gleiche Weise denkt er sich die Pflanzensäuren, den Alkohol, Aether, das Olivenöl, den Terpenthin und Kopal aus den einzelnen Verbindungen der letzten Elemente der Pflanzenkörper zusammengesetzt *). Schon vor *Meinecke* hat *Th. von Sausure* dargethan, daß der Alkohol als eine Verbindung aus 61,13 Th. ölerzeugendem Gas und 38,87 Th. Wasser; der Schwefeläther als eine Verbindung aus 80 Th. ölerzeugendem Gas und 20 Th. Wasser betrachtet werden könne **), und von *Döbereiner* entlehnte jener die Ansicht von der Zusammensetzung der Sauerkleesäure, des Zuckers und Alkohols. *Döbereiner* zeigte nämlich, daß die Sauerkleesäure für eine Verbindung aus Kohlensäure und Kohlenoxyd ***), der Zucker aus Kohlensäure und Kohlenwasserstoff und der Alkohol aus 3 Antheilen Kohlenwasserstoff mit 1 Antheil Kohlensäure, zu halten sey †). Noch bestimmter sprach sich aber dieser Chemiker über die chemische Constitution der organischen Substanzen aus, indem er sagt: „nach meiner Ansicht sind sie *salzartige* Zusammensetzungen einfacher Verbindungen des Kohlenstoffs mit Sauerstoff, Wasserstoff oder Stickstoff in verschiedenen aber bestimmten Verhältnissen ††).“

*) Dess. chemische Meßkunst etc. 2ter Th. Halle u. Leipzig 1817. S. 142 — 152.

**) Biblioth. brit. LIV. Dec. 1813.

***) *Schweigger's Journal* (1816) B. XVI. S. 105.

†) ebend. B. XVII. 188.

††) ebend. (1818) B. XXIII. S. 70.

Sie ersehen hieraus, daß durch die vorhin genannten Chemiker die Möglichkeit dargethan worden, mehrere Pflanzenkörper als Zusammensetzungen aus binären Verbindungen zu denken. Daß dieß die einzige Ansicht ist, welche uns eine wissenschaftliche Einsicht in die chemische Constitution der Pflanzenkörper darbietet, hoffe ich nun zu zeigen.

Wenn wir eine *chemische* Verbindung zerlegten, und fänden Kalium, Sauerstoff und Schwefel als Bestandtheile: so würde gewiß Niemand zweifeln, daß diese Verbindung entweder schwefligsaures oder schwefelsaures Kali gewesen seyn müsse. Eben so, wenn wir eine *eigenthümliche* Gasart untersuchten, die aus Kohlenstoff und Sauerstoff besteht: so würden wir sie gewiß für nichts anders halten als für Kohlenoxyd- oder kohlensaures Gas. Wenn wir nun aber einen Pflanzenkörper zerlegen, dessen Bestandtheile Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlenstoff sind; wie läßt sich hier denken, daß die Elemente mit einander verbunden waren? — Wir können uns vorstellen, daß die Verbindung eine *ternäre* gewesen sey, d. h. daß keines der Elemente mit dem andern *besonders* verbunden, sondern daß alle drei zu *einem* Ganzen vereinigt waren. Oder wir können uns vorstellen, daß immer je einer der Bestandtheile mit dem andern zu einer *binären* Verbindung und diese verschiedenen binären Verbindungen wieder mit einander zu *einem* Ganzen vereinigt waren. Die Analyse, sofern sie uns bloß die Verhältnisse der letzten Elemente giebt, kann hierüber unmittelbar nicht entscheiden; denn das Resultat derselben wird sich stets gleich bleiben, es mögen die Elemente auf diese oder jene Art mit einander verbunden seyn. Allein finden wir, daß genaue Analysen von Pflanzenkörpern die Elemente in einem solchen Verhältnisse geben, daß stets je eines derselben mit einem andern, in dem Verhältnisse verbunden gedacht werden kann, welches dem Mischungsverhältnisse entspricht, in dem beide sich wirklich zu einer binären Verbindung vereinigen: so wäre wenigstens diese Ansicht für zulässig zu erachten; und so fern wir in der Natur überhaupt nur durch Induction schliessen können: so würde in diesem Falle der Schluß,

daß *alle* Pflanzenkörper aus solchen binären Verbindungen zusammengesetzt seyn möchten, ganz folgerecht seyn. Daß dieß nun bei einigen Pflanzenkörpern der Fall ist, haben Sie oben gesehen, und wollen wir es bei diesen als Gesetz aufstellen: so möchte es wohl mehr als unstatthaft seyn, wenn man dieses Gesetz nicht auch auf alle übrigen Pflanzenkörper ausdehnen wollte. Denn möchte man auch einwenden, jene Pflanzenkörper sind ja nur nähere Bestandtheile der Pflanzen, nicht aber die Pflanzen selbst: so läßt sich darauf erwiedern, was von jedem Theile für sich gilt, muß doch wohl auch von den zu einem Ganzen verbundenen Theilen gelten; und sofern in den wenigsten Fällen, oder, wie aus dem Obigen erhellet, vielleicht niemals, ein Pflanzenkörper in seine nähern Bestandtheile rein zerlegt werden kann: so muß die Analyse einer *ganzen* Pflanze, das mittlere Resultat aller ihrer Theile geben, und auch dieses Resultat wird sich unter jener Voraussetzung nach binären Verbindungen ordnen lassen.

So weit leitet uns die Erfahrung; und läge es nicht ausser den Gränzen der Thätigkeit *eines* Menschenlebens: so könnte man an der Hand der Erfahrung die Bestätigung dieser Ansicht auch bei *allen übrigen* Pflanzenkörpern versuchen. Wir haben indess, wie es mir scheint, festen Fuß gefaßt, und es ist wohl nicht eine Verirrung zu fürchten, wenn wir von einem Standpuncte aus, auf den die neuere Chemie uns erhoben, diesen Gegenstand in weitere Erörterung ziehen.

Seitdem wir wissen, daß die Elektricität mit der Chemie in der nächsten Verbindung steht, ja daß Elektricität und Chemismus ein und dasselbe sind, ist es uns bekannt, daß die Verbindung zweier differenten Körper immer durch ein entgegengesetzt elektrisches (polares) Verhältniß bedingt wird: der negative Sauerstoff verbindet sich mit dem positiven Metall, die negative Säure mit der positiven Base u. s. w. Wir finden, je differenter zwei Körper sind, desto energischer vereinigen sie sich, und das Product ist eine, in *einem festen und unveränderlichen* Verhältnisse bestehende Verbindung: der negative Sauerstoff vereinigt sich

z. B. mit dem positiven Wasserstoff mit großer Energie stets zu Wasser in einem unveränderlichen Verhältnisse; hingegen je weniger different zwei Körper sind, desto schwächer (leicht zersetzbar) ist auch die Verbindung, und sie kann in mehreren Verhältnissen erfolgen: so vereinigen sich z. B. der Schwefel und Arsenik, zwischen welchen beiden keine sehr intensive Spannung Statt findet, in sehr verschiedenen Mischungsverhältnissen, wie *Berzelius* uns neuerdings *) belehrt hat. Vielleicht könnten wir überhaupt den Satz aufstellen, daß die Anzahl der zwischen zwei Körpern möglichen Verbindungsverhältnisse gewissermaßen in einem umgekehrten Verhältnisse mit dem Grade ihrer elektrischen Spannung stehe, und vielleicht sind die beiden Polarstoffe, Sauerstoff und Wasserstoff die einzigen, welche sich nur in einem Verhältnisse mit einander verbinden; obwohl wir auch zwischen andern elementaren Stoffen, wie z. B. zwischen Wasserstoff und Stickstoff nur ein einziges Verbindungsverhältnis kennen. Daß dieser Satz von wichtiger Bedeutung wäre, wenn er zum Gesetz erhoben werden könnte, indem wir dann die elektrische Spannung zwischen zwei Körpern aus der Anzahl ihrer Verbindungsverhältnisse bestimmen könnten, werden Sie mir zugeben; doch ich spreche ihn hier bloß als Vermuthung aus.

Gemäß der elektrischen Spannung verbinden sich stets nur je zwei Körper mit einander; dies ist, so weit das Gebiet der unorganischen Chemie sich erstreckt, wohl eine ausgemachte Thatsache; denn wenn wir auch, wie z. B. bei den Doppelsalzen, drei Körper mit einander verbunden finden: so ist bekanntlich eine solche Verbindung nicht anders als eine Vereinigung binärer Verbindungen zu betrachten, und auch Verbindungen aus drei elementaren Stoffen, welche nicht auf ähnliche Weise wie die Doppelsalze verbunden sind, müssen doch immer so betrachtet werden, daß je zwei davon mit einander, und diese Verbindung aus zweien wieder mit dem dritten Stoff vereinigt ist. Wir dürfen über-

*) *Schw. Journ.* XXIII. 186.

haupt nicht vergessen, daß gemäß jener elektrischen Spannung, Verbindungen erfolgen, gleichviel ob einer der Bestandtheile schon eine Verbindung darstellt oder einfach ist.

In der organischen Natur finden wir, wenn ein Körper die reine Pflanzenmischung hat, stets drei Elemente, Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlenstoff mit einander verbunden; es entsteht daher die Frage: ist es vielleicht das Eigenthümliche der Pflanzenkörper, daß hier stets drei Körper mit einander in Verbindung treten, welche durch eine besondere elektrochemische Modification bedingt ist, oder sind auch hier immer nur je zwei Körper mit einander verbunden? — Von dem elektrochemischen Standpunkte aus, läßt sich die Möglichkeit der erstern Annahme nicht wohl einsehen; denn sofern eine jede chemische Verbindung durch ein polar - elektrisches Verhältniß bedingt ist, kann sie nur zwischen zwei Körpern möglich seyn. Wir wollen z. B. annehmen, der Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlenstoff treten in irgend einer Form zu einer chemischen Verbindung zusammen: so wird zwischen dem Sauerstoff und Wasserstoff ein solches elektrochemisches Verhältniß Statt finden, daß der erstere $-E$, der andere $+E$ ist; der Kohlenstoff hingegen wird in Beziehung auf den negativen Sauerstoff $+E$, und in Beziehung auf den positiven Wasserstoff $-E$ seyn; da er aber unmöglich beides zugleich seyn kann: so kann er nicht ungetheilt in die Verbindung eingehen; sondern er wird sich theilen, und der eine Theil mit $+E$ mit dem Sauerstoff, und der andere mit $-E$ mit dem Wasserstoff, binäre Verbindungen bilden.

Sonach könnte also, wenn Sie meine Schlüsse zugeben, ein Körper von vegetabilischer Mischung nur aus den binären Verbindungen, welche nach den bisherigen Erfahrungen, zwischen Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlenstoff Statt finden können: nämlich aus *Wasser*, *Kohlenoxydgas*, *kohlensaurem Gas*, *ölerzeugendem Gas*, und *Kohlenwasserstoffgas* gebildet werden.

Ich sage ein Pflanzenkörper wird aus diesen binären Verbindungen

gebildet; ich behaupte aber nicht, er *besteht* aus ihnen; denn beides scheint mir von einander unterschieden werden zu müssen. Von den Bestandtheilen eines Pflanzenkörpers kann man wohl nur in chemischer Beziehung sprechen; so wie aber die Elemente zu einem zusammengesetzten Körper vereint, ein organisches Ganzes darstellen, hört er auf, ein chemisches Product zu seyn: die todte Materie ist lebendig geworden, und mit dem Leben verschwinden alle chemische Verhältnisse in der Einheit *einer* Substanz. Der Uebergang aus dem Unorganischen in das Organische kann aber nicht *unmittelbar* erfolgen; denn so fern das Unorganische dem Organischen entgegengesetzt gedacht wird, muß ein Mittelzustand existiren, in welchem die chemischen Verhältnisse im Verschwinden begriffen sind; ein Zustand also, der gleichsam als der Indifferenzpunkt zwischen dem Unorganischen und Organischen zu setzen ist. Dieser Zustand hat hier dieselbe Bedeutung, wie ein Zeitdifferential der Bewegung in der Dynamik; denn er kann nicht als ein dauernder betrachtet werden: in ihm sind noch die elektrochemischen Verhältnisse, so wie sie sich in der ganzen Natur offenbaren, wirksam; zugleich beginnt aber auch der Selbstbestand des Lebens. Man kann daher in diesem Mittelzustande die sich organisirende Materie sowohl von chemischer als physiologischer Seite betrachten; von jener betrachtet, kann sie aber dann nur unter der Form binärer Verbindungen gedacht werden; denn sie wird durch den elektrochemischen Gegensatz bedingt. Es ergiebt sich hieraus, daß von den Bestandtheilen der Pflanzenkörper nur im uneigentlichen Sinn die Rede seyn kann; wir können daher auch nur sagen, die Pflanzenkörper lösen sich in binäre Verbindungen auf, bilden sich daher wohl auch aus ihnen, (mag man sich dieselben, wenn es bequemer scheint, auch als Nahrungsmittel des lebendigen Körpers denken), nicht aber sie bestehen aus ihnen.

So wie wir hier die Synthese der Pflanzenkörper, oder mit andern Worten, ihre Entwicklung aus der unorganischen Materie abgeleitet haben, eben so können wir ihre Analyse, d. h. ihren Uebergang zur todten
Materie

Materie verfolgen. Es kann hier eben so wenig wie dort ein unmittelbarer Uebergang Statt finden: die Analyse des Pflanzenkörpers, sey es nun die von selbst durch den Proceß der Fäulniß und Verwesung erfolgende, oder die auf künstlich chemischem Wege bewirkte, muß ebenfalls in herabsteigender Linie jenen Mittelzustand durchlaufen, in welchem die elektrochemischen Verhältnisse in Wirksamkeit treten, und binäre Verbindungen darstellen, die wirklich als die bekannten Producte der Entmischung zum Vorschein kommen, während das organische Leben schwindet.

Sie sehen, daß meine aus dem elektrochemischen Standpunkte abgeleiteten Ansichten ganz mit denen *Cavendish's* (nach dem damaligen Standpunkte der Wissenschaft) und *Döbereiner's* zusammenfallen. Ich glaube übrigens die Grenzlinie gezogen zu haben, so weit die Chemie in die organische Natur eingreift, und wo sie von dem Schauplatze ab, und die Physiologie im engeren Sinn an ihre Stelle tritt.

Es ist mir nun, ehe ich diesen Gegenstand auf mathematischem Wege weiter verfolge, noch übrig zu sprechen: 1) von den binären Verbindungen des Stickstoffs mit den andern Elementen; denn obgleich ich mich in gegenwärtiger Untersuchung bloß auf diejenigen Substanzen beschränke, welche von rein vegetabilischer Mischung sind: so kann ich, da der Stickstoff zur Mischung mehrerer Pflanzenkörper gehört, doch nicht umgehen, über seine binären Verbindungen meine Ansichten Ihnen mitzutheilen; 2) von denjenigen Bestandtheilen in den Pflanzenkörpern, welche in äußerst geringen Mengen in denselben angetroffen werden, aber nicht minder wesentlich für die chemische Constitution derselben zu seyn scheinen.

Der Stickstoff geht bekanntlich 5 Verbindungen mit dem Sauerstoff ein, welche sind: atmosphärische Luft, oxydirtes Stickgas, Salpetergas, salpetrige Säure und Salpetersäure, wozu nach den neuen Beobachtungen *Gay-Lussac's* *) noch eine zweite salpetrige Säure hinzukommt. Mit

*) *Gilbert's n. Ann.* XXVIII. 43. und *Schweigger's Journ.* XVII. 237.

dem Wasserstoff verbindet sich der Stickstoff, so viel wir wissen, bloß zu Ammoniak. *Gay-Lussac* war der erste, der uns mit einer Verbindung des Stickstoffs mit Kohlenstoff bekannt machte, welche die Basis der Blausäure oder das Cyanogen ist *). Ebenderselbe fand eine andere Verbindung beider Elemente, in welcher der Kohlenstoff $1\frac{1}{2}$ mal so viel beträgt, als in jener; er nannte sie *Azoture de Carbone* **). *Döbereiner* hält die thierische Kohle ebenfalls für eine eigene Verbindung aus Stickstoff und Kohlenstoff, worin letzterer 2mal so viel beträgt als in der vorhergehenden ***). Endlich *von Grotthufs* fand in der Anthrazothionsäure (Schwefelblausäure) den Stickstoff und Kohlenstoff wieder in einem andern Verhältnisse, nämlich letzteren nur halb so viel betragend als in dem Cyanogen ****).

Wir sehen hieraus, daß durch das Hinzutreten des Stickstoffs die Zahl unserer binären Verbindungen sich beträchtlich vermehrt. Allein ich bin der Meinung, daß alle Verbindungen des Stickstoffs mit Sauerstoff hievon ausgeschlossen werden müssen, und zwar aus folgenden Gründen: Man hat, wie uns bekannt ist, noch aus keinem einzigen stickstoffhaltigen organischen Körper durch Verbrennung Salpetersäure oder irgend eine andere Verbindung des Stickstoffs mit Sauerstoff erhalten; sondern stets Ammoniak im kohlen sauren Zustande, und häufig, doch nicht bei allen Substanzen, gegen das Ende des Processes Blausäure, wie dieß namentlich bei der Salmiak- und Berlinerblau-Bereitung der Fall ist. Es geht hieraus hervor, daß der Stickstoff sich bloß zwischen dem Wasserstoff und Kohlenstoff theilt, und vielleicht findet es auch bei den übrigen Elementen Statt, daß sich jedes nur immer zwi-

*) *Schweigger's Journ.* XVI. 18. und *Gilbert's n. Ann.* XXIII. 25.

**) *Schw. Journ.* ebend. S. 20. vergl. *Döbereiner* eb. S. 90.

***) ebend. XVI. 89.

****) ebend. XX. 257.

schen zweien theilt. Man weiß ferner, daß die Salpetersäureerzeugung in den Salpeterplantagen erst dann beginnt, wenn der Fäulnißproceß der organischen Substanzen beendigt ist, und die Verwesung eintritt; also erst dann, wenn diese Substanzen ihrer organischen Structur und grolsentheils ihrer flüchtigen Bestandtheile beraubt worden. Alle Umstände, welche die Fäulniß und Verwesung begünstigen, als der freie Zutritt der atmosphärischen Luft, ein gewisses Maafs von Wärme und Feuchtigkeit, nehmen unmittelbar Antheil an der Erzeugung der Salpetersäure. Eine wesentliche Bedingung für diesen Proceß ist ferner die Gegenwart alkalischer und kalkerdiger Substanzen, und nach *Vauquelin* dienen dieselben nicht bloß dazu, der sich bildenden Salpetersäure eine Basis darzubieten, sondern sie sind unumgänglich nöthig, um die Vereinigung der Elemente der Säure zu bewirken, indem sie gleichsam ein Vermögen aus den stickstoffhaltigen Substanzen entwickeln, wodurch erst die Verbindung des Stickstoffs mit dem Sauerstoff bestimmt wird.

Aus allem diesem folgt, daß die Salpetersäure als das letzte Product aus den organischen Substanzen und mehreren äußern Agentien betrachtet werden müsse, und ein solches Product kann man unmöglich für eine binäre Verbindung halten, aus der organische Körper sich bilden. Da diese Säure noch überdies so zerstörende Wirkungen auf alle organischen Substanzen ausübt: so läßt sich nicht wohl denken, daß sie auf eine andere Weise als durch ein Alkali neutralisirt in ihnen vorkommen könne. In diesem Zustande, nämlich als salpetersaures Kali, wurde sie auch schon von *Lemery* *) im J. 1717, und nachher von mehreren andern Chemikern in verschiedenen Pflanzen entdeckt. Nach *Klaproth* macht der Salpeter oft zufällig einen Bestandtheil mancher Pflanzen aus: so fand er in dem eingekochten Saft der Runkelrüben, die auf einer Stelle, wo ein Schaafstall gestanden hatte, gebaut worden waren, eine reichliche Menge Salpeter. Dieser Umstand beeinträchtigt aber das oben

*) *Crell's neues chem. Archiv*, I. 168.

gesagte ganz und gar nicht; denn da wir weder das Entstehen noch Bestehen der secundären Bestandtheile der Pflanzenkörper kennen: so können wir auch nichts über ihre Anordnung in denselben sagen.

Wenn wir aber nun die Verbindungen des Stickstoffs mit Sauerstoff ausschliessen: so bleiben uns bloß die binären Verbindungen des Stickstoffs mit Wasserstoff und Kohlenstoff übrig. Was die letzteren betrifft: so sind wir damit noch nicht im Reinen, und ehe sie nicht genau dargestellt und zerlegt worden sind, läßt sich nichts über ihre Anordnung in den organischen Körpern von thierischer Mischung vorbringen; indels hoffe ich, daß wir von diesem Ziele nicht sehr weit mehr entfernt seyn werden.

Was nun noch die Bestandtheile der Pflanzenkörper betrifft, welche in so äußerst geringen Quantitäten in denselben gefunden werden, so haben mehrere geschätzte Chemiker über ihr Entstehen und Bestehen, Untersuchungen angestellt, und ich glaube, es wird nicht an unrechter Stelle seyn, die Resultate derselben hier darzulegen.

Schrader, veranlaßt durch die bekannte Preisaufgabe der Berliner Akademie, stellte folgende Versuche an*). Er liefs in Schwefelblumen, und ein andermal in mit Baumwolle gefüllten Töpfen, mehrere Getraidearten wachsen, und fand in den gewachsenen Halmen eben so viel erdige Bestandtheile als in denjenigen, welche in gewöhnlichem Erdreiche vegetirten. Roggenkörner liefs er in Schaalen von Berliner Sanitätsgeschirr vegetiren, indem er sie von Zeit zu Zeit mit dest. Wasser, das reichlich mit Kohlensäure angeschwängert war, begoß. Die Körner erlangten im Durchschnitt eine Höhe von 6 — 10 Zoll, und der ganze Inhalt der Gefäße eingeäschert, zeigte eine beträchtliche Zunahme an erdigen Bestandtheilen. *Hassenfratz* stellte Untersuchungen**) über das Wachsen der

*) *Gehlen's* neues Journal d. Chem. B. III. S. 523. fg.; vergl. auch *Einhof* ebend. S. 563.

**) *Crell's* chem. Ann. 1796. I. 268.

Pflanzen im Wasser an, und schloß daraus, daß das Wachsthum derselben bloß eine Vermehrung des Wassers, des Sauerstoffs und Wärmestoffs sey. *Saussure* d. J. *) fand häufig Erden in Pflanzen, welche nicht im Pflanzenboden waren, und diesen durch das Wachsthum der Pflanzen öfters so verändert, daß er darin Erden antraf, welche weder vorher in ihm zu finden, noch auch nachher in den Pflanzen enthalten waren. *Braconnot* **) säete Senfkörner in Bleiglätte, Schwefelblumen und Schrot, und begoß sie häufig mit dest. Wasser. Sie wuchsen, blühten und lieferten gut ausgebildete Schoten. Die Pflanzen gaben beim nachherigen Einäschern beträchtlich viel erdige Theile. Eben so lieferten Radiese (*Raphanus sativus*), die in Flusssand eingesät wurden, Radiespflanzen, die eingeäschert eine beträchtliche Menge Pottasche, und einige andere Salze gaben. *Vauquelin* ***) ist zwar der Meinung, daß es gewisse erdige Substanzen giebt, welche unverändert aus dem Boden, in welchem sie enthalten sind, in die Gewächse übergehen; allein er giebt doch zu, daß auch andere in den Gewächsen sich erst bilden.

Da man in den meisten dieser Versuchen die erdigen Bestandtheile nicht vom Pflanzenboden ableiten kann: so bleibt nichts anders übrig, als ihre Entstehung dem Vegetationsproceß selbst zuzuschreiben. Wie kann man, bemerkt *Schrader* sehr richtig, die Pflanze, da sie ein mit Lebenskraft begabter Körper ist, bloß für eine hydraulische Maschine halten, worin mechanische Operationen Statt finden, so wie wir dieselben ausser dem lebenden organischen Körper kennen. Sollten die Pflanzengefäße rohe zusammengesetzte Nahrungsmittel, z. B. ein erdehaltiges Wasser, oder Erden durch Kohlensäure im Wasser gelöst aufnehmen? —

*) Vom Einflusse des Bodens auf die Bestandtheile der Pflanzen, in *Scherer's Journ. d. Chem. B. IX. S. 644. fg.*

**) Untersuchungen über die Assimilirungskraft der Gewächse in *Gehlen's Journ. für Chem. und Phys. B. IX. S. 130. fg.*

***) *Scherer's Journal der Chem. B. II. S. 289.*

Mehrere Versuche beweisen, daß dies nicht so seyn könne. *Duhamel* und *Senebier* fanden, daß Wasser, welches fremdartige Substanzen aufgelöst enthält, zur Unterhaltung des Wachstums sich nicht gut eigne, sondern denselben aufhalte. *Hales*, *Touvenel*, *Kraft*, *Alston* und mehrere Naturforscher haben vergebens versucht, andere Flüssigkeiten zur Ernährung der Pflanzen anzuwenden, oder dem Wasser, das dazu dienen sollte, verschiedene Salze zuzusetzen; sie konnten nur in reinem Wasser die Pflanzen erhalten, und auch bei der Analyse derselben, die angewandten Salze nicht wieder finden. *Schrader* *) begoß sehr häufig Roggenkörner, die in einem mit gewöhnlicher Gartenerde gefüllten Gefäß gesäet waren, mit kohlensaurem dest. Wasser, worin so viel Baryt, als es aufnehmen konnte, aufgelöst war. Nachdem die Halme lange genug vegetirt hatten, schnitt er sie ab, äscherte sie in einem Silbertiegel ein, und prüfte die Asche auf Baryt; allein es zeigte sich auch keine Spur davon. *Braconnot* **) vermochte nie Dinte, in welcher Samen keimten, in die Gefäße der Pflanzen aufzuführen.

Wenn uns auch diese Versuche überzeugen, daß durch den Vegetationsproceß erdige oder feuerbeständige Stoffe in den Pflanzen erzeugt werden: so bleibt uns doch noch zu untersuchen übrig, ob jene Bestandtheile schon vor der Verbrennung in den Pflanzen existiren oder ob sie ein Product der Verbrennung sind. *Schrader* meint, niemand wird wohl vermuthen, daß sie Producte der Operation des Verbrennens und Einäscherns seyn können. Allein *Gehlen* ***) erinnert dagegen sehr richtig, daß sich gegen die Möglichkeit dieser Annahme nicht das Geringste einwenden lasse; denn so wie nach *Schrader's* eigener Annahme, diese erdigen Stoffe einem organisch-chemischen Proceß ihre Entstehung verdanken; eben so gut können sie auch in einem bloß chemi-

*) a. o. a. O.

**) a. o. a. O.

***) dessen neues Journal der Chemie. B. III. S. 530.

schen erzeugt werden. Schon *Ingenhousz* *) hielt es für höchst wahrscheinlich, daß sie mit Hülfe des Feuers, aus dem Wasser- und Stickstoff, (ohne Zweifel wegen der analogen Zusammensetzung des Ammoniaks) gebildet werden können.

Mir scheint die Beantwortung dieser Frage einen doppelten Gesichtspunct zuzulassen. Es kann nämlich erstens die Rede seyn von den feuerbeständigen Stoffen, welche in den Pflanzensäften mit irgend einer Pflanzensäure verbunden sich befinden, und zweitens von denjenigen, die in der Pflanzensubstanz selbst als integrirende Bestandtheile enthalten seyn sollen. Was das erstere betrifft: so ist wohl schon nach der Analogie zu schliessen, daß, so wie sehr viele Pflanzensäfte freie Säure (Pflanzensäuren) zeigen, andere eben so gut den Gegensatz derselben, d. i. Alkalien enthalten können; und dieß hat auch aufs Neue *Peschier*, ein Apotheker zu Geneve **) dargethan. Dieser schied nämlich aus den Säften des Zuckerrohrs, der rothen Rübe, der Weintraube u. s. w. mittelst *Magnesia Kali* ab; er irrt aber, wenn er glaubt, daß die Hypothese von der Erzeugung des Kali während der Verbrennung schon längst für grundlos erklärt worden; wenigstens beweisen seine Versuche nichts dafür und nichts dagegen. Nur dann könnten sie als Beweise gelten, wenn *Peschier* die nach mehrmaligem Auskochen übrig gebliebene Pflanzensubstanz eingeäschert, und in dem Rückstande Kali oder nicht mehr gefunden hätte.

*) *Scherer's Journ. d. Chem. B. I. S. 532.*

**) *Annales de Chim. et de Phys. T. IX. P. 99.* Vor kurzem hat die holländische Societät d. W. die Preisfrage aufgegeben: Welches ist der Ursprung der Pottasche, die man aus der Asche der Bäume und Pflanzen erhält u. s. w. Die Beantwortung dieser Frage von *John* ist mir aber nicht zu Gesichte gekommen. *S. Schw. J. B. XIX. S. 95.* Vergl. einige andere von derselben Societät aufgegebenen, mit unserm Gegenstande in naher Beziehung stehenden Preisaufgaben, ebend. S. 100. No. I. S. 101. No. V. ebend. B. XX. S. 102. No. I. u. II.; die übrigens noch nicht gelöst sind.

Die Vorstellung, daß die erdigen Bestandtheile der Pflanzen, Producte der Verbrennung und Einäscherung seyen, ist nach meiner Ansicht keineswegs unhaltbar; denn eben so wenig als wir uns denken können, daß die binären Verbindungen, welche wir erhalten, wenn wir organische Körper auf trockenem Weg zerlegen, als *solche* in dem lebenden Körper existiren; eben so wenig können wir annehmen, daß die erdigen Bestandtheile, welche sich nach gänzlicher Zerstörung der Pflanzenkörper vorfinden, als solche in ihnen schon vorhanden waren. Die organischen Körper haben nach meiner Meinung eben das Eigenthümliche, daß sie keines der Producte, die sich nach ihrer chemischen Zerlegung darstellen, so lange sie organisch sind, als solches enthalten, sondern daß in ihnen alle durch das Leben zur Einheit des Seyns verbunden sind.

Dies mag übrigens seyn wie es will, so müssen wir uns immer noch die Frage aufwerfen: aus welchen Elementen erzeugen sich die erdigen Bestandtheile? —

Schon *Fourcroy* sprach die Vermuthung aus, daß die alkalischen Substanzen Stickstoff enthalten möchten. *Van Mons**) und *Curadeau***) glaubten das Kali in Stickstoff und Wasserstoff wirklich zerlegt zu haben. Allein allen den von diesen beiden Chemikern angestellten Versuchen geht die nöthige Bestätigung ab, und man kann eigentlich bloß analogisch schließen, daß die feuerbeständigen Alkalien, wie das Ammoniak aus Wasserstoff und Stickstoff zusammengesetzt seyen. Durch *Hy. Davy* wurde endlich das Kali in einen Metallkörper und Sauerstoff wirklich zerlegt, und gegenwärtig wissen wir, daß die beiden feuerbeständigen Alkalien so wie alle Erden nichts anders als Metalloxyde sind. Da uns nun, was die Zerlegbarkeit der Metalle betrifft, die Erfahrung durchaus verläßt:

*) *Gren's neues Journal der Physik*. III. 228.

**) *Scherer's Journal der Chemie*. II. 117.

läßt: so müssen wir uns bloß mit einigen Vermuthungen über die mögliche Entstehung derselben aus den Elementen der Pflanzenkörper begnügen. Da es nicht wahrscheinlich ist, daß die Metalle ausser dem Sauerstoff, den sie aufnehmen, auch in ihrer Mischung denselben enthalten: so bleiben uns bloß der Wasserstoff, Kohlenstoff und Stickstoff als mögliche Elemente dieser Körper übrig; und man muß annehmen, daß sich dieselben entweder aus allen dreien, oder aus je zweien, oder aus nur einem dieser Elemente bilden.

Nach *Kirwan's* bekannter Hypothese sind das Phlogiston der Alten und das Wasserstoffgas identisch; wenn man daher nach der Ansicht der Phlogistiker, das Phlogiston als ein allen brennbaren Körpern, und mit hin auch den Metallen gemeinsames Wesen betrachtet *): so könnte man nach jener Vorstellung den Wasserstoff für einen, allen Metallen gemeinsamen Bestandtheil halten, und da der Wasserstoff und die Metalle einen hohen Grad von Brennbarkeit mit einander gemein haben, so ist auch diese Hypothese nicht für ganz unzulässig zu nehmen. Und wenn sich, wie der Engländer *Prout* **) gefunden hat, bestätigen sollte, daß die Verhältniszahl des Wasserstoffs ein gemeinschaftliches Maas der Verhältniszahlen aller übrigen, für einfach gehaltenen Körper, und mit hin auch der Metalle ist, oder mit andern Worten, daß die Verhältniszahlen der letzteren, Vielfache von der Verhältniszahl des Wasserstoffs sind ***): so gewinnt diese Hypothese sogar Wahrscheinlichkeit; und man könnte, wie *Prout* meint ****), in dem Wasserstoff, die *πρώτη ὕλη* der Alten, d. h. in ihm denjenigen Urstoff erkennen, aus dem sich alle übrigen Stoffe erzeugen. Wenn es erlaubt ist, diese Hypothese weiter zu verfolgen: so könnte man also annehmen, daß das Kalium aus 40,

*) Vergl. *Hy. Davy* in *Schweigg. Journ.* B. V. S. 357 fg.

**) *Thomson's Annals* Vol. VI. P. 321. fg. s. auch meine *Stöchiometrie* §. 54.

***) Vergl. übrigens meine Bemerkungen a. o. a. O. S. 183.

****) ebend. Vol. VII. P. 113.

das Natrium aus 24, das Calcium aus 20, das Eisen aus 28, das Mangan aus 56, der Schwefel aus 16 und der Phosphor aus 14 Verhältnistheilen (Massentheilen, Atomen) Wasserstoff bestehe, und daß folglich durch den Verbrennungsproceß der organischen Substanzen, aus dem Wasserstoff und Sauerstoff die erdigen Bestandtheile derselben erzeugt werden, und entweder als Oxyde oder als Neutralsalze, d. i. in beiden Fällen unter der Form binärer Verbindungen, wie die übrigen Producte der Verbrennung, zum Vorschein kommen.

An sich trägt diese Hypothese nichts Widersprechendes in sich; denn so wie die fast unzählige Verschiedenheit der Pflanzenkörper bloß von dem verschiedenen Verhältnisse der Grundstoffe, oder nach unserer Ansicht, von der verschiedenen Anordnung der binären Verbindungen, und wahrscheinlich von dem verschiedenen Grade der Verdichtung derselben abzuhängen scheint: so könnte wohl auch die Verschiedenheit der, für einfach gehaltenen, brennbaren Körper bloß von der verschiedenen Verdichtung eines und desselben Grundstoffs, nämlich des Wasserstoffs abhängen. Alle erdigen Bestandtheile der Pflanzenkörper würden daher nach dieser hypothetischen Ansicht, nichts anders als ein durch verschiedene Verhältnisse der Grundstoffe modificirtes Wasser seyn. Und so kämen wir zur Lehre des *Thales* und der frühern philosophischen Schulen, daß das Wasser das productive Element sey, die Substanz, aus welcher alle irrdische Körper hervorgegangen sind, und in welche sie endlich zurückkehren werden, wieder zurück.

In Beziehung auf die Bestandtheile der Pflanzenkörper suchten bekanntlich mehrere Naturforscher, als *van Helmont* *), *Boyle* **), *Eller* ***),

*) Opp. Francof. 1682. 4. p. 104.

**) origo formarum et qualitatum Genev. 1688. 4. Obs. II.

***) Seconde diss. sur les elemens in den Mem. de l'acad. de Berlin 1746. p. 45.

du Hamel *), *Bonnet* **), *Hofmann* ***), *Braconnot* †) und *von Crell* ††) dieß durch viele Versuche zu beweisen; wobei jedoch auch *Th. v. Saussure's* †††) Untersuchungen zu vergleichen sind.

Alle Bemühungen, mit diesem Gegenstande ins Reine zu kommen, werden wahrscheinlich noch lange fruchtlos bleiben; wir können daher bei dem Versuch einer gesetzmäßigen Anordnung der Elemente der Pflanzenkörper, wenig Rücksicht auf jene erdigen Bestandtheile nehmen; obwohl zu erwarten ist, daß sie nach den Werthen ihrer Verhältniszahlen in den Pflanzenkörpern geordnet seyn werden.

Viel zu thun ist uns also noch übrig, ehe wir zur genauen Kenntniß von der chemischen Constitution der Pflanzenkörper gelangen: jeden Beitrag, wenn er auch noch so gering ist, müssen wir daher mit Dank annehmen. Nächst dem, was auf analytischem Wege noch zu leisten ist, das schon allein ein Menschenleben bei weitem übersteigt, glaube ich, daß auch eine andere Reihe von Untersuchungen uns zu nicht uninteressanten Resultaten führen möchte. Sie wissen, daß *Gay - Lussac* das Gesetz für die Raumverbindungen der gasförmigen Körper aufgefunden

*) *Physique des arbres* T. II. p. 198.

**) *Mem. présentés* T. I. p. 420.

***) Ueber das Wachsthum der Pflanzen in reinem Wasser, in *Gren's Journ. d. Physik.* J. 1791. B. III. S. 10.

†) Untersuchungen über die Assimilirungskraft der Gewächse in *Gehlen's Journal für Chem. und Physik.* IX. 130. fg.

††) Ueber die in Kieselerde wachsenden, und durch bloßes Wasser genährten Pflanzen, und über die Kohle, welche sich darin findet, ebend. IX. 156. fg.; und Versuche über die Erzeugung des Kohlenstoffs in wachsenden Pflanzen, in *Schweigger's Journ. für Chem. und Phys.* II. 281.

†††) *Recherches chimiques sur la végétation* s. *Gehl. neues Journ. der Chem.* IV. 659. fg.

hat *); es ist Ihnen bekannt, daß diese Verbindungen nach sehr einfachen Zahlverhältnissen erfolgen. Sollten nicht auch die organischen Körper, die alle aus Elementen bestehen, oder nach unserer Ansicht aus binären Verbindungen sich bilden, welche für sich im gasförmigen Zustande existiren, oder doch in einen solchen leicht versetzt werden können, einem ähnlichen Gesetz gehorchen, d. h. sollte nicht der Grad der Verdichtung, den sie erleiden, indem sie sich verbinden, aus einem solchen Gesetz abgeleitet werden können? — Diese Untersuchungen setzen eine genaue specifische Gewichtsbestimmung der organischen Substanzen voraus: aus dieser und aus der genauen Kenntniß des Verhältnisses der Elemente wird sich dann leicht finden lassen, was wir suchen. Es ist aber für sich klar, daß solche specifische Gewichtsbestimmungen nicht auf gewöhnliche Weise durch Abwägen im Wasser bewerkstelliget werden können. Ich habe mir zu diesem Behufe ein einfaches Instrument ausgedacht, durch dessen Hülfe man, wie mir scheint, möglichst genaue Resultate erhalten kann; an einem andern Orte werde ich mehr hierüber sagen. Wir sollten nach meiner Meinung, unablässig bemüht seyn, Größenverhältnisse, wo sie auch immer in der Natur vorkommen, zu erforschen; der Lohn unserer Bemühungen würde gewiß nie ausbleiben; denn die Natur schafft und wirkt nie gesetzlos.

*) *Gilbert's n. Ann. B. VI. S. 6. fg.*

Bischof an den Präsidenten Noer von Rhenisch

Ich habe in meinem Schreiben an Sie, woran Sie schon die Fortsetzung betrachten mögen, Ihnen nicht nur die Ansichten der Chemiker über die chemische Constitution der Pflanzenkörper, sondern auch meine eigene vorgelegt. Lassen wir nun die Mathematik als Vermittler zwischen Erfahrung und Spekulation eintreten, damit sie uns die Gesetze in den Verbindungen der Elemente zu organischen Körpern verkünde.

III.

Da ich annehme, daß die Pflanzenkörper aus binären Verbindungen der Elemente gebildet werden, so können sich, nach dem gegenwärtigen Stande der Chemie, folgende fünf binäre Verbindungen bilden: Wasser aus Sauerstoff und Wasserstoff; Kohlenoxydgas aus Sauerstoff und Kohlenstoff; Kohlenäure aus denselben; Oelerzeugendes Gas aus Wasserstoff und Kohlenstoff; Ammoniak aus Stickstoff und Wasserstoff.

Mathematik.

Da nun nach den stöchiometrischen oder Äquivalenten Verhältnissen, die Verhältnisse zahlen

Nunquam aliud Natura, aliud Sapiencia dixit.

Juvenal.

des Sauerstoffs = 8
des Wasserstoffs = 1
des Kohlenstoffs = 6^{*)}

*) Die in meiner Stöchiometrie S. 54. berechneten stöchiometrischen Werthe weichen zwar etwas wenig von denen ab, indem sie dort sind:

Sauerstoff = 1 oder 8
Wasserstoff = 0,125 oder 1
Kohlenstoff = 0,75 oder 6

man wird aber in der Folge sehen, daß, so fern sich die obigen Zahlen nicht vollkommen genau eignen sollten, nicht sehr viel darauf ankommt. Die Rechnungen, welche sich auf diese Zahlen gründen, würden nicht ungenau sein, wenn ich nicht gerade Zahlen zum Grunde gelegt hätte.

M a t h e m a t i c s

Bischof an den Präsidenten Nees von Esenbeck.

Ich habe in meinem Schreiben an Sie, wovon Sie dieses als Fortsetzung betrachten mögen, Ihnen nicht nur die Ansichten der Chemiker über die chemische Constitution der Pflanzenkörper, sondern auch meine eigene vorgelegt. Lassen wir nun die Mathematik als Vermittlerin zwischen Erfahrung und Spekulation eintreten, damit sie uns die Gesetze in den Verbindungen der Elemente zu organischen Körpern verkünde.

Da ich annehme, daß die Pflanzenkörper aus binären Verbindungen der Elemente gebildet werden: so können sich, nach dem gegenwärtigen Standpuncte unserer chemischen Kenntnisse, aus Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlenstoff, folgende fünf binäre Verbindungen bilden: *Wasser* aus Sauerstoff und Wasserstoff, *Kohlenoxydgas* aus Sauerstoff und Kohlenstoff, *Kohlensäure* aus denselben, *Oelerzeugendes Gas* aus Wasserstoff und Kohlenstoff, *Kohlenwasserstoff* aus denselben. Da nun nach den stöchiometrischen - oder Aequivalententafeln, die Verhältniszahlen

des Sauerstoffs = 8

des Wasserstoffs = 1

des Kohlenstoffs = 6*)

*) Die in meiner Stöchiometrie S. 334. berechneten stöchiometrischen Werthe weichen zwar etwas wenig von denen ab, indem sie dort sind

Sauerstoff = 1 oder 8

Wasserstoff = 0,1327 oder 1,0616

Kohlenstoff = 0,7539 oder 6,0312

man wird aber in der Folge sehen, daß, so fern auch die obigen Zahlen nicht vollkommen genau seyn sollten, nicht sehr viel darauf ankömmt. Die Rechnungen, welche sich auf diese Zahlen gründen, würden indess ungeheuer weitläufig geworden seyn, wenn ich nicht ganze Zahlen zum Grunde gelegt hätte.

so werden die Verhältniszahlen jener binären Verbindungen seyn, nämlich die Verhältniszahl

des Wassers =	$8 + 1 = 9$
des Kohlenoxyds =	$8 + 6 = 14$
der Kohlensäure =	$2 \cdot 8 + 6 = 22$
des Oelerzeugenden Gases =	$1 + 6 = 7$
des Kohlenwasserstoffgases =	$2 \cdot 1 + 6 = 8$

und diese binären Verbindungen werden sich nach den Gewichtsverhältnissen dieser Zahlen unter einander vereinigen*) Allein da zwischen diesen binären Verbindungen keine grofse elektrische Spannung Statt findet: so werden nach dem, was ich oben S. 47. bemerkt habe, zwischen denselben mehrere Verbindungsstufen möglich seyn, d. h. ein Verhältnistheil (Massentheil, Atom) der einen binären Verbindung wird 1, 2, 3, u. s. w. Verhältnistheile (Massentheile, Atome) von jeder der übrigen binären Verbindungen aufnehmen.

Wie grofs die Anzahl der Verhältnistheile seyn mag, die in irgend einen Pflanzenkörper eingehen, läfst sich a priori nicht bestimmen; erwägen wir aber, dafs bei manchen Verbindungen in der unorganischen Natur, zwischen oft sehr differenten Körpern, z. B. zwischen Mangan und Sauerstoff, schon wenigstens 4 Verbindungsstufen (Oxyde) Statt finden: so läfst sich erwarten, dafs in der organischen Natur zwischen den binären Verbindungen, die nicht so sehr different sind, noch mehrere möglich seyn werden. Wäre uns diese Anzahl bekannt: so würden ohne Zweifel, wenn meine Ansicht gegründet ist, alle nur möglichen Pflanzensubstanzen, die (so fern wir vor der Hand von dem Stickstoff abstrahiren) von rein vegetabilischer Mischung sind, gegeben seyn. Die Aufgabe ist nun, alle die möglichen Zusammensetzungen der obigen binären Verbindungen zu Pflanzenkörpern zu bestimmen.

Diefs

*) Wenn in dieser Darstellung irgend etwas dunkel seyn sollte: so wird mein Lehrbuch der Stöchiometrie Erläuterung geben. Vergl. den 2ten Abschnitt.

Diefs kann bloß durch Hülfe der Combinationslehre geschehen, indem uns selbige nicht nur *alle möglichen* Verbindungen gegebener Dinge, sondern auch, in so fern unter diesen Verbindungen einige vorkommen sollten, die in gewisser Hinsicht nicht brauchbar sind, die *nützlichen* abgesondert von jenen, darstellen lehrt.

Wenn Sie meine Ansicht, so wie ich sie hier dargestellt habe, billigen, und wenn fernere Erfahrungen sie bestätigen: so können wir hoffen, daß es uns durch die combinatorische Analysis gelingen werde, die Gesetzmäßigkeit in den Mischungen der Pflanzenkörper aufzufinden; und in der That, der Gründe für diese Ansicht sind sehr viele. Eine große Mannichfaltigkeit aus nur sehr wenigen Elementen, eine Mannichfaltigkeit, die jedoch nicht unbegrenzt ist, kann die Natur auf keine andere Weise als durch Combinationen hervorbringen, und es ist nicht denkbar, daß die Natur in ihren Combinationen andern Gesetzen gehorchen sollte als die Mathematik; denn diese Wissenschaft ist, wie es mir scheint, die Form, in der sich alle Gesetzmäßigkeit der Natur ausspricht.

Diese Idee, die Combinationslehre auf die Natur anzuwenden, ist übrigens nicht neu: schon der große *Leibnitz* hat sie ausgesprochen. Er sagt mit eben so viel Wahrheit als hinreißender Beredsamkeit *) *Unica ista via est in arcana naturae penetrandi. Quando eo quisque perfectius rem cognoscere dicitur, quo magis rei partes et partium partes earumque figuras positusque percepit. Haec figurarum ratio primum abstracte in Geometria ac Stereometria pervestiganda, inde ubi ad historiam naturalem, existentiamque seu id, quod revera invenitur in corporibus, accesseris, patebit Physicae porta ingens, et elementorum facies, et qualitatum origo et mixtura, et mixturae origo, et mixtura mixturarum, et quicquid hactenus in natura stupebamus. Nächst Leibnitz*

*) Dissertatio de Arte combinatoria, in qua ex Arithmeticae fundamentis Complicationum ac Transpositionum doctrina novis praeceptis extruitur, et usus ambarum per universum scientiarum orbem ostenditur etc. Lips. 1666. P. 25.

versuchte der treffliche schwedische Chemiker *Bergman**) die Combinationslehre anzuwenden auf die Bestimmung der Mineralien aus den damals bekannten fünf einfachen Erden, nämlich Schwererde, Kalkerde, Magnesia, Thonerde und Kieselerde. Zuerst bestimmte er die Verbindungen aus je zwei, drei, vier und endlich allen fünf Erden, ohne eine als die besonders vorherrschende zu betrachten, dann aber diejenigen Verbindungen, wo die eine die vorherrschende, eine andere die zunächst weniger vorherrschende, eine dritte die noch weniger vorherrschende u. s. w. war, um den Mangel der ersten Bestimmung abzuheben. Wäre *Bergman* mit der Stöchiometrie vertraut gewesen, d. h. hätte er die Erden nach ihren Verbindungsverhältnissen geordnet: so würde er in der Mineralogie ausgeführt haben, was ich in den Pflanzenkörpern auszuführen gedenke.

So weit bin ich nun gekommen; wie weit mich aber unser Freund *Rothe*, dem ich meine Ansichten mitgetheilt habe, noch geführt hat, dieß mögen Sie aus den Schreiben entnehmen, die wir deshalb mit einander gewechselt haben.

*) Opusc. Phys. et Chem. ed. Hebenstreit. Lips. 1787. Vol. IV. §. CXXXV. seq.
Species terrarum investigandi methodus.

Bischof an Rothe.

Unser gemeinschaftlicher Freund, Präsident *Nees von Esenbeck* hat mich aufgefordert, die bis jetzt noch unbekannten Gesetze in den Mischungsverhältnissen der organischen und zwar zunächst der Pflanzenkörper, wo möglich aufzusuchen. Sie werden aus meinen deshalb an ihn gerichteten Schreiben entnehmen, daß ich diese Aufgabe durch Hülfe der Combinationslehre zu lösen hoffe. Ich wende mich daher an Sie, meinen ehemaligen Lehrer, mit der Bitte, meinen Combinationsversuch dergestalt zu prüfen, daß ich überzeugt seyn kann, keine Verbindung übergangen zu haben.

Ich will die fünf binären Verbindungen, aus denen, nach meiner Ansicht, die Pflanzenkörper sich bilden, bezeichnen

das Wasser durch a

das Kohlenoxydgas durch b

das kohlen saure Gas durch c

das ölerzeugende Gas durch d

das Kohlenwasserstoffgas durch e

ich will vor der Hand willkührlich annehmen, daß von jeder dieser Verbindungen, nur höchstens 3 Verhältnistheile (Massentheile, Atome) in eine organische Verbindung eingehen: so haben wir also aus den combinatorischen Elementen 0, 1, 2, 3 alle möglichen Complexionen aus fünf Elementen, jedoch mit Uebergehung derer, bei welchen die Elemente nicht relative Primzahlen sind, zu construiren. Letzteres deshalb, weil der Natur der Sache nach, z. B. $2a + 2b$, $3a + 3c$ u. s. w. einerlei sind mit den einfacheren $a + b$ oder $a + c$, d. h. dasselbe Verhältniß der binären Verbindungen ausdrücken.

Rothe an Bischof.

Das Problem, das Sie mir vorlegen, läßt sich allerdings mit Sicherheit und vollkommener Gewissheit, keine Verbindung übergangen zu haben, durch die Combinationslehre auflösen.

Zu dem Ende hat man weiter nichts nöthig, als von den *vier* Elementen 0, 1, 2, 3 (weil die Zahlen nur höchstens bis 3 vorkommen sollen) die fünfte (weil fünf Buchstaben a, b, c, d, e vorhanden sind) Variations-Classe an sich mit Wiederholungen zu construiren, dann alle diejenigen Complexionen als unnütz wegzuwerfen, deren Elemente nicht relative Primzahlen sind, und das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Element jeder übrig bleibenden Complexion mit a, b, c, d, e als Factor zu verbinden.

Ich will diese Classe erst *vollständig* construiren, und die ausfallenden oder unnützen Complexionen durch vorgesetzte Sternchen bemerken. Sie enthält folgende $4^5 = 1024$ Complexionen:

I. * 000000
 000001
 * 000002
 * 000003
 000010
 000011
 000012
 000013
 * 000020
 000021
 * 000022
 000023
 * 000030
 000031
 000032
 * 000033
 001000
 001001
 001002
 001003
 001100
 001101
 001102
 001103
 001110
 001111
 001112
 001113
 001200
 001201
 001202
 001203
 001210
 001211
 001212
 001213
 001220
 001221
 001222
 001223
 001300
 001301
 001302
 001303
 * 002000
 002001
 * 002002
 002003
 002100
 002101
 002102
 002103

* 002200
 002201
 * 002202
 002203
 002210
 002211
 002212
 002213
 * 002300
 002301
 002302
 002303
 * 003000
 003001
 003002
 * 003003
 003010
 003011
 003012
 003013
 003100
 003101
 003102
 003103
 003200
 003201
 003202
 003203
 * 003300
 003301
 003302
 * 003303
 II. 010000
 010001
 010002
 010003
 010010
 010011
 010012
 010013
 010020
 010021
 010022
 010023
 010030
 010031
 010032
 010033

010300
 010301
 010302
 010303
 010310
 010311
 010312
 010313
 010320
 010321
 010322
 010323
 010330
 010331
 010332
 010333
 011000
 011001
 011002
 011003
 011010
 011011
 011012
 011013
 011100
 011101
 011102
 011103
 011110
 011111
 011112
 011113
 011200
 011201
 011202
 011203
 011210
 011211
 011212
 011213
 011220
 011221
 011222
 011223
 011230
 011231
 011232
 011233
 011300
 011301
 011302
 011303
 011310
 011311
 011312
 011313

013100
 013101
 013102
 013103
 013110
 013111
 013112
 013113
 013200
 013201
 013202
 013203
 013210
 013211
 013212
 013213
 013300
 013301
 013302
 013303
 013310
 013311
 013312
 013313
 III. * 020000
 020001
 * 020002
 020003
 020010
 020011
 020012
 020013
 * 020020
 020021
 * 020022
 020023
 020030
 020031
 020032
 020033
 020100
 020101
 020102
 020103
 020110
 020111
 020112
 020113
 020120
 020121
 020122
 020123
 020130
 020131

02132
 02133
 *02200
 02201
 *02202
 02203
 02210
 02211
 02212
 02213
 *02220
 02221
 *02222
 02223
 02230
 02231
 02232
 02233
 02300
 02301
 02302
 02303
 02310
 02311
 02312
 02313
 02320
 02321
 02322
 02323
 02330
 02331
 02332
 02333

IV. *03000
 03001
 03002
 *03003
 03010

03011
 03012
 03013
 03020
 03021
 03022
 03023
 *03030
 03031
 03032
 *03033
 03100
 03101
 03102
 03103
 03110
 03111
 03112
 03113
 03120
 03121
 03122
 03123
 03130
 03131
 03132
 03133
 03200
 03201
 03202
 03203
 03210
 03211
 03212
 03213
 03220
 03221
 03222
 03223
 03230

03231
 03232
 03233
 *03300
 03301
 03302
 *03303
 03310
 03311
 03312
 03313
 03320
 03321
 03322
 03323
 *03330
 03331
 03332
 *03333

V. 10000
 10001
 10002
 10003
 10010
 10011
 10012
 10013
 10020
 10021
 10022
 10023
 10030
 10031
 10032
 10033
 10100
 10101
 10102
 10103

10110
 10111
 10112
 10113
 10120
 10121
 10122
 10123
 10130
 10131
 10132
 10133
 10200
 10201
 10202
 10203
 10210
 10211
 10212
 10213
 10220
 10221
 10222
 10223
 10230
 10231
 10232
 10233
 10300
 10301
 10302
 10303
 10310
 10311
 10312
 10313
 10320
 10321
 10322
 10323

	10330	11203	12022		12302
	10331	11210	12023		12303
	10332	11211	12030		12310
	<u>10333</u>	11212	12031		12311
VI.	11000	11213	12032		12312
	11001	11220	12033		12313
	11002	11221	12100		12320
	11003	11222	12101		12321
	11010	11223	12102		12322
	11011	11230	12103		12323
	11012	11231	12110		12330
	11013	11232	12111		12331
	11020	11233	12112		12332
	11021	11300	12113		<u>12333</u>
	11022	11301	12120		
	11023	11302	12121	VIII.	13000
	11030	11303	12122		13001
	11031	11310	12123		13002
	11032	11311	12130		13003
	11033	11312	12131		13010
	11100	11313	12132		13011
	11101	11320	12133		13012
	11102	11321	12200		13013
	11103	11322	12201		13020
	11110	11323	12202		13021
	11111	11330	12203		13022
	11112	11331	12210		13023
	11113	11332	12211		13030
	11120	<u>11333</u>	12212		13031
	11121		12213		13032
VII.	12000		12220		13033
	12001		12221		13100
	12002		12222		13101
	12003		12223		13102
	12010		12230		13103
	12011		12231		13110
	12012		12232		13111
	12013		12233		13112
	12020		12300		13113
	12021		12301		13120

13121	IX. *20000	*20220	21033
13122	20001	20221	21100
13123	*20002	*20222	21101
13130	20003	20223	21102
13131	20010	20230	21103
13132	20011	20231	21110
13133	20012	20232	21111
13200	20013	20233	21112
13201	*20020	20300	21113
13202	20021	20301	21120
13203	*20022	20302	21121
13210	20023	20303	21122
13211	20030	20310	21123
13212	20031	20311	21130
13213	20032	20312	21131
13220	20033	20313	21132
13221	20100	20320	21133
13222	20101	20321	21200
13223	20102	20322	21201
13230	20103	20323	21202
13231	20110	20330	21203
13232	20111	20331	21210
13233	20112	20332	21211
13300	20113	20333	21212
13301	20120		21213
13302	20121	X. 21000	21220
13303	20122	21001	21221
13310	20123	21002	21222
13311	20130	21003	21223
13312	20131	21010	21230
13313	20132	21011	21231
13320	20133	21012	21232
13321	*20200	21013	21233
13322	20201	21020	21300
13323	*20202	21021	21301
13330	20203	21022	21302
13331	20210	21023	21303
13332	20211	21030	21310
13333	20212	21031	21311
	20213	21032	21312

2 1 3 1 3	2 2 1 3 2	2 3 0 1 1	2 3 2 3 1
2 1 3 2 0	2 2 1 3 3	2 3 0 1 2	2 3 2 3 2
2 1 3 2 1	* 2 2 2 0 0	2 3 0 1 3	2 3 2 3 3
2 1 3 2 2	2 2 2 0 1	2 3 0 2 0	2 3 3 0 0
2 1 3 2 3	* 2 2 2 0 2	2 3 0 2 1	2 3 3 0 1
2 1 3 3 0	2 2 2 0 3	2 3 0 2 2	2 3 3 0 2
2 1 3 3 1	2 2 2 1 0	2 3 0 2 3	2 3 3 0 3
2 1 3 3 2	2 2 2 1 1	2 3 0 3 0	2 3 3 1 0
2 1 3 3 3	2 2 2 1 2	2 3 0 3 1	2 3 3 1 1
XI. * 2 2 0 0 0	2 2 2 1 3	2 3 0 3 2	2 3 3 1 2
2 2 0 0 1	* 2 2 2 2 0	2 3 0 3 3	2 3 3 1 3
* 2 2 0 0 2	2 2 2 2 1	2 3 1 0 0	2 3 3 2 0
2 2 0 0 3	* 2 2 2 2 2	2 3 1 0 1	2 3 3 2 1
2 2 0 1 0	2 2 2 2 3	2 3 1 0 2	2 3 3 2 2
2 2 0 1 1	2 2 2 3 0	2 3 1 0 3	2 3 3 2 3
2 2 0 1 2	2 2 2 3 1	2 3 1 1 0	2 3 3 3 0
2 2 0 1 3	2 2 2 3 2	2 3 1 1 1	2 3 3 3 1
* 2 2 0 2 0	2 2 2 3 3	2 3 1 1 2	2 3 3 3 2
2 2 0 2 1	2 2 3 0 0	2 3 1 1 3	2 3 3 3 3
* 2 2 0 2 2	2 2 3 0 1	2 3 1 2 0	XIII. * 3 0 0 0 0
2 2 0 2 3	2 2 3 0 2	2 3 1 2 1	3 0 0 0 1
2 2 0 3 0	2 2 3 0 3	2 3 1 2 2	3 0 0 0 2
2 2 0 3 1	2 2 3 1 0	2 3 1 2 3	* 3 0 0 0 3
2 2 0 3 2	2 2 3 1 1	2 3 1 3 0	3 0 0 1 0
2 2 0 3 3	2 2 3 1 2	2 3 1 3 1	3 0 0 1 1
2 2 1 0 0	2 2 3 1 3	2 3 1 3 2	3 0 0 1 2
2 2 1 0 1	2 2 3 2 0	2 3 1 3 3	3 0 0 1 3
2 2 1 0 2	2 2 3 2 1	2 3 2 0 0	3 0 0 2 0
2 2 1 0 3	2 2 3 2 2	2 3 2 0 1	3 0 0 2 1
2 2 1 1 0	2 2 3 2 3	2 3 2 0 2	3 0 0 2 2
2 2 1 1 1	2 2 3 3 0	2 3 2 0 3	3 0 0 2 3
2 2 1 1 2	2 2 3 3 1	2 3 2 1 0	* 3 0 0 3 0
2 2 1 1 3	2 2 3 3 2	2 3 2 1 1	3 0 0 3 1
2 2 1 2 0	2 2 3 3 3	2 3 2 1 2	3 0 0 3 2
2 2 1 2 1	XII. 2 3 0 0 0	2 3 2 1 3	* 3 0 0 3 3
2 2 1 2 2	2 3 0 0 1	2 3 2 2 0	3 0 1 0 0
2 2 1 2 3	2 3 0 0 2	2 3 2 2 1	3 0 1 0 1
2 2 1 3 0	2 3 0 0 3	2 3 2 2 2	3 0 1 0 2
2 2 1 3 1	2 3 0 1 0	2 3 2 2 3	3 0 1 0 3
		2 3 2 3 0	

3 0 1 1 0
 3 0 1 1 1
 3 0 1 1 2
 3 0 1 1 3
 3 0 1 2 0
 3 0 1 2 1
 3 0 1 2 2
 3 0 1 2 3
 3 0 1 3 0
 3 0 1 3 1
 3 0 1 3 2
 3 0 1 3 3
 3 0 2 0 0
 3 0 2 0 1
 3 0 2 0 2
 3 0 2 0 3
 3 0 2 1 0
 3 0 2 1 1
 3 0 2 1 2
 3 0 2 1 3
 3 0 2 2 0
 3 0 2 2 1
 3 0 2 2 2
 3 0 2 2 3
 3 0 2 3 0
 3 0 2 3 1
 3 0 2 3 2
 3 0 2 3 3
 * 3 0 3 0 0
 3 0 3 0 1
 3 0 3 0 2
 * 3 0 3 0 3
 3 0 3 1 0
 3 0 3 1 1
 3 0 3 1 2
 3 0 3 1 3
 3 0 3 2 0
 3 0 3 2 1
 3 0 3 2 2
 3 0 3 2 3

XIV.

* 3 0 3 3 0
 3 0 3 3 1
 3 0 3 3 2
 * 3 0 3 3 3
 3 1 0 0 0
 3 1 0 0 1
 3 1 0 0 2
 3 1 0 0 3
 3 1 0 1 0
 3 1 0 1 1
 3 1 0 1 2
 3 1 0 1 3
 3 1 0 2 0
 3 1 0 2 1
 3 1 0 2 2
 3 1 0 2 3
 3 1 0 3 0
 3 1 0 3 1
 3 1 0 3 2
 3 1 0 3 3
 3 1 1 0 0
 3 1 1 0 1
 3 1 1 0 2
 3 1 1 0 3
 3 1 1 1 0
 3 1 1 1 1
 3 1 1 1 2
 3 1 1 1 3
 3 1 1 2 0
 3 1 1 2 1
 3 1 1 2 2
 3 1 1 2 3
 3 1 1 3 0
 3 1 1 3 1
 3 1 1 3 2
 3 1 1 3 3
 3 1 2 0 0
 3 1 2 0 1
 3 1 2 0 2

XV.

3 1 2 0 3
 3 1 2 1 0
 3 1 2 1 1
 3 1 2 1 2
 3 1 2 1 3
 3 1 2 2 0
 3 1 2 2 1
 3 1 2 2 2
 3 1 2 2 3
 3 1 2 3 0
 3 1 2 3 1
 3 1 2 3 2
 3 1 2 3 3
 3 1 3 0 0
 3 1 3 0 1
 3 1 3 0 2
 3 1 3 0 3
 3 1 3 1 0
 3 1 3 1 1
 3 1 3 1 2
 3 1 3 1 3
 3 1 3 2 0
 3 1 3 2 1
 3 1 3 2 2
 3 1 3 2 3
 3 1 3 3 0
 3 1 3 3 1
 3 1 3 3 2
 3 1 3 3 3
 3 2 0 0 0
 3 2 0 0 1
 3 2 0 0 2
 3 2 0 0 3
 3 2 0 1 0
 3 2 0 1 1
 3 2 0 1 2
 3 2 0 1 3
 3 2 0 2 0
 3 2 0 2 1

3 2 0 2 2
 3 2 0 2 3
 3 2 0 3 0
 3 2 0 3 1
 3 2 0 3 2
 3 2 0 3 3
 3 2 1 0 0
 3 2 1 0 1
 3 2 1 0 2
 3 2 1 0 3
 3 2 1 1 0
 3 2 1 1 1
 3 2 1 1 2
 3 2 1 1 3
 3 2 1 2 0
 3 2 1 2 1
 3 2 1 2 2
 3 2 1 2 3
 3 2 1 3 0
 3 2 1 3 1
 3 2 1 3 2
 3 2 1 3 3
 3 2 2 0 0
 3 2 2 0 1
 3 2 2 0 2
 3 2 2 0 3
 3 2 2 1 0
 3 2 2 1 1
 3 2 2 1 2
 3 2 2 1 3
 3 2 2 2 0
 3 2 2 2 1
 3 2 2 2 2
 3 2 2 2 3
 3 2 2 3 0
 3 2 2 3 1
 3 2 2 3 2
 3 2 2 3 3
 3 2 3 0 0
 3 2 3 0 1

3 2 3 0 2	3 3 0 1 1	3 3 1 2 1	3 3 2 3 1
3 2 3 0 3	3 3 0 1 2	3 3 1 2 2	3 3 2 3 2
3 2 3 1 0	3 3 0 1 3	3 3 1 2 3	3 3 2 3 3
3 2 3 1 1	3 3 0 2 0	3 3 1 3 0	* 3 3 3 0 0
3 2 3 1 2	3 3 0 2 1	3 3 1 3 1	3 3 3 0 1
3 2 3 1 3	3 3 0 2 2	3 3 1 3 2	3 3 3 0 2
3 2 3 2 0	3 3 0 2 3	3 3 1 3 3	* 3 3 3 0 3
3 2 3 2 1	* 3 3 0 3 0	3 3 2 0 0	3 3 3 1 0
3 2 3 2 2	3 3 0 3 1	3 3 2 0 1	3 3 3 1 1
3 2 3 2 3	3 3 0 3 2	3 3 2 0 2	3 3 3 1 2
3 2 3 3 0	* 3 3 0 3 3	3 3 2 0 3	3 3 3 1 3
3 2 3 3 1	3 3 1 0 0	3 3 2 1 0	3 3 3 2 0
3 2 3 3 2	3 3 1 0 1	3 3 2 1 1	3 3 3 2 1
3 2 3 3 3	3 3 1 0 2	3 3 2 1 2	3 3 3 2 2
	3 3 1 0 3	3 3 2 1 3	3 3 3 2 3
XVI. * 3 3 0 0 0	3 3 1 1 0	3 3 2 2 0	* 3 3 3 3 0
3 3 0 0 1	3 3 1 1 1	3 3 2 2 1	3 3 3 3 1
3 3 0 0 2	3 3 1 1 2	3 3 2 2 2	3 3 3 3 2
* 3 3 0 0 3	3 3 1 1 3	3 3 2 2 3	* 3 3 3 3 3
3 3 0 1 0	3 3 1 2 0	3 3 2 3 0	

Die nicht mit Sternchen versehenen Complexionen geben also das, was Sie verlangen.

Was die Menge dieser nützlichen Complexionen betrifft, so braucht man, um diese zu finden, nur die weit kleinere Menge der unnützen abzuzählen, und von 1024 abzuziehen. Nun kommen solche unnütze Complexionen vor

in der Abtheilung	I	.	.	15
- - - -	III	.	.	8
- - - -	IV	.	.	8
- - - -	IX	.	.	8
- - - -	XI	.	.	8
- - - -	XIII	.	.	8
- - - -	XVI	.	.	8

in allem also 63

Es bleiben demnach übrig nützliche Complexionen 1024 — 63 oder 961.

Bischof an Rothe.

Versuchen Sie nun doch einmal, ob nicht die Menge der übrig bleibenden nützlichen Complexionen ein gewisses Gesetz bilden, wenn die Anzahl der Buchstaben, welche vorhin 5 war, allgemein $= n$ ist. Es wäre doch wahrlich ein wahrer Triumph der Chemie über die combinatorische Analysis, oder wenn Sie wollen, der combinatorischen Analysis über die Chemie, wenn Sie die von mir vermuthete Gesetzmäßigkeit entdecken sollten.

Die nicht mit Sternchen versehenen Complexionen geben also das, was Sie verlangen.

Was die Menge dieser nützlichen Complexionen betrifft, so braucht man, um diese zu finden, nur die weit kleinere Menge der unnützen abzuzählen, und von 1024 abzuziehen. Nun kommen solche unnütze Complexionen vor

in der Abtheilung	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI	XXVII	XXVIII	XXIX	XXX
15	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

63

in allem also

Es bleiben demnach übrig nützliche Complexionen 1024 — 63 oder 961.

Rothe an Bischof.

Auch die Beantwortung Ihres zweiten Schreibens liegt zum Theil in der des ersten. Man braucht nur die Menge der unnützen Complexionen, die dort durch *Abzählen* gefunden wurde, durch *Schlüsse* zu bestimmen.

Man lasse zu dem Ende vorerst die erste, lauter Nullen enthaltende Complexion als *ganz* unnütz hinweg, so bleiben übrig 1023 Complexionen.

In den übrigen unnützen Complexionen ist, weil man nicht weiter als bis 3 geht, der größte gemeinschaftliche Theiler aller Elemente entweder 2 oder 3.

Man sondere also diejenigen, wo gedachter Theiler 2 ist, von denen ab, wo er 3 ist, so erhält man folgende beide Abtheilungen unnützer Complexionen:

für den Theiler 2

0 0 0 0 2
 0 0 0 2 0
 0 0 0 2 2
 0 0 2 0 0
 0 0 2 0 2
 0 0 2 2 0
 0 0 2 2 2
 0 2 0 0 0
 0 2 0 0 2
 0 2 0 2 0
 0 2 0 2 2
 0 2 2 0 0
 0 2 2 0 2
 0 2 2 2 0
 0 2 2 2 2
 2 0 0 0 0
 2 0 0 0 2
 2 0 0 2 0
 2 0 0 2 2
 2 0 2 0 0
 2 0 2 0 2
 2 0 2 2 0
 2 0 2 2 2
 2 2 0 0 0
 2 2 0 0 2
 2 2 0 2 0
 2 2 0 2 2
 2 2 2 0 0
 2 2 2 0 2
 2 2 2 2 0
 2 2 2 2 2

für den Theiler 3

0 0 0 0 3
 0 0 0 3 0
 0 0 0 3 3
 0 0 3 0 0
 0 0 3 0 3
 0 0 3 3 0
 0 0 3 3 3
 0 3 0 0 0
 0 3 0 0 3
 0 3 0 3 0
 0 3 0 3 3
 0 3 3 0 0
 0 3 3 0 3
 0 3 3 3 0
 0 3 3 3 3
 3 0 0 0 0
 3 0 0 0 3
 3 0 0 3 0
 3 0 0 3 3
 3 0 3 0 0
 3 0 3 0 3
 3 0 3 3 0
 3 0 3 3 3
 3 3 0 0 0
 3 3 0 0 3
 3 3 0 3 0
 3 3 0 3 3
 3 3 3 0 0
 3 3 3 0 3
 3 3 3 3 0
 3 3 3 3 3

Dividirt man jedes Element dieser Complexionen durch den größten gemeinschaftlichen Theiler, so bekommt man in beiden Fällen einerlei, nämlich folgendes Resultat:

00001
00010
00011
00100
00101
00110
00111
01000
01001
01010
01011
01100
01101
01110
01111
10000
10001
10010
10011
10100
10101
10110
10111
11000
11001
11010
11011
11100
11101
11110
11111

Dieses Resultat aber ist nichts anders, als die nützlichen Complexionen in der fünften Variationsklasse an sich und mit Wiederholungen, jedoch bloß aus den Elementen 0 und 1.

In gedachter Classe sind aber ausser der ersten lauter Nullen enthaltenden Complexion, alle andern nützlich, weil jede, wenigstens *eine* Eins enthält, und diese Eins die darinnen vorkommenden Elemente zu relativen Primzahlen macht. Diesemnach ist die Menge der Complexionen in vorhin gedachtem Resultate $2^5 - 1 = 31$.

Es bleiben also im Hauptprobleme übrig $1023 - 2 \cdot 31 = 1023 - 62 = 961$ nützliche Complexionen, wie vorhin.

Nun ist $1023 = 4^5 - 1$, $31 = 2^5 - 1$. Man kann also die Menge der nützlichen Complexionen im Hauptprobleme auch so ausdrücken $(4^5 - 1) - 2 \cdot (2^5 - 1) = 4^5 - 1 - 2 \cdot 2^5 + 2 = 4^5 - 2 \cdot 2^5 + 1$.

Dieses findet statt, weil *fünf* Buchstaben a, b, c, d, e vorhanden sind. Hat man aber statt gedachter *fünf* Buchstaben allgemein n, so findet man eben so die Menge der nützlichen Complexionen oder Verbindungen allgemein $4^n - 2 \cdot 2^n + 1$ oder $(2^n - 1)^2$.

Bischof an Rothe.

Es war mir sehr erfreulich, daß Sie die von mir vermuthete Gesetzmäßigkeit für jede Anzahl von Buchstaben, d. h. für jede Anzahl von binären Verbindungen aufgefunden haben. Natürlich muß jetzt noch in mir der Wunsch erwachen, zu wissen, ob sich nicht auch eine Formel angeben läßt, welche die Anzahl der Complexionen oder Fälle angiebt, wenn die Anzahl der Verhältnistheile (Massentheile, Atome), die wir bisher willkürlich gleich 3 angenommen haben, allgemein gleich m gesetzt wird: so daß wir also die Anzahl der Complexionen auf der Stelle bestimmen können, wenn die Anzahl der binären Verbindungen allgemein gleich n , und die Anzahl der Verhältnistheile allgemein gleich m ist.

Wie ich schon in meinem ersten Schreiben an den Präsidenten *Nees von Esenbeck* S. 39. anführte, glaubt *Berzelius* gefunden zu haben, daß in den Verbindungen der unorganischen Natur wenigstens einer der Bestandtheile allemal als Einheit auftritt. In dieser Beziehung wäre es mir interessant zu wissen, wie groß die Menge der Fälle seyn wird, wenn bloß solche Verbindungen zugelassen werden, worinnen das Element 1 wenigstens einmal vorkommt, und deren Elemente deshalb nothwendig relative Primzahlen sind. Giebt es eine Formel, welche die Menge dieser Fälle durch m und n ausdrückt?

Rothe an Bischof.

Die Beantwortung der in Ihrem dritten Schreiben mir vorgelegten Frage ist schwieriger, als Sie vielleicht glauben. Bis jetzt ist es mir nicht gelungen, ein Resultat zu finden, das mich ganz befriedigte. Wie weit ich gekommen bin, will ich Ihnen indess mittheilen.

Man bezeichne die gesuchte Zahl, weil sie von m abhängt, oder eine Function von m ist, durch ϕm , so lassen sich die Werthe ϕ_1 , ϕ_2 , ϕ_3 u. s. w. *nach und nach* und *recurrirend* bestimmen. Hierzu schlage ich folgenden Weg ein.

Aus den in meinem vorigen Schreiben angeführten Gründen ist

$$1) \phi_1 = 2^n - 1.$$

Nun lasse man in der Variationsklasse aus den *drei* Elementen 0, 1, 2, die erste aus lauter Nullen bestehende Complexion weg, so bleiben übrig $3^n - 1$ Complexionen. Sämmtliche darunter befindliche unnütze Complexionen haben 2 zum größten gemeinschaftlichen Theiler ihrer Elemente. Scheidet man sie aus, und dividirt sie dann sämmtlich durch 2: so bekommt man, wie vorher, die nützlichen Complexionen aus den *zwei* Elementen 0, 1. Da nun die Menge derselben ϕ_1 ist, so erhält man

$$2) \phi_2 + \phi_1 = 3^n - 1.$$

Nun lasse man in der Variationsklasse aus den *vier* Elementen 0, 1, 2, 3, die erste aus lauter Nullen bestehende Complexion weg: so bleiben übrig $4^n - 1$ Complexionen. Sämmtliche darunter befindliche unnütze Complexionen haben entweder 2 oder 3 zum größten gemeinschaftlichen Theiler ihrer Elemente. Scheidet man diejenigen, wo gedachter Theiler 2 ist, und diejenigen, wo er 3 ist, in zwei verschiedene Rubriken aus, und dividirt dann die Zahlen jeder Rubrik durch den zugehörigen größten gemeinschaftlichen Theiler: so bekommt man in beiden

Fällen die nützlichen Complexionen aus den *zwei* Elementen 0, 1. Da nun die Menge derselben ϕ_1 ist, so hat man

$$3) \phi_3 + 2\phi_1 = 4^n - 1.$$

Nun lasse man in der Variationsklasse aus den *fünf* Elementen 0, 1, 2, 3, 4 die erste aus lauter Nullen bestehende Complexion weg: so bleiben übrig $5^n - 1$ Complexionen. Sämmtliche darunter befindliche unnütze Complexionen, haben entweder 2, oder 3, oder 4 zum größten gemeinschaftlichen Theiler ihrer Elemente. Scheidet man sie aus, ordnet sie nach diesen größten gemeinschaftlichen Theilern in drei Rubriken, und dividirt man dann die Zahlen jeder Rubrik durch den zugehörigen größten gemeinschaftlichen Theiler: so bekommt man

aus der Rubrik für den Theiler 2, die nützlichen Complexionen aus den Elementen 0, 1, 2;

aus den Rubriken für den Theiler 3 und 4 aber, die nützlichen Complexionen aus den Elementen 0, 1.

Der Grund hiervon ist offenbar dieser, daß 4 durch 2 dividirt, 2, durch 3 und 4 aber dividirt, 1 zum genäherten Quotienten*) giebt.

Es ist demnach

$$4) \phi_4 + \phi_2 + 2\phi_1 = 5^n - 1$$

Man sieht nun leicht wie man fortfahren kann. Da nämlich 5 durch 1, 2, 3, 4, 5 dividirt, die genäherten Quotienten 5, 2, 1, 1, 1 giebt, so hat man eben so $\phi_5 + \phi_2 + \phi_1 + \phi_1 + \phi_1 = 6^n - 1$, oder zusammengezogen

*) Unter genäherten Quotienten verstehe ich diejenigen, wo der nöthigenfalls anzuhängende eigentliche Bruch weggelassen wird. So ist zum Beispiele, wenn 18 durch 3 dividirt wird, 6 der genäherte Quotient, und, wenn 23 durch 3 dividirt wird, 7. Geht der Divisor im Dividend auf, so ist der *genäherte* Quotient mit dem *wahren* einerlei, ausserdem aber ist jener kleiner.

$$5) \phi_5 + \phi_2 + 3\phi_1 = 6^n - 1$$

Führt man auf diese Art fort, so erhält man folgende *erste* Formelreihe

$$1) \phi_1 = 2^n - 1$$

$$2) \phi_2 + \phi_1 = 3^n - 1$$

$$3) \phi_3 + 2\phi_1 = 4^n - 1$$

$$4) \phi_4 + \phi_2 + 2\phi_1 = 5^n - 1$$

$$5) \phi_5 + \phi_2 + 3\phi_1 = 6^n - 1$$

$$6) \phi_6 + \phi_3 + \phi_2 + 3\phi_1 = 7^n - 1$$

$$7) \phi_7 + \phi_3 + \phi_2 + 4\phi_1 = 8^n - 1$$

$$8) \phi_8 + \phi_4 + 2\phi_2 + 4\phi_1 = 9^n - 1$$

$$9) \phi_9 + \phi_4 + \phi_3 + \phi_2 + 5\phi_1 = 10^n - 1$$

$$10) \phi_{10} + \phi_5 + \phi_3 + 2\phi_2 + 5\phi_1 = 11^n - 1$$

$$11) \phi_{11} + \phi_5 + \phi_3 + 2\phi_2 + 6\phi_1 = 12^n - 1$$

$$12) \phi_{12} + \phi_6 + \phi_4 + \phi_3 + 2\phi_2 + 6\phi_1 = 13^n - 1$$

$$13) \phi_{13} + \phi_6 + \phi_4 + \phi_3 + 2\phi_2 + 7\phi_1 = 14^n - 1$$

$$14) \phi_{14} + \phi_7 + \phi_4 + \phi_3 + 3\phi_2 + 7\phi_1 = 15^n - 1$$

$$15) \phi_{15} + \phi_7 + \phi_5 + 2\phi_3 + 2\phi_2 + 8\phi_1 = 16^n - 1$$

$$16) \phi_{16} + \phi_8 + \phi_5 + \phi_4 + \phi_3 + 3\phi_2 + 8\phi_1 = 17^n - 1$$

$$17) \phi_{17} + \phi_8 + \phi_5 + \phi_4 + \phi_3 + 3\phi_2 + 9\phi_1 = 18^n - 1$$

$$18) \phi_{18} + \phi_9 + \phi_6 + \phi_4 + 2\phi_3 + 3\phi_2 + 9\phi_1 = 19^n - 1$$

$$19) \phi_{19} + \phi_9 + \phi_6 + \phi_4 + 2\phi_3 + 3\phi_2 + 10\phi_1 = 20^n - 1$$

$$20) \phi_{20} + \phi_{10} + \phi_6 + \phi_5 + \phi_4 + \phi_3 + 4\phi_2 + 10\phi_1 = 21^n - 1$$

u. s. w.

Um diese Formeln genauer betrachten zu können, muß ich vor allem eine Terminologie erklären, deren ich mich zur Abkürzung des Vortrags in der Folge bedienen werde.

Wenn nämlich ein bestimmter Dividend durch eine andere nicht grössere ganze Zahl dividirt, eine dritte zum genäherten Quotienten giebt, so mag letztere eine *Theilungszahl* der erstern heissen. Diesemnach sind z. B. 20, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1 die Theilungszahlen von 20.

Weiter werde der genäherte Quotient, der entsteht, wenn a durch b dividirt wird, also

$$a \mid b$$

bezeichnet, und es läßt sich leicht einsehen, daß

$$\text{wenn } a \mid b = q$$

$$\text{auch } q \cdot b \leq a < (q + 1) \cdot b$$

und umgekehrt, wenn $q \cdot b \leq a < (q + 1) \cdot b$

$$\text{auch } a \mid b = q$$

seyn müsse.

Ausser diesen giebt es noch mehrere andere Sätze von genäherten Quotienten, die ihrer Wichtigkeit wegen, längst verdient hätten, in die Lehrbücher der Arithmetik aufgenommen zu werden. Einige derselben, welche wir hier brauchen werden, nebst den zugehörigen Beweisen, enthält die *erste Beilage*.

Hieraus ergibt sich, daß, wenn b eine Theilungszahl von m ist, nothwendig $m \mid b > m \mid (b + 1)$. (Zweite Beilage 1. Lehrs.), und umgekehrt wenn $m \mid b > m \mid (b + 1)$, daß dann b eine Theilungszahl von m seyn müsse. (Zweite Beilage 2. Lehrs.)

Eine Theilungszahl kann zu mehreren Divisoren gehören. Ist nämlich b eine Theilungszahl von m , mithin $m \mid b > m \mid (b + 1)$, so ist b eine Theilungszahl für jeden Divisor, welcher größer als $m \mid (b + 1)$, jedoch nicht größer als $m \mid b$ ist, aber für keine andern; die Menge dieser verschiedenen Divisoren, welche b zur Theilungszahl geben, ist also $(m \mid b) - (m \mid (b + 1))$. So ist z. B. 3 eine Theilungszahl von 100, und zwar weil $100 \mid 3 = 33$, $100 \mid 4 = 25$ ist, für die 33 — 25 oder 8 verschiedenen Divisoren 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. (Zweite Beilage 2. Lehrs. und 3. Lehrs.)

Weiter werde der Ausdruck *genäherte Quadratwurzel*, oder allgemeiner *genäherte Wurzel des mten Grades aus einer ganzen Zahl a* in ähnlichem Sinne, wie vorher genäherter Quotient genommen, und durch $\sqrt[m]{a}$ oder allgemeiner $\sqrt[m]{a}$ bezeichnet: so ist leicht einzusehen, daß

$$\text{wenn } q = \sqrt[m]{a}, \text{ auch } q^m \leq a < (q+1)^m,$$

und umgekehrt, wenn $q^m \leq a < (q+1)^m$, auch $q = \sqrt[m]{a}$ seyn müsse.

Ausser diesen giebt es noch mehrere Sätze von genäherten Wurzeln, die, eben so, wie die von genäherten Quotienten, einen Platz in den Lehrbüchern der Arithmetik verdienen. Einige solcher Sätze theils bloß von genäherten Wurzeln, theils von solchen Wurzeln und Quotienten *zugleich*, nebst den zugehörigen Beweisen, enthält die *dritte Beilage*.

Hieraus läßt sich leicht beweisen, daß, wenn $b \leq \sqrt[m]{m}$, auch nothwendig b eine Theilungszahl von m , oder $m \mid b \geq m \mid (b+1)$ seyn müsse. (Vierte Beilage 1. Lehrs.)

Dividirt man also m durch alle die Zahlen $1, 2, 3, \text{ u. s. w. bis } \sqrt[m]{m} + 1$, so sind die entstehenden genäherten Quotienten sämmtlich verschieden, folglich auch lauter verschiedene Theilungszahlen von m .

Setzt man $\sqrt[m]{m} = q$, so ist $m \mid (q+1) \geq q$, so wie auch $m \mid (q+1) \geq q-1$. (Vierte Beilage 2. Lehrs. und 3. Lehrs.)

Hieraus ergibt sich ein sehr leichtes Mittel, alle Theilungszahlen einer gegebenen Zahl m sogleich darzustellen. Man dividire sie nämlich durch $1, 2, 3 \text{ u. s. w. bis } \sqrt[m]{m} + 1$, so entstehen lauter verschiedene genäherte Quotienten, wovon der letzte $\sqrt[m]{m}$ oder $\sqrt[m]{m} - 1$ ist, und schreibe nun vom letzten an, alle kleinere nach der Reihe bis 1 hin. So finden sich z. B. die verschiedenen Theilungszahlen von 37 nach der Reihe $37, 18, 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1$ und von 43 eben so $43, 21, 14, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1$.

Es ist also die Menge der Theilungszahlen von m entweder doppelt so groß, als die genäherte Quadratwurzel daraus, oder um eins kleiner. Das erste wird Statt finden, wenn, dafern $\sqrt{m} = q$ gesetzt wird, $q^2 \geq m < q \cdot (q + 1)$, das letztere, wenn $q \cdot (q + 1) \geq m < (q + 1)^2$ ist. Im ersten Falle nämlich ist $m | (q + 1) = q - 1$, im andern $= q$.

Nun ist es äusserst leicht, jede der Formeln obiger erster Formelreihe schnell hinzuschreiben. Die mte dieser Formeln nämlich, welche mit ϕm anfängt, findet man, wenn man

- 1) die *verschiedenen* Theilungszahlen von m nach der Reihe hinschreibt;
- 2) die Unterschiede je zweier auf einander folgender berechnet, und diesen Unterschieden zuletzt noch eine 1 beifügt.
- 3) Diese Reihe der Unterschiede als Coëfficienten mit den Theilungszahlen, nachdem man diesen ein ϕ vorgesetzt hat, in umgekehrter Ordnung verbindet.

Sucht man z. B. die 30te Formel, so hat man nach 1)

30, 15, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

nach 2)

30, 15, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

15, 5, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1

und hieraus nach 3)

$$\phi 30 + \phi 15 + \phi 10 + \phi 7 + \phi 6 + \phi 5 + \phi 4 + 3\phi 3 + 5\phi 2 + 15\phi 1 = 31^n - 1$$

Ich komme nun näher zu dem Problem, das Sie mir vorlegen. Aus den Formeln obiger erster Formelreihe findet sich nun nach und nach, oder recurrierend folgende zweite Formelreihe:

$$1) \phi 1 = 2^n - 1$$

$$2) \phi 2 = 3^n - 2^n$$

$$3) \phi 3 = 4^n - 2 \cdot 2^n + 1$$

$$4) \phi 4 = 5^n - 3^n - 2^n + 1$$

$$5) \phi 5 = 6^n - 3^n - 2 \cdot 2^n + 2$$

- 6) $\phi_6 = 7^n - 4^n - 3^n + 1$
 7) $\phi_7 = 8^n - 4^n - 3^n - 2^n + 2$
 8) $\phi_8 = 9^n - 5^n - 3^n - 2^n + 2$
 9) $\phi_9 = 10^n - 5^n - 4^n - 2^n + 2$
 10) $\phi_{10} = 11^n - 6^n - 4^n - 3^n + 2^n + 1$
 11) $\phi_{11} = 12^n - 6^n - 4^n - 3^n + 2$
 12) $\phi_{12} = 13^n - 7^n - 5^n - 2^n + 2$
 13) $\phi_{13} = 14^n - 7^n - 5^n - 2 \cdot 2^n + 3$
 14) $\phi_{14} = 15^n - 8^n - 5^n - 3^n + 2$
 15) $\phi_{15} = 16^n - 8^n - 6^n - 4^n + 2^n + 1$
 16) $\phi_{16} = 17^n - 9^n - 6^n - 4^n + 2^n + 1$
 17) $\phi_{17} = 18^n - 9^n - 6^n - 4^n + 2$
 18) $\phi_{18} = 19^n - 10^n - 7^n - 3^n + 2$
 19) $\phi_{19} = 20^n - 10^n - 7^n - 3^n - 2^n + 3$
 20) $\phi_{20} = 21^n - 11^n - 7^n - 5^n + 4^n - 2 \cdot 2^n + 3$

u. s. w.

Die dritte dieser Formeln ist die in meinem zweiten Schreiben angegebene.

Ein Gesetz in diesen Formeln zu finden ist die Aufgabe, die Sie mir vorlegen. Es giebt nun zwar wohl ein solches, allein es ist nicht von der Beschaffenheit, daß sich der Werth von ϕ_m in einer Formel darstellen ließe.

Wenn eine Zahl eine Theilungszahl einer zweiten, und diese wieder eine Theilungszahl einer dritten ist, so ist auch die erste eine Theilungszahl der dritten. Diefß erhellet aus dem fünften Lehrsatz der ersten Beilage.

Soll

Soll man also aus der ersten Formelreihe den Werth von ϕ_m finden, so braucht man nicht die m te und alle vorhergehende Formeln dieser Reihe anzuwenden, sondern nur diejenigen, deren Zahlen Theilungszahlen von m sind, und auch von diesen fallen häufig mehrere weg.

Um z. B. den Werth von ϕ_{20} zu finden, hat man, weil 20, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1 die Theilungszahlen von 20 sind, auch bloß die 20te, 10te, 6te, 5te, 4te, 3te, 2te und 1te der Formeln in der ersten Formelreihe anzuwenden. Nach diesen findet sich

$$\begin{aligned}
 \phi_{20} + \phi_{10} + \phi_6 + \phi_5 + \phi_4 + \phi_3 + 4\phi_2 + 10\phi_1 &= 21^n - 1 \\
 - \phi_{10} - \phi_5 - \phi_3 - 2\phi_2 - 5\phi_1 &= -11^n + 1 \\
 - \phi_6 - \phi_3 - \phi_2 - 3\phi_1 &= -7^n + 1 \\
 - \phi_4 - \phi_2 - 2\phi_1 &= -5^n + 1 \\
 \phi_3 + 2\phi_1 &= +4^n - 1 \\
 - 2\phi_1 &= -2 \cdot 2^n + 2
 \end{aligned}$$

und so hat man

$$\phi_{20} = 21^n - 11^n - 7^n - 5^n + 4^n - 2 \cdot 2^n + 3$$

wie vorhin. Es fällt also noch überdies die 5te und 2te der vorigen Formeln weg, oder kommt nicht in Anwendung.

Daraus folgt aber sogleich weiter, daß die Wurzeln der n ten Potenzen, welche in dem Werthe von ϕ_m vorkommen, nur um 1 vermehrte Theilungszahlen von m seyn können, daß aber nicht nothwendig alle Theilungszahlen von m auf diese Art vorkommen müssen.

Eben so brauchte man, um ϕ_{41} zu finden, wie folgende Rechnung zeigt:

$$\begin{aligned}
\phi_{41} + \phi_{20} + \phi_{13} + \phi_{10} + \phi_8 + \phi_6 + 2\phi_5 + 2\phi_4 + 3\phi_3 + 7\phi_2 + 21\phi_1 &= 42^n - 1 \\
-\phi_{20} & - \phi_{10} & - \phi_6 - \phi_5 - \phi_4 - \phi_3 - 4\phi_2 - 10\phi_1 &= -21^n + 1 \\
& - \phi_{13} & - \phi_6 & - \phi_4 - \phi_3 - 2\phi_2 - 7\phi_1 &= -14^n + 1 \\
& & - \phi_8 & - \phi_4 & - 2\phi_2 - 4\phi_1 &= -9^n + 1 \\
& & & + \phi_6 & + \phi_3 + \phi_2 + 3\phi_1 &= +7^n - 1 \\
& & - \phi_5 & - \phi_2 - 3\phi_1 &= -6^n + 1 \\
& & & + \phi_4 & + \phi_2 + 2\phi_1 &= +5^n - 1 \\
& & & & - 2\phi_3 & - 4\phi_1 &= -2 \cdot 4^n + 2 \\
& & & & & + 2\phi_1 &= +2 \cdot 2^n - 2
\end{aligned}$$

bloß die 41te, 20te, 13te, 8te, 6te, 5te, 4te, 3te und 1te der Formeln in der ersten Formelreihe anzuwenden, so daß also die 10te und 2te nicht in Betrachtung kommt, woraus sich ergibt

$$\phi_{41} = 42^n - 21^n - 14^n - 9^n + 7^n - 6^n + 5^n - 2 \cdot 4^n + 2 \cdot 2^n + 1$$

Wir wollen nun das Problem noch auf eine andere Art angreifen. Nach der ersten Formelreihe ist

$$\phi(m|1) + \phi(m|2) + \phi(m|3) + \phi(m|4) + \dots = [(m|1) + 1]^n - 1$$

und wenn man hier statt m nach und nach setzt $m|2$, $m|3$, $m|4$ u. s. w. indem (Erste Beilage Lehrs. 5.) $(a|b)|c = a|(bc)$

$$\begin{aligned}
\phi(m|2) + \phi(m|4) + \phi(m|6) + \dots &= [(m|2) + 1]^n - 1 \\
\phi(m|3) + \phi(m|6) + \phi(m|9) + \dots &= [(m|3) + 1]^n - 1 \\
\text{u. s. w. Die Reihen links werden so weit fortgesetzt, bis die hinter den } \phi &\text{ stehenden genäherten Quotienten Null werden.}
\end{aligned}$$

Man multiplicire diese Formeln mit zur Zeit noch unbestimmten Coëfficienten c^1, c^2, c^3, c^4 u. s. w., so bekommt man

$$\begin{aligned}
& \overset{1}{c}\phi(m|1) + \overset{1}{c}\phi(m|2) + \overset{1}{c}\phi(m|3) + \overset{1}{c}\phi(m|4) + \overset{1}{c}\phi(m|5) + \overset{1}{c}\phi(m|6) \dots = \overset{1}{c}[(m|1)+1]^n - \overset{1}{c} \\
& \quad + \overset{2}{c}\phi(m|2) \quad \quad \quad + \overset{2}{c}\phi(m|4) \quad \quad \quad + \overset{2}{c}\phi(m|6) \dots = \overset{2}{c}[(m|2)+1]^n - \overset{2}{c} \\
& \quad \quad \quad + \overset{3}{c}\phi(m|3) \quad \quad \quad + \overset{3}{c}\phi(m|6) \dots = \overset{3}{c}[(m|3)+1]^n - \overset{3}{c} \\
& \quad \quad \quad \quad \quad + \overset{4}{c}\phi(m|4) \quad \quad \quad \dots = \overset{4}{c}[(m|4)+1]^n - \overset{4}{c} \\
& \quad \quad \quad \quad \quad \quad + \overset{5}{c}\phi(m|5) \quad \quad \quad \dots = \overset{5}{c}[(m|5)+1]^n - \overset{5}{c} \\
& \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad + \overset{6}{c}\phi(m|6) \dots = \overset{6}{c}[(m|6)+1]^n - \overset{6}{c}
\end{aligned}$$

u. s. w.

Man bestimme nun die angenommenen Coëfficienten dergestalt, daß $c = 1$, und die Summe der über einander stehenden oder einerlei ϕ enthaltenden Glieder 0 wird, so ergeben sich ausser voriger noch folgende Gleichungen

$$\overset{2}{c} + \overset{1}{c} = 0$$

$$\overset{3}{c} + \overset{1}{c} = 0$$

$$\overset{4}{c} + \overset{2}{c} + \overset{1}{c} = 0$$

$$\overset{5}{c} + \overset{1}{c} = 0$$

$$\overset{6}{c} + \overset{3}{c} + \overset{2}{c} + \overset{1}{c} = 0$$

u. s. w.

Das Gesetz dieser Gleichungen ist sehr einfach. Es sind nämlich die über den c stehenden Zahlen in *einer* Formel die sämtlichen Factoren der ersten dieser Zahlen. So hat man weiter ohne Schwierigkeit

$$\overset{7}{c} + \overset{1}{c} = 0$$

$$\overset{8}{c} + \overset{4}{c} + \overset{2}{c} + \overset{1}{c} = 0$$

$$\overset{9}{c} + \overset{3}{c} + \overset{1}{c} = 0$$

$$^{10}c + ^5c + ^2c + ^1c = 0$$

$$^{11}c + ^1c = 0$$

$$^{12}c + ^6c + ^4c + ^3c + ^2c + ^1c = 0$$

$$^{13}c + ^1c = 0$$

$$^{14}c + ^7c + ^2c + ^1c = 0$$

$$^{15}c + ^5c + ^3c + ^1c = 0$$

$$^{16}c + ^8c + ^4c + ^2c + ^1c = 0$$

$$^{17}c + ^1c = 0$$

$$^{18}c + ^9c + ^6c + ^3c + ^2c + ^1c = 0$$

$$^{19}c + ^1c = 0$$

$$^{20}c + ^{10}c + ^5c + ^4c + ^2c + ^1c = 0$$

u. s. w.

Hieraus findet sich nun nach und nach recurrirend

$$^1c = 1, ^2c = -1, ^3c = -1, ^4c = 0, ^5c = -1, ^6c = +1, ^7c = -1, ^8c = 0, ^9c = 0, ^{10}c = +1$$

$$^{11}c = -1, ^{12}c = 0, ^{13}c = -1, ^{14}c = +1, ^{15}c = +1, ^{16}c = 0, ^{17}c = -1, ^{18}c = 0, ^{19}c = -1, ^{20}c = 0$$

u. s. w.

Das Gesetz dieser Formeln ist sehr leicht zu übersehen. Es ist nämlich jeder dieser Coëfficienten entweder $+1$, oder -1 , oder 0 , und zwar ist

erstens $^m c = +1$, wenn m entweder 1 , oder ein Product aus einer geraden Anzahl verschiedener absoluter Primzahlen, gröfser als 1 ist;

zweitens $^m c = -1$, wenn m entweder eine absolute Primzahl grö-

lser als 1, oder ein Product aus einer *ungeraden* Anzahl *verschiedener* solcher Primzahlen ist;

drittens $c^m = 0$, wenn m durch ein vollkommenes Quadrat, das gröfser als 1 ist, ohne Rest dividirt werden kann.

Das erste und zweite ist leicht einzusehen. Von der Richtigkeit der dritten Behauptung kann man sich sehr leicht durch folgendes Beispiel überzeugen. Um z. B. darzuthun, dafs $c^{108} = 0$ sey, bemerke man, dafs 108 keine andern Primzahlen unter seinen Factoren enthält, als 2 und 3. Man dividire also 108 durch 1, 2, 3 und 2.3 oder 6, so bekommt man die Quotienten 108, 54, 36, 18. Nun hat man nach vorigen Formeln

$$\begin{array}{cccccccccccccccc} 108 & 54 & 36 & 27 & 18 & 12 & 9 & 6 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ c & + & c & + & c & + & c & + & c & + & c & + & c \\ - & c & - & c & - & c & - & c & - & c & - & c & = 0 \\ & 54 & & 27 & & 18 & & 9 & & 6 & & 3 & & 1 \\ & - & c & & - & c & & - & c & & - & c & & - & c & = 0 \\ & & 36 & & 18 & & 12 & & 9 & & 6 & & 4 & & 3 & & 2 & & 1 \\ & & - & c & & - & c & & - & c & & - & c & & - & c & & - & c & = 0 \\ & & & 18 & & 9 & & 6 & & 3 & & 2 & & 1 \\ & & & + & c & & + & c & & + & c & & + & c & & + & c & & + & c & = 0 \end{array}$$

also, wenn man addirt, $c^{108} = 0$.

Hat man nun auf diese Art c , c , c , u. s. w. bestimmt, so hat man nun $\phi m = c^1 \left([(m|1) + 1]^n - 1 \right) + c^2 \left([(m|2) + 1]^n - 1 \right) + c^3 \left([(m|3) + 1]^n - 1 \right) + \text{etc.}$
So hat man z. B. für $m = 20$

$$\begin{array}{cccccccccccccccccccc} \phi 20 = & c^{1n} (21 - 1) & + & c^{2n} (11 - 1) & + & c^{3n} (7 - 1) & + & c^{4n} (6 - 1) & + & c^{5n} (5 - 1) & + & c^{6n} (4 - 1) \\ & + & c^{7n} (3 - 1) & + & c^{8n} (3 - 1) & + & c^{9n} (3 - 1) & + & c^{10n} (3 - 1) & + & c^{11n} (2 - 1) & + & c^{12n} (2 - 1) \\ & + & c^{13n} (2 - 1) & + & c^{14n} (2 - 1) & + & c^{15n} (2 - 1) & + & c^{16n} (2 - 1) & + & c^{17n} (2 - 1) & + & c^{18n} (2 - 1) \\ & + & c^{19n} (2 - 1) & + & c^{20n} (2 - 1) \end{array}$$

oder zusammengezogen

$$\phi_{20} = c^1 (21^n - 1) + c^2 (11^n - 1) + c^3 (7^n - 1) + c^4 (6^n - 1) + c^5 (5^n - 1) + c^6 (4^n - 1) \\ + (c^7 + c^8 + c^9 + c^{10}) (3^n - 1) + (c^{11} + c^{12} + c^{13} + \dots + c^{20}) (2^n - 1)$$

oder, wenn man die Werthe der angenommenen Coëfficienten aus voriger Tafel nimmt

$$\phi_{20} = (21^n - 1) - (11^n - 1) - (7^n - 1) - (5^n - 1) + (4^n - 1) - 2 \cdot (2^n - 1)$$

gerade wie oben.

Diefs Beispiel zeigt zugleich, welcher Unvollkommenheit vorige Formel noch ausgesetzt ist. Sie giebt nämlich den Werth von ϕ_m nicht sogleich in der einfachsten Form, sondern es lassen sich mehrere Glieder zusammenziehen. Diese Reduction oder Zusammenziehung ist aber, zumal bei größern Werthen von m sehr beschwerlich.

Um diels zu vermeiden setze man $c + c + c + c + \dots + c = \psi_k$, so hat man

$$\phi_{20} = \psi_1 (21^n - 1) + (\psi_2 - \psi_1) (11^n - 1) + (\psi_3 - \psi_2) (7^n - 1) + (\psi_4 - \psi_3) (6^n - 1) \\ + (\psi_5 - \psi_4) (5^n - 1) + (\psi_6 - \psi_5) (4^n - 1) + (\psi_{10} - \psi_6) (3^n - 1) + (\psi_{20} - \psi_{10}) (2^n - 1)$$

Hat man also eine Tafel der ψ bis auf eine gewisse Gränze, wie in der fünften Beilage bis auf die Gränze 1000 geschehen ist, berechnet, so hat man, um ϕ_m zu finden, folgende Regeln zu beobachten:

1) Man schreibe zuerst alle *verschiedene* Theilungszahlen von m in eine *erste* Horizontalreihe, die größte am weitesten zur Linken, die kleinste zur Rechten;

2) Man setze aus voriger Tafel zu den Theilungszahlen die zugehörigen Werthe der ψ in eine *zweite* Horizontalreihe darunter;

3) Man subtrahire jede Zahl der zweiten Horizontalreihe von der zunächst zur Linken stehenden, schreibe die Reste unter die Minuenden, und am weitesten zur Rechten noch den Werth von ψ_1 oder $+1$, so erhält man eine *dritte* Horizontalreihe;

4) Man verbinde die Zahlen der dritten Horizontalreihe als Coëfficienten mit denen der ersten, und zwar so, daß die Zahlen der ersten Horizontalreihe um 1 vermehrt zur n ten Potenz erhoben, und dann um 1 vermindert werden, und zwar in *umgekehrter Ordnung*, so daß die *letzte* Zahl der dritten Horizontalreihe mit der *ersten* Zahl der ersten Horizontalreihe, die *vorletzte* Zahl der dritten Reihe, mit der *zweiten* Zahl der ersten Reihe u. s. w. verbunden wird.

Es sey z. B. $m = 20$, so hat man nach der Vorschrift 1) 20, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1

2) -3, -1, -1, -2, -1, -1, 0, +1

3) -2, 0, +1, -1, 0, -1, -1, +1

und hieraus nach der Vorschrift 4)

$$\phi_{20} = 1 \cdot (21^n - 1) - 1 \cdot (11^n - 1) - 1 \cdot (7^n - 1) - 1 \cdot (5^n - 1) + 1 \cdot (4^n - 1) - 2 \cdot (2^n - 1)$$

wie vorhin.

Es sey ferner $m = 41$, so hat man

nach der Vorschrift 1) 41, 20, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1

2) -1, -3, -3, -1, -2, -1, -2, -1, -1, 0, +1

3) +2, 0, -2, +1, -1, +1, -1, 0, -1, -1, +1

und hieraus nach der Vorschrift 4)

$$\phi_{41} = 1 \cdot (42^n - 1) - 1 \cdot (21^n - 1) - 1 \cdot (14^n - 1) - 1 \cdot (9^n - 1) + 1 \cdot (7^n - 1) - 1 \cdot (6^n - 1) + 1 \cdot (5^n - 1) - 2 \cdot (4^n - 1) + 2 \cdot (2^n - 1)$$

Es sey $m = 93$, so hat man

nach d. Vorschr. 1) 93, 46, 31, 23, 18, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

2) 0, -2, -4, -2, -2, -1, -3, -2, -1, -2, -2, -2, -1, -2, -1, -1, 0, +1

3) +2, +2, -2, 0, -1, +2, -1, -1, +1, 0, 0, -1, +1, -1, 0, -1, -1, +1

und nun nach der Vorschrift 4)

$$\begin{aligned} \phi_{93} = & 1 \cdot (94^n - 1) - 1 \cdot (47^n - 1) - 1 \cdot (32^n - 1) - 1 \cdot (19^n - 1) + 1 \cdot (16^n - 1) \\ & - 1 \cdot (14^n - 1) + 1 \cdot (10^n - 1) - 1 \cdot (9^n - 1) - 1 \cdot (8^n - 1) + 2 \cdot (7^n - 1) \\ & - 1 \cdot (6^n - 1) - 2 \cdot (4^n - 1) + 2 \cdot (3^n - 1) + 2 \cdot (2^n - 1) \end{aligned}$$

Endlich sey $m = 100$, so hat man
 nach 1) 100, 50, 33, 25, 20, 16, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
 2) +1, -3, -3, -2, -3, -1, -2, -2, -2, -1, -2, -2, -2, -1, -2, -1, -1, 0, +1
 3) +4, 0, -1, +1, -2, +1, 0, 0, -1, +1, 0, 0, -1, +1, -1, 0, -1, -1, +1
 und hieraus nach 4)

$$\begin{aligned} \phi 100 = & 1 \cdot (101^n - 1) - 1 \cdot (51^n - 1) - 1 \cdot (34^n - 1) - 1 \cdot (21^n - 1) + 1 \cdot (17^n - 1) \\ & - 1 \cdot (15^n - 1) + 1 \cdot (11^n - 1) - 1 \cdot (10^n - 1) + 1 \cdot (7^n - 1) - 2 \cdot (6^n - 1) \\ & + 1 \cdot (5^n - 1) - 1 \cdot (4^n - 1) + 4 \cdot (2^n - 1) \end{aligned}$$

Diese Beispiele werden hinreichend seyn, um den Gebrauch der
 Tafel der ψ bei der Auflösung Ihres Problems zu zeigen.

Will man aber diese Formeln so ausdrücken, daß keine Parenthesen
 vorkommen, oder so wie oben, so kann dieß sehr leicht geschehen.
 Man darf nur bemerken, daß das letzte Glied in dem Werthe von ϕm
 die Zahl $-\psi m$ ist.

Die Frage in der andern Hälfte Ihres Briefes ist sehr leicht und kurz
 zu beantworten. Sollen nämlich bloß solche Complexionen als nützlich
 betrachtet werden, worinnen wenigstens einmal das Element 1 vorkommt,
 so ist die Menge der nützlichen Complexionen $(m+1)^n - m^n$. Die Menge
 aller Complexionen nämlich in der nten Variationsklasse aus den $m+1$
 Elementen 0, 1, 2 u. s. w. bis m ist $(m+1)^n$. Die als unnütz ausfal-
 lenden Complexionen bilden die nte Classe aus den m Elementen 0, 2, 3, 4
 u. s. w. bis m , und die Menge derselben ist eben so m^n .

$$\begin{aligned} & (1-10^n) \cdot 1 + (1-10^n) \cdot 1 + (1-10^n) \cdot 1 + (1-10^n) \cdot 1 + (1-10^n) \cdot 1 + (1-10^n) \cdot 1 + (1-10^n) \cdot 1 + (1-10^n) \cdot 1 + (1-10^n) \cdot 1 + (1-10^n) \cdot 1 \\ & (1-10^n) \cdot 2 + (1-10^n) \cdot 1 + (1-10^n) \cdot 1 + (1-10^n) \cdot 1 + (1-10^n) \cdot 1 + (1-10^n) \cdot 1 + (1-10^n) \cdot 1 + (1-10^n) \cdot 1 + (1-10^n) \cdot 1 + (1-10^n) \cdot 1 \\ & (1-10^n) \cdot 2 + (1-10^n) \cdot 2 + (1-10^n) \cdot 2 + (1-10^n) \cdot 2 + (1-10^n) \cdot 2 + (1-10^n) \cdot 2 + (1-10^n) \cdot 2 + (1-10^n) \cdot 2 + (1-10^n) \cdot 2 + (1-10^n) \cdot 2 \end{aligned}$$

Erste

Erste Beilage.

Sätze von genäherten Quotienten.

1. *Lehrsatz.* Wenn $m \cdot b \geq a$, so ist auch $m \geq a|b$.

Beweis. Es sey $a|b = q$, so ist $(q+1) \cdot b > a$, also noch vielmehr $(q+1) \cdot b > m \cdot b$, also $q+1 > m$, folglich, da beides ganze Zahlen sind, $q \geq m$, oder $a|b \geq m$.

Zusatz. Ist daher $m > a|b$, so ist auch $m \cdot b > a$.

2. *Lehrsatz.* Wenn $m \cdot b > a$, so ist auch $m > a|b$.

Beweis. Es sey $a|b = q$, so ist $q \cdot b \leq a$, also noch vielmehr $q \cdot b < m \cdot b$, also $q < m$, oder $a|b < m$.

Zusatz. Ist daher $m \leq a|b$, so ist auch $m \cdot b \leq a$.

3. *Lehrsatz.* Wenn $a \geq b$, so ist auch $a|c \geq b|c$.

Beweis. Es sey $b|c = q$, so ist auch $b \geq q \cdot c$, also noch vielmehr $a \geq q \cdot c$, also (1. Lehrs.) $a|c \geq q$, oder $a|c \geq b|c$.

Zusatz. Ist daher $a|c < b|c$, so ist auch $a < b$.

4. *Lehrsatz.* Wenn $b \geq c$, so ist auch $a|b \geq a|c$.

Beweis. Es sey $a|b = q$, so ist $q \cdot b \geq a$, aber auch $q \cdot b \geq q \cdot c$, also noch vielmehr $a \geq q \cdot c$, folglich (1. Lehrs.) $a|c \geq q$, oder $a|c \geq a|b$.

Zusatz. Ist daher $a|b < a|c$, so ist auch $b < c$.

5. *Lehrsatz.* Es ist allemal

$$(a|b)|c = a|(b \cdot c)$$

Beweis. Es sey

$$a|(b \cdot c) = q$$

so ist

$$q \cdot b \cdot c \leq a < (q+1) \cdot b \cdot c$$

also (1. Lehrs. und 2. Lehrs.)

$$q \cdot c \geq a | b < (q+1) \cdot c$$

mithin auch

$$q = (a | b) | c$$

oder

$$a | (b \cdot c) = (a | b) | c$$

Zusatz. Diesemnach ist auch

$$(a | b) | c = (a | c) | b.$$

6. *Lehrsatz.* Ist $m \geq a | b$, so ist auch $b \geq a | m$.

Beweis. Da $m \geq a | b$, so ist (2. Lehrs. Zus.) $m : b \geq a$, also (1. Lehrs.) auch $b \geq a | m$.

Zusatz. Ist also $b > a | m$, so ist auch $m > a | b$. Man könnte diefs aber auch so darthun. Da $b > a | m$, so ist (1. Lehrs. Zusatz) $b \cdot m > a$, folglich (2. Lehrs.) $m > a | b$.

Zweite Beilage.

1. *Lehrsatz.* Wenn b eine Theilungszahl von m ist, so ist

$$m | b > m | (b+1).$$

Beweis. Es sey a ein Divisor, für welchen b eine Theilungszahl ist, so ist

$$m | a = b$$

also

$$b \cdot a \geq m < (b+1) \cdot a$$

mithin (1. Beilage 1. und 2. Lehrs.)

$$a \geq m | b$$

$$m | (b+1) < a$$

folglich gewifs

$$m | (b+1) < m | b.$$

Zusatz. Ist also $m \mid (b+1) = m \mid b$, so kann b keine Theilungszahl von m seyn.

2. *Lehrsatz.* Wenn

$$m \mid b > m \mid (b+1)$$

so ist b eine Theilungszahl von m , und zwar für jeden Divisor, welcher gleich oder kleiner als $m \mid b$, und zugleich grösser als $m \mid (b+1)$ ist.

Beweis. Es sey a ein solcher Divisor, oder

$$m \mid b \geq a > m \mid (b+1)$$

so ist (1. Beilage 6. Lehrs. und zugeh. Zus.)

$$b+1 > m \mid a \geq b$$

folglich

$$m \mid a = b$$

Zusatz. Ist also b keine Theilungszahl von m , so ist

$$m \mid b = m \mid (b+1).$$

3. *Lehrsatz.* Es giebt gerade so viel verschiedene Divisoren, für welche b eine Theilungszahl von m ist, als der Unterschied

$[m \mid b] - [m \mid (b+1)]$ anzeigt.

Beweis. Ist $m \mid b = m \mid (b+1)$, so ist gedachter Unterschied 0, aber auch (1. Lehrs. Zus.) b keine Theilungszahl von m , folglich giebt es auch keine Divisoren, für welchen b eine Theilungszahl wäre.

Ist hingegen $m \mid b > m \mid (b+1)$, so ist allemal, wenn

$$m \mid b \geq a > m \mid (b+1)$$

(2. Lehrs.) $m \mid a = b$. Wenn aber $a > m \mid b$, oder $a \geq m \mid (b+1)$, so ist (1. Beilage 6. Lehrs. und zugeh. Zus.) im ersten Falle $b > m \mid a$, im andern $b+1 \geq m \mid a$, oder $b < m \mid a$.

Dritte Beilage.

Sätze von genäherten Wurzeln und Quotienten.

1. *Lehrsatz.* Wenn $b^m \geq a$, so ist auch $b \geq \sqrt[m]{a}$.

Beweis. Es sey $q = \sqrt[m]{a}$, so ist $(q+1)^m > a$, also noch vielmehr $(q+1)^m > b^m$, also auch $q+1 > b$, also auch $q \geq b$, oder $\sqrt[m]{a} \geq b$.

Zusatz. Ist also $b > \sqrt[m]{a}$, so ist auch $b^m > a$.

2. *Lehrsatz.* Wenn $b^m > a$, so ist auch $b > \sqrt[m]{a}$.

Beweis. Es sey $q = \sqrt[m]{a}$, so ist $q^m \leq a$, also noch vielmehr $q^m < b^m$, also auch $q < b$, oder $\sqrt[m]{a} < b$.

Zusatz. Ist also $b \leq \sqrt[m]{a}$, so ist auch $b^m \leq a$.

3. *Lehrsatz.* Es ist

$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$$

Beweis. Es sey

$$\sqrt[n \cdot m]{a} = q$$

so ist

$$q^{n \cdot m} \leq a < (q+1)^{n \cdot m}$$

oder

$$(q^n)^m \leq a < ((q+1)^n)^m$$

also (1. Lehrs. und 2. Lehrs.)

$$q^n \leq \sqrt[m]{a} < (q+1)^n$$

folglich

$$q = V\sqrt[n]{a} V\sqrt[m]{a}.$$

Zusatz. Es ist derowegen auch

$$V\sqrt[n]{a} V\sqrt[m]{a} = V\sqrt[m]{a} V\sqrt[n]{a}.$$

4. *Lehrsatz.* Es ist

$$V\sqrt[m]{a | b^m} = V\sqrt[m]{a} | b.$$

Beweis. Es sey

$$V\sqrt[m]{a | b^m} = q$$

so ist auch

$$q^m \geq a | b^m < (q+1)^m$$

folglich (1. Beilage 1. Lehrs. Zus. und 2. Lehrs. Zus.)

$$b^m \cdot q^m \geq a < b^m \cdot (q+1)^m$$

oder

$$(b \cdot q)^m \geq a < (b \cdot (q+1))^m$$

folglich (1. Lehrs. und 2. Lehrs.)

$$b \cdot q \geq V\sqrt[m]{a} < b \cdot (q+1)$$

mithin auch

$$q = V\sqrt[m]{a} | b.$$

5. *Lehrsatz.* Wenn $a \geq b$, so ist auch $V\sqrt[m]{a} \geq V\sqrt[m]{b}$.

Beweis. Es sey $q = V\sqrt[m]{b}$, so ist $q^m \geq b$, also noch vielmehr

$q^m \geq a$, mithin (1. Lehrs.) $q \geq V\sqrt[m]{a}$.

Zusatz. Ist also $V\sqrt[m]{a} < V\sqrt[m]{b}$, so ist auch $a < b$.

6. *Lehrsatz.* Wenn $n \geq m$, so ist auch $V\sqrt[n]{a} \geq V\sqrt[m]{a}$.

Beweis. Es sey $V\sqrt[n]{a} = q$, so ist $a \geq q^n$, aber auch, weil

$n \geq m$, und q eine positive Zahl, $q^n \geq q^m$, mithin noch vielmehr $a \geq q^m$, folglich (1. Lehrs.) $V\sqrt[m]{a} \geq q$, oder $V\sqrt[m]{a} \geq V\sqrt[n]{a}$.

Zusatz. Ist also $V\sqrt[n]{a} > V\sqrt[m]{a}$, so ist auch $n < m$.

V i e r t e B e i l a g e.

1. *Lehrsatz.* Wenn $b \leq V\sqrt[m]{m}$, so ist b eine Theilungszahl von m , und $m | b > m | (b + 1)$.

Beweis. Da $b \leq V\sqrt[m]{m}$, so ist (3. Beilage 2. Lehrs. Zus.) $b^2 \leq m$, folglich (1. Beilage 1. Lehrs.) $b \leq m | b$. Setzt man also $m | b = a$, so hat man $b \leq a$. Aus $m | b = a$ folgt aber auch $a \cdot b \leq m < (a+1) \cdot b$, folglich, da $b \leq a$, noch vielmehr $a \cdot b \leq m < a \cdot (b+1)$, mithin $m | a = b$, also ist auch b eine Theilungszahl von m , mithin (2. Beil. 1. Lehrs.) auch $m | b > m | (b+1)$. Letzteres könnte auch so darge-
than werden. Aus $m < a \cdot (b+1)$ folgt (1. Beil. 2. Lehrs.) $m | (b+1) < a$, oder $m | (b+1) < m | b$.

Zusatz. Ist $m | b = m | (b+1)$, so ist $b > V\sqrt[m]{m}$.

2. *Lehrsatz.* Wenn $q = V\sqrt[m]{m}$, so ist $m | (q+1) \leq q$.

Beweis. Es ist $m < (q+1)^2$, folglich (1. Beilage 2. Lehrsatz) $m | (q+1) < q+1$, oder $m | (q+1) \leq q$.

3. *Lehrsatz.* Wenn $q = V\sqrt[m]{m}$, so ist $m | (q+1) \leq q-1$.

Beweis. Es ist $m \geq q^2$, folglich noch vielmehr $m \geq q^2 - 1$, oder $m \geq (q+1) \cdot (q-1)$, mithin (1. Beil. 1. Lehrs.) $m | (q+1) \leq q-1$.

4. *Lehrsatz.* Wenn $b > V\sqrt[m]{m}$, so ist $m | b \leq V\sqrt[m]{m}$.

Beweis. Es sey $V\sqrt[m]{m} = q$, so ist $b > q$, also $b \geq q+1$, folglich auch (1. Beil. 4. Lehrs.) $m | b \leq m | (q+1)$. Nun ist (2. Lehrsatz) $m | (q+1) \leq q$, also noch vielmehr $m | b \leq q$, oder $m | b \leq V\sqrt[m]{m}$.

Man könnte den Beweis auch so führen. Es sey $V\sqrt{m} = q$, so ist $m < (q+1)^2$. Nun ist nach der Voraussetzung $b > q$, also auch $b \geq q+1$, folglich auch $b \cdot (q+1) \geq (q+1)^2$, mithin noch vielmehr $m < b \cdot (q+1)$, folglich (1. Beil. 2. Lehrs.) $m | b < q+1$, oder $m | b \leq q$.

Zusatz. Ist also $m | b > V\sqrt{m}$, so ist $b \geq V\sqrt{m}$.

5. *Lehrsatz.* Ist $m | b = m | (b+1)$, so ist $m | b \leq V\sqrt{m}$.

Beweis. Folgt aus (1. Lehrs. Zus. und 4. Lehrs.)

1) *Zusatz.* Ist also $m | b > V\sqrt{m}$, so ist auch $m | b > m | (b+1)$. Dieß folgt nun theils aus Umkehrung des gegenwärtigen Lehrsatzes, theils aus (4. Lehrs. Zus. und 1. Lehrs.)

2) *Zusatz.* Gehört eine Theilungszahl von m zu mehreren Divisoren, so ist sie nicht gröfser als $V\sqrt{m}$.

3) *Zusatz.* Eine Theilungszahl von m also, die gröfser ist als $V\sqrt{m}$, kann nur zu einem Divisor gehören.

6. *Lehrsatz.* Wenn $b > V\sqrt{m}$, so ist $(m|b) - (m|(b+1)) \leq 1$.

Beweis. Es ist dann (4. Lehrs.) $m | b \leq V\sqrt{m}$, also $m | b < b$, folglich, wenn man $m | b = q$ setzt, $q < b$. Nun ist $q \cdot b \leq m$, mithin noch vielmehr $q \cdot (b+1) < m+b$, oder $(q-1) \cdot (b+1) < m-1$, mithin noch vielmehr $(q-1) \cdot (b+1) \leq m$, also (1. Beil. 1. Lehrs.) $q-1 \leq m|(b+1)$, oder $q - (m|(b+1)) \leq 1$.

Zusatz. Ist also $(m|b) - (m|(b+1)) > 1$, so ist $b \leq V\sqrt{m}$.

Anmerkung. Ein Ausdruck wie $A \geq B$, oder $B \leq A$ bedeutet in diesem Briefe, daſs A nicht kleiner sey als B , oder B nicht gröfser als A .

F ü n f t e B e i l a g e .

k	ψ_k	k	ψ_k	k	ψ_k	k	ψ_k	k	ψ_k	k	ψ_k	k	ψ_k
1	+1	37	-2	73	-4	109	-4	145	0	181	-4	217	+2
2	0	38	-1	74	-3	110	-5	146	+1	182	-5	218	+3
3	-1	39	0	75	-3	111	-4	147	+1	183	-4	219	+4
4	-1	40	0	76	-3	112	-4	148	+1	184	-4	220	+4
5	-2	41	-1	77	-2	113	-5	149	0	185	-3	221	+5
6	-1	42	-2	78	-3	114	-6	150	0	186	-4	222	+4
7	-2	43	-3	79	-4	115	-5	151	-1	187	-3	223	+3
8	-2	44	-3	80	-4	116	-5	152	-1	188	-3	224	+3
9	-2	45	-3	81	-4	117	-5	153	-1	189	-3	225	+3
10	-1	46	-2	82	-3	118	-4	154	-2	190	-4	226	+4
11	-2	47	-3	83	-4	119	-3	155	-1	191	-5	227	+3
12	-2	48	-3	84	-4	120	-3	156	-1	192	-5	228	+3
13	-3	49	-3	85	-3	121	-3	157	-2	193	-6	229	+2
14	-2	50	-3	86	-2	122	-2	158	-1	194	-5	230	+1
15	-1	51	-2	87	-1	123	-1	159	0	195	-6	231	0
16	-1	52	-2	88	-1	124	-1	160	0	196	-6	232	0
17	-2	53	-3	89	-2	125	-1	161	+1	197	-7	233	-1
18	-2	54	-3	90	-2	126	-1	162	+1	198	-7	234	-1
19	-3	55	-2	91	-1	127	-2	163	0	199	-8	235	0
20	-3	56	-2	92	-1	128	-2	164	0	200	-8	236	0
21	-2	57	-1	93	0	129	-1	165	-1	201	-7	237	+1
22	-1	58	0	94	+1	130	-2	166	0	202	-6	238	0
23	-2	59	-1	95	+2	131	-3	167	-1	203	-5	239	-1
24	-2	60	-1	96	+2	132	-3	168	-1	204	-5	240	-1
25	-2	61	-2	97	+1	133	-2	169	-1	205	-4	241	-2
26	-1	62	-1	98	+1	134	-1	170	-2	206	-3	242	-2
27	-1	63	-1	99	+1	135	-1	171	-2	207	-3	243	-2
28	-1	64	-1	100	+1	136	-1	172	-2	208	-3	244	-2
29	-2	65	0	101	0	137	-2	173	-3	209	-2	245	-2
30	-3	66	-1	102	-1	138	-3	174	-4	210	-1	246	-3
31	-4	67	-2	103	-2	139	-4	175	-4	211	-2	247	-2
32	-4	68	-2	104	-2	140	-4	176	-4	212	-2	248	-2
33	-3	69	-1	105	-3	141	-3	177	-3	213	-1	249	-1
34	-2	70	-2	106	-2	142	-2	178	-2	214	0	250	-1
35	-1	71	-3	107	-3	143	-1	179	-3	215	+1	251	-2
36	-1	72	-3	108	-3	144	-1	180	-3	216	+1	252	-2

k	ψ_k	k	ψ_k	k	ψ_k	k	ψ_k	k	ψ_k	k	ψ_k	k	ψ_k
253	-1	291	-7	329	0	367	-1	405	0	443	-9	481	-5
254	0	292	-7	330	+1	368	-1	406	-1	444	-9	482	-4
255	-1	293	-8	331	0	369	-1	407	0	445	-8	483	-5
256	-1	294	-8	332	0	370	-2	408	0	446	-7	484	-5
257	-2	295	-7	333	0	371	-1	409	-1	447	-6	485	-4
258	-3	296	-7	334	+1	372	-1	410	-2	448	-6	486	-4
259	-2	297	-7	335	+2	373	-2	411	-1	449	-7	487	-5
260	-2	298	-6	336	+2	374	-3	412	-1	450	-7	488	-5
261	-2	299	-5	337	+1	375	-3	413	0	451	-6	489	-4
262	-1	300	-5	338	+1	376	-3	414	0	452	-6	490	-4
263	-2	301	-4	339	+2	377	-2	415	+1	453	-5	491	-5
264	-2	302	-3	340	+2	378	-2	416	+1	454	-4	492	-5
265	-1	303	-2	341	+3	379	-3	417	+2	455	-5	493	-4
266	-2	304	-2	342	+3	380	-3	418	+1	456	-5	494	-5
267	-1	305	-1	343	+3	381	-2	419	0	457	-6	495	-5
268	-1	306	-1	344	+3	382	-1	420	0	458	-5	496	-5
269	-2	307	-2	345	+2	383	-2	421	-1	459	-5	497	-4
270	-2	308	-2	346	+3	384	-2	422	0	460	-5	498	-5
271	-3	309	-1	347	+2	385	-3	423	0	461	-6	499	-6
272	-3	310	-2	348	+2	386	-2	424	0	462	-5	500	-6
273	-4	311	-3	349	+1	387	-2	425	0	463	-6	501	-5
274	-3	312	-3	350	+1	388	-2	426	-1	464	-6	502	-4
275	-3	313	-4	351	+1	389	-3	427	0	465	-7	503	-5
276	-3	314	-3	352	+1	390	-2	428	0	466	-6	504	-5
277	-4	315	-3	353	0	391	-1	429	-1	467	-7	505	-4
278	-3	316	-3	354	-1	392	-1	430	-2	468	-7	506	-5
279	-3	317	-4	355	0	393	0	431	-3	469	-6	507	-5
280	-3	318	-5	356	0	394	+1	432	-3	470	-7	508	-5
281	-4	319	-4	357	-1	395	+2	433	-4	471	-6	509	-6
282	-5	320	-4	358	0	396	+2	434	-5	472	-6	510	-5
283	-6	321	-3	359	-1	397	+1	435	-6	473	-5	511	-4
284	-6	322	-4	360	-1	398	+2	436	-6	474	-6	512	-4
285	-7	323	-3	361	-1	399	+1	437	-5	475	-6	513	-4
286	-8	324	-3	362	0	400	+1	438	-6	476	-6	514	-3
287	-7	325	-3	363	0	401	0	439	-7	477	-6	515	-2
288	-7	326	-2	364	0	402	-1	440	-7	478	-5	516	-2
289	-7	327	-1	365	+1	403	0	441	-7	479	-6	517	-1
290	-8	328	-1	366	0	404	0	442	-8	480	-6	518	-2

k	ψ_k	k	ψ_k	k	ψ_k	k	ψ_k	k	ψ_k	k	ψ_k	k	ψ_k
519	-1	557	+4	595	+5	633	-2	671	-10	709	-4	747	-3
520	-1	558	+4	596	+5	634	-1	672	-10	710	-5	748	-3
521	-2	559	+5	597	+6	635	0	673	-11	711	-5	749	-2
522	-2	560	+5	598	+5	636	0	674	-10	712	-5	750	-2
523	-3	561	+4	599	+4	637	0	675	-10	713	-4	751	-3
524	-3	562	+5	600	+4	638	-1	676	-10	714	-3	752	-3
525	-3	563	+4	601	+3	639	-1	677	-11	715	-4	753	-2
526	-2	564	+4	602	+2	640	-1	678	-12	716	-4	754	-3
527	-1	565	+5	603	+2	641	-2	679	-11	717	-3	755	-2
528	-1	566	+6	604	+2	642	-3	680	-11	718	-2	756	-2
529	-1	567	+6	605	+2	643	-4	681	-10	719	-3	757	-3
530	-2	568	+6	606	+1	644	-4	682	-11	720	-3	758	-2
531	-2	569	+5	607	0	645	-5	683	-12	721	-2	759	-3
532	-2	570	+6	608	0	646	-6	684	-12	722	-2	760	-3
533	-1	571	+5	609	-1	647	-7	685	-11	723	-1	761	-4
534	-2	572	+5	610	-2	648	-7	686	-11	724	-1	762	-5
535	-1	573	+6	611	-1	649	-6	687	-10	725	-1	763	-4
536	-1	574	+5	612	-1	650	-6	688	-10	726	-1	764	-4
537	0	575	+5	613	-2	651	-7	689	-9	727	-2	765	-4
538	+1	576	+5	614	-1	652	-7	690	-8	728	-2	766	-3
539	+1	577	+4	615	-2	653	-8	691	-9	729	-2	767	-2
540	+1	578	+4	616	-2	654	-9	692	-9	730	-3	768	-2
541	0	579	+5	617	-3	655	-8	693	-9	731	-2	769	-3
542	+1	580	+5	618	-4	656	-8	694	-8	732	-2	770	-2
543	+2	581	+6	619	-5	657	-8	695	-7	733	-3	771	-1
544	+2	582	+5	620	-5	658	-9	696	-7	734	-2	772	-1
545	+3	583	+6	621	-5	659	-10	697	-6	735	-2	773	-2
546	+4	584	+6	622	-4	660	-10	698	-5	736	-2	774	-2
547	+3	585	+6	623	-3	661	-11	699	-4	737	-1	775	-2
548	+3	586	+7	624	-3	662	-10	700	-4	738	-1	776	-2
549	+3	587	+6	625	-3	663	-11	701	-5	739	-2	777	-3
550	+3	588	+6	626	-2	664	-11	702	-5	740	-2	778	-2
551	+4	589	+7	627	-3	665	-12	703	-4	741	-3	779	-1
552	+4	590	+6	628	-3	666	-12	704	-4	742	-4	780	-1
553	+5	591	+7	629	-2	667	-11	705	-5	743	-5	781	0
554	+6	592	+7	630	-2	668	-11	706	-4	744	-5	782	-1
555	+5	593	+6	631	-3	669	-10	707	-3	745	-4	783	-1
556	+5	594	+6	632	-3	670	-11	708	-3	746	-3	784	-1

k	ψ_k	k	ψ_k	k	ψ_k	k	ψ_k	k	ψ_k	k	ψ_k	k	ψ_k
785	0	816	+1	847	-1	878	+1	909	-1	940	+4	971	+1
786	-1	817	+2	848	-1	879	+2	910	0	941	+3	972	+1
787	-2	818	+3	849	0	880	+2	911	-1	942	+2	973	+2
788	-2	819	+3	850	0	881	+1	912	-1	943	+3	974	+3
789	-1	820	+3	851	+1	882	+1	913	0	944	+3	975	+3
790	-2	821	+2	852	+1	883	0	914	+1	945	+3	976	+3
791	-1	822	+1	853	0	884	0	915	0	946	+2	977	+2
792	-1	823	0	854	-1	885	-1	916	0	947	+1	978	+1
793	0	824	0	855	-1	886	0	917	+1	948	+1	979	+2
794	+1	825	0	856	-1	887	-1	918	+1	949	+2	980	+2
795	0	826	-1	857	-2	888	-1	919	0	950	+2	981	+2
796	0	827	-2	858	-1	889	0	920	0	951	+3	982	+3
797	-1	828	-2	859	-2	890	-1	921	+1	952	+3	983	+2
798	0	829	-3	860	-2	891	-1	922	+2	953	+2	984	+2
799	+1	830	-4	861	-3	892	-1	923	+3	954	+2	985	+3
800	+1	831	-3	862	-2	893	0	924	+3	955	+3	986	+2
801	+1	832	-3	863	-3	894	-1	925	+3	956	+3	987	+1
802	+2	833	-3	864	-3	895	0	926	+4	957	+2	988	+1
803	+3	834	-4	865	-2	896	0	927	+4	958	+3	989	+2
804	+3	835	-3	866	-1	897	-1	928	+4	959	+4	990	+2
805	+2	836	-3	867	-1	898	0	929	+3	960	+4	991	+1
806	+1	837	-3	868	-1	899	+1	930	+4	961	+4	992	+1
807	+2	838	-2	869	0	900	+1	931	+4	962	+3	993	+2
808	+2	839	-3	870	+1	901	+2	932	+4	963	+3	994	+1
809	+1	840	-3	871	+2	902	+1	933	+5	964	+3	995	+2
810	+1	841	-3	872	+2	903	0	934	+6	965	+4	996	+2
811	0	842	-2	873	+2	904	0	935	+5	966	+5	997	+1
812	0	843	-1	874	+1	905	+1	936	+5	967	+4	998	+2
813	+1	844	-1	875	+1	906	0	937	+4	968	+4	999	+2
814	0	845	-1	876	+1	907	-1	938	+3	969	+3	1000	+2
815	+1	846	-1	877	0	908	-1	939	+4	970	+2		

Bischof an Rothe.

War es Ihnen auch nicht möglich, eine allgemeine Formel aufzufinden, welche Ihr ϕ_m für jeden Werth von m darstellt: so haben Sie doch unsere Untersuchung recht sehr dadurch gefördert, daß Sie den Weg angegeben haben, wie man den Werth von ϕ_m für jedes besonders gegebene ganze positive m mit möglichster Schnelligkeit finden kann; d. h. in chemischer Sprache ausgedrückt, durch Ihre Anleitung sind wir nun im Stande, die Menge der Fälle oder Complexionen anzugeben, gesetzt auch, daß die Anzahl der Atome oder Massentheile, welche in eine organische Verbindung eingehen, bis Tausend stiege, was übrigens nie zu erwarten ist, da nach anderweit angestellten Berechnungen sie vielleicht kaum Zehen übersteigen wird. Gleichwohl ist in rein mathematischer Beziehung die von Ihnen so weit berechnete Tafel der ψ sehr merkwürdig, da die Zahlen dieser Tafel mehrentheils eine Zeitlang positiv, nur wenige Glieder 0 und dann negativ sind, und noch merkwürdiger ist es, daß in der so weit fortgesetzten Tafel keine höheren Werthe für ψ vorkommen als 12.

Wenn wir nun aber unsere Untersuchung zur höchsten Allgemeinheit führen wollen: so müssen wir diejenigen Complexionen unserer berechneten Tafeln, welche auf einerlei Verhältniß der Grundstoffe führen, obgleich sie an sich verschieden sind, unabhängig von diesen Tafeln, oder a priori zu bestimmen suchen. So finden Sie z. B., daß die Complexionen $b + c + 2e$; $a + 2b + d + e$; und $a + c + 3d$, desgleichen $3c + 2d + 3e$; $a + b + 2c + 3d + 2e$; und $a + 3b + c + d + 3e$ auf einerlei Verhältniß der Grundstoffe, nämlich auf das Verhältniß des Sauerstoffs, Wasserstoffs und Kohlenstoffs wie 24:4:24 führen. Wie kann man nun diese, auf einerlei Resultat führende Complexionen a priori finden?

Es sey z. B. das Verhältniß des Sauerstoffs zum Wasserstoff zum Kohlenstoff wie 40:18:42; aus welchen Complexionen wird dieses Verhältniß hervorgebracht werden können?

Ich gebe Ihnen diese Zahlen so, daß die erstere durch 8 und die letztere durch 6 theilbar ist, weil der stöchiometrische Werth des Sauerstoffs = 8, der des Kohlenstoffs = 6, unter der Voraussetzung, daß der des Wasserstoffs = 1 ist.

Rothe an Bischof.

Die Auflösung der mir vorgelegten Aufgabe, welche ich gefunden habe, gründet sich auf folgende Betrachtungen:

1. Es seyen die Verhältniszahlen des Sauer- Wasser- und Kohlenstoffs nach der Reihe 8.s, w und 6.k, ferner seyen $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$ die mit a, b, c, d, e als Coëfficienten zu verbindenden Zahlen, so kommt es darauf an, die Gleichungen

$$\alpha + \beta + 2\gamma = s, \quad \alpha + \delta + 2\epsilon = w, \quad \beta + \gamma + \delta + \epsilon = k$$

so aufzulösen, daß für $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$ bloß Null oder ganze positive Zahlen gesetzt werden dürfen.

2. Es gehört demnach das Problem, das Sie mir vorlegen, in die *unbestimmte Analytik*, und zwar in denjenigen Theil derselben, wo zwei Gleichungen weniger als unbekannte Größen vorhanden sind.

3. Aus den Gleichungen in (1.) ergeben sich folgende zehn, wo jede allemal drei unbekannte oder veränderliche Größen enthält:

1) $\alpha + \beta + 2\gamma = s$

6) $\alpha + \delta + 2\epsilon = w$

2) $2\alpha - \beta - \delta = s + w - 2k$

7) $3\beta + 4\gamma + \delta = s + 2k - w$

3) $3\alpha - \beta + 2\epsilon = s + 2w - 2k$

8) $2\beta + 3\gamma - \epsilon = s + k - w$

4) $3\alpha + 2\gamma - \delta = 2s + w - 2k$

9) $\beta + 3\delta + 4\epsilon = w + 2k - s$

5) $2\alpha + \gamma + \epsilon = s + w - k$

10) $-\gamma + 2\delta + 3\epsilon = w + k - s$

4. Hieraus erhellet, daß allemal, wenn von den fünf Größen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ und ϵ zwei als bekannt angenommen werden, dann die übrigen drei auch vollkommen bestimmt sind.

5. Soll aber diese Bestimmung so geschehen, daß keine gebrochenen Werthe für die drei übrigen Statt finden können, so müssen die angenommenen Größen entweder α und γ , oder α und ϵ , oder β und γ , oder δ und ϵ seyn.

6. Aus der fünften von den Gleichungen in (3.) erhellet, daß $s + w - k$, aus der siebenten, daß $s + 2k - w$, und aus der neunten, daß $w + 2k - s$ nicht negativ seyn dürfe, wenn die Aufgabe auflöslich seyn soll. Aus-

serdem müssen, was sich von selbst versteht, auch s , w und k ganze nicht negative Zahlen seyn.

7. Ist also entweder $s + w < k$, oder $s + 2k < w$, oder $w + 2k < s$, so ist die Aufgabe unauflösbar.

8. Es würde aber zu voreilig seyn hieraus zu schliessen, dafs umgekehrt allemal, wenn s , w , k , $s + w - k$, $s + 2k - w$, $w + 2k - s$ Null oder ganze positive Zahlen sind, die Aufgabe wenigstens auf eine Art lösbar seyn müsse.

9. Ist $s + w - k = 0$, so giebt es *eine* aber auch *nur eine* mögliche Auflösung, nämlich $\alpha = \gamma = \epsilon = 0$, $\beta = s$, $\delta = w$.

10. Ist $s + 2k - w = 0$, so giebt es *eine* aber auch *nur eine* mögliche Auflösung, nämlich $\beta = \gamma = \delta = 0$, $\alpha = s$, $\epsilon = k$.

11. Ist $w + 2k - s = 0$, so giebt es eben so *eine*, aber auch *nur eine* mögliche Auflösung, nämlich $\beta = \delta = \epsilon = 0$, $\alpha = w$, $\gamma = k$.

12. Ist $k = 0$, so muß, wie aus (6.) erhellet, auch $s = w$ gegeben seyn, und dann giebt es *eine*, aber auch *nur eine* mögliche Auflösung, nämlich $\beta = \gamma = \delta = \epsilon = 0$, $\alpha = s = w$.

13. Ist $w = 0$, so müssen nach (6.) auch $s - k$ und $2k - s$ ganze nicht negative Zahlen seyn, und dann giebt es *eine*, aber auch *nur eine* mögliche Auflösung, nämlich $\alpha = \delta = \epsilon = 0$, $\beta = 2k - s$, $\gamma = s - k$.

14. Ist $s = 0$, so müssen nach (6.) auch $w - k$ und $2k - w$ ganze nicht negative Zahlen seyn, und dann giebt es *eine*, aber auch *nur eine* mögliche Auflösung, nämlich $\alpha = \beta = \gamma = 0$, $\delta = 2k - w$, $\epsilon = w - k$.

15. Ist also eine der in (8.) angeführten sechs Gröfsen Null, und keine der fünf übrigen negativ, so giebt es allemal *eine*, aber auch *nur eine* mögliche Auflösung.

16. Ist $k = 1$, so ist $\beta + \gamma + \delta + \epsilon = 1$. Diese Gleichung läßt nur vier Auflösungen zu.

Erste Auflösung: $\beta = \gamma = \delta = 0, \epsilon = 1;$

Zweite Auflösung: $\beta = \gamma = \epsilon = 0, \delta = 1;$

Dritte Auflösung: $\beta = \delta = \epsilon = 0, \gamma = 1;$

Vierte Auflösung: $\gamma = \delta = \epsilon = 0, \beta = 1.$

Für die *erste* Auflösung ist $\alpha = s, \alpha + 2 = w$, also $w = s + 2$

- - *zweite* - - - $\alpha = s, \alpha + 1 = w, - w = s + 1$

- - *dritte* - - - $\alpha + 2 = s, \alpha = w, - w + 2 = s$

- - *vierte* - - - $\alpha + 1 = s, \alpha = w, - w + 1 = s.$

17. Hieraus erhellet, daß wenn $k = 1$, und $s = w =$ einer ganzen positiven Zahl gegeben ist, die Aufgabe auch unauflösbar sey, ohnerachtet jede der in (8.) angeführten sechs Gröſsen einen ganzen positiven Werth hat.

18. Für den Fall aber, daß $k = 1$, und s verschieden von w , jedoch so gegeben ist, daß keine der sechs Gröſsen in (8.) negativ wird, oder, welches einerlei ist, so, daß der Unterschied zwischen s und w höchstens 2 beträgt, giebt es allemal *eine*, aber auch *nur eine* mögliche Auflösung.

19. Aus den Gleichungen 1), 5), 6) in (3.) erhellet ohne Schwierigkeit, daß, wenn bei ungeändertem α , die Gröſse γ um 1 wächst, dann δ um 2 zunehmen, β aber um 2, und ϵ um 1 abnehmen müsse.

20. Schreibt man also sämtliche Auflösungen der gegebenen Aufgabe, für welche α einerlei Werth hat, so unter einander, daß die Werthe von β von oben nach unten immer abnehmen, so werden die Werthe von β immer um 2 abnehmen, die von γ immer um 1 zunehmen, die von δ immer um 2 zunehmen, die von ϵ aber immer um 1 abnehmen. Es sey z. B. $s = 25, w = 26, k = 32$. Nimmt man $\alpha = 3$ an, so sind sämtliche Auflösungen, wenn man sie auf die angezeigte Art ordnet:

α	β	γ	δ	ϵ
3	18	2	1	11
3	16	3	3	10
3	14	4	5	9
3	12	5	7	8
3	10	6	9	7
3	8	7	11	6
3	6	8	13	5
3	4	9	15	4
3	2	10	17	3
3	0	11	19	2

21. Hieraus erhellet, daß bei der ersten oder obersten Auflösung jeder solchen *Rubrik* entweder $\gamma=0$, oder $\delta \leq 2$ seyn müsse, und umgekehrt, ist bei einer Auflösung entweder $\gamma=0$, oder $\delta \leq 2$, so ist sie die erste oder oberste in der zugehörigen *Rubrik*.

22. Eben so erhellet, daß bei der letzten oder untersten Auflösung jeder solchen *Rubrik* entweder $\beta \leq 2$, oder $\epsilon=0$ seyn müsse, und umgekehrt, ist bei einer Auflösung entweder $\beta \leq 2$, oder $\epsilon=0$, so ist sie die unterste in der zugehörigen *Rubrik*.

23. Eben so erhellet aus den Gleichungen 1), 5), 6) in (3.), daß, wenn bei ungeändertem γ die Gröfse α um 1 abnimmt, dann β um 1, ϵ aber um 2 zunehmen, hingegen δ um 3 abnehmen müsse.

24. Hat man also eine Auflösung, worinnen $\alpha \geq 1$, und $\delta \geq 3$ ist, so kann man daraus eine neue ableiten, wenn man γ ungeändert läßt, α um 1, δ aber um 3 vermindert, dagegen aber β um 1, und ϵ um 2 vermehrt.

25. Läßt sich dieses auf die erste Auflösung irgend einer *Rubrik* anwenden, so bekommt man dadurch die erste Auflösung derjenigen *Rubrik*, wobei α um 1 kleiner ist als vorher. Denn nach der Voraussetzung ist bei der gegebenen Auflösung $\alpha \geq 1$, $\delta \geq 3$, weil sie aber eine *erste* in

einer Rubrik seyn soll, nach (21.) auch entweder $\gamma = 0$, oder $\delta < 2$. Das letzte kann nicht Statt finden, weil $\delta \geq 3$ ist, also mu $\ddot{s}$ s $\gamma = 0$ seyn, mithin mu $\ddot{s}$ s auch bei der neuen Aufl $\ddot{o}$ sung $\gamma = 0$, sie also die erste in der zugeh $\ddot{o}$ rigen Rubrik seyn.

26. Hat man eine Aufl $\ddot{o}$ sung, wobei $\alpha \geq 1$, $\beta \geq 1$, $\delta \geq 1$ ist, so l $\ddot{a}$ sst sich daraus eine andere ableiten, wenn man die Werthe von α , β , δ um 1 vermindert, die von γ und ε hingegen um 1 vermehrt. Dief $\ddot{s}$ s folgt ebenfalls sehr leicht aus den Gleichungen in (1.) oder (3.)

27. L $\ddot{a}$ sst sich auf die erste Aufl $\ddot{o}$ sung irgend einer Rubrik zwar nicht das Verfahren in (24.) wohl aber das in (26.) anwenden, so bekommt man dadurch die erste Aufl $\ddot{o}$ sung derjenigen Rubrik, wobei α um 1 kleiner ist als vorher. Denn nach der Voraussetzung ist bei der gegebenen Aufl $\ddot{o}$ sung $\alpha \geq 1$. Weil aber das Verfahren in (24.) darauf nicht anwendbar ist, entweder $\alpha < 1$, oder $\delta < 3$. Das erste widerspricht dem vorigen, also ist darinnen nothwendig $\delta < 3$, mithin $\delta - 1 < 2$, folglich die neue Aufl $\ddot{o}$ sung nach (21.) eine erste in der zugeh $\ddot{o}$ rigen Rubrik.

Beispiel. Nach (20.) ist, wenn $s = 25$, $w = 26$, $k = 32$, die erste Aufl $\ddot{o}$ sung der Rubrik f $\ddot{u}$ r $\alpha = 3$ folgende:

$$\alpha = 3, \beta = 18, \gamma = 2, \delta = 1, \varepsilon = 11.$$

Auf diese l $\ddot{a}$ sst sich das Verfahren in (24.) nicht anwenden, wohl aber das Verfahren in (26.). Nach letzterm findet man die Aufl $\ddot{o}$ sung:

$$\alpha = 2, \beta = 17, \gamma = 3, \delta = 0, \varepsilon = 12,$$

und dief $\ddot{s}$ s ist die *erste* Aufl $\ddot{o}$ sung der Rubrik f $\ddot{u}$ r $\alpha = 2$. Aus dieser er- giebt sich nun nach (20.) die *ganze* Rubrik f $\ddot{u}$ r $\alpha = 2$ also:

α	β	γ	δ	ε
2	17	3	0	12
2	15	4	2	11
2	13	5	4	10
2	11	6	6	9
2	9	7	8	8
2	7	8	10	7
2	5	9	12	6
2	3	10	14	5
2	1	11	16	4

28. Eben so erhellet aus den Gleichungen 1), 5), 6) in (3.) ohne Schwierigkeit, daß, wenn bei ungeändertem ε die Gröfse α um 1 abnimmt, dann γ um 2, δ um 1 zunehmen, hingegen β um 3 abnehmen müsse.

29. Hat man also eine Auflösung, wobei $\alpha \geq 1$, $\beta \geq 3$ ist, so kann man daraus eine neue ableiten, wenn man ε ungeändert läßt, α um 1, β aber um 3 vermindert, dagegen aber γ um 2 und δ um 1 vermehrt.

30. Läßt sich auf die erste Auflösung irgend einer Rubrik weder das Verfahren in (24.) noch das in (26.), wohl aber das in (29.) anwenden, so bekommt man dadurch die erste Auflösung derjenigen Rubrik, wobei α um 1 kleiner ist als vorher. Denn nach der Voraussetzung ist bei der gegebenen Auflösung $\alpha \geq 1$, $\beta \geq 3$. Weil aber das Verfahren (26.) darauf nicht anwendbar ist, entweder $\alpha < 1$, oder $\beta < 1$, oder $\delta < 1$. Die beiden ersten Annahmen widersprechen aber der vorigen, also ist $\delta < 1$, mithin $\delta + 1 < 2$, folglich nach (21.) die neue Auflösung eine erste in der zugehörigen Rubrik.

Beispiel. Nach (27.) ist; wenn $s = 25$, $w = 26$, $k = 32$, die erste Auflösung der Rubrik für $\alpha = 2$ folgende:

$$\alpha = 2, \beta = 17, \gamma = 3, \delta = 0, \varepsilon = 12.$$

Auf diese läßt sich das Verfahren in (24.) und (26.) nicht anwenden, wohl aber das Verfahren in (29.). Nach letzterm findet man die Auflösung:

$$\alpha = 1, \beta = 14, \gamma = 5, \delta = 1, \varepsilon = 12,$$

und dieß ist die erste Auflösung der Rubrik für $\alpha = 1$. Aus dieser ergibt sich nun nach (20.) die ganze Rubrik für $\alpha = 1$ also:

α	β	γ	δ	ε
1	14	5	1	12
1	12	6	3	11
1	10	7	5	10
1	8	8	7	9
1	6	9	9	8
1	4	10	11	7
1	2	11	13	6
1	0	12	15	5

31. Läßt sich auf die erste Auflösung in einer Rubrik, oder überhaupt auf irgend eine Auflösung keines der Verfahren in (24.), (26.) und (29.) anwenden, und ist doch darinnen $\alpha > 0$, so können bei dieser Auflösung nur fünf Fälle Statt finden: es ist nämlich entweder $\beta = 0, \delta = 2$, oder $\beta = 0, \delta = 1$, oder $\beta = 0, \delta = 0$, oder $\beta = 1, \delta = 0$, oder $\beta = 2, \delta = 0$. Denn da sich das Verfahren (26.) nicht anwenden läßt, so ist entweder α oder β oder δ gleich 0. Das erste widerspricht aber der Voraussetzung $\alpha > 0$, also ist entweder β oder δ gleich 0. Da sich ferner das Verfahren (24.) nicht anwenden läßt, so ist entweder $\alpha = 0$, oder $\delta < 3$. Das erste widerspricht ebenfalls der Voraussetzung $\alpha > 0$, also ist nothwendig $\delta < 3$. Eben so erhellet, daß, weil sich das Verfahren (29.) nicht anbringen läßt, nothwendig $\beta < 3$ seyn müsse. Es ist also jede der beiden Zahlen β und δ kleiner als 3, und eine darunter muß 0 seyn, also können nur die angeführten fünf Fälle Statt finden.

32. Läßt sich auf die erste Auflösung einer Rubrik, oder überhaupt auf irgend eine Auflösung keines der Verfahren in (24.), (26.) und (29.) anwenden, so kann es keine Auflösungen geben, welche einen niedrigeren Werth von α enthielten. Denn ist in der gegebenen Auflösung $\alpha = 0$, so ist kein Beweis nöthig. Ist aber $\alpha > 0$, so können darinnen nach (31.) nur die daselbst angeführten fünf Fälle Statt finden. Gäbe es nun eine Auflösung mit einem niedrigeren Werthe von α , so enthalte sie die Zahlen ' α ', ' β ', ' γ ', ' δ ', ' ε ', wo also $\alpha > '\alpha$ seyn möge. Nach der Gleichung 2) in (3.) wäre dann $2\alpha - \beta - \delta = 2'\alpha - '\beta - '\delta$, also $2(\alpha - '\alpha) = (\beta + \delta) - (' \beta + '\delta)$. Da nun $\alpha > '\alpha$, so ist offenbar $2(\alpha - '\alpha) > 2$, es müßte also auch $(\beta + \delta) - (' \beta + '\delta) > 2$, also noch vielmehr $\beta + \delta > 2$ seyn. In dem zweiten, dritten und vierten der in (31.) angeführten fünf Fälle ist aber $\beta + \delta \leq 2$, also können selbige nicht Statt finden, und es bliebe nur der erste und fünfte übrig. In diesen beiden Fällen aber ist $\beta + \delta = 2$, also könnte nur $2(\alpha - '\alpha) = 2 - (' \beta + '\delta)$, oder $' \beta + '\delta + 2(\alpha - '\alpha - 1) = 0$ seyn, es müßte also auch $' \beta = '\delta = \alpha - '\alpha - 1 = 0$ seyn. Nun ist aber auch nach den Gleichungen 1) und 6) in (3.)

$(\alpha - '\alpha) + (\beta - '\beta) + 2(\gamma - '\gamma) = 0$, $(\alpha - '\alpha) + (\delta - '\delta) + 2(\varepsilon - '\varepsilon) = 0$
 folglich da $\alpha - '\alpha = 1$, und $' \beta = '\delta = 0$, auch

$$1 + \beta + 2(\gamma - '\gamma) = 0, \quad 1 + \delta + 2(\varepsilon - '\varepsilon) = 0$$

mithin

$$\beta = 2(' \gamma - \gamma) - 1, \quad \delta = 2(' \varepsilon - \varepsilon) - 1$$

also β und δ ungerade, welches weder im ersten noch fünften Falle Statt findet.

33. Aus den Gleichungen 1), 5) und 6) in (3.) ergibt sich, daß α nicht größer seyn könne als jede der drei Größen s , w und $\frac{s + w - k}{2}$.

34. Ist

$$s > \frac{s + w - k}{2} \text{ und } w > \frac{s + w - k}{2}$$

so ist $s + k - w$ und $w + k - s$ positiv, mithin auch die Summe dieser beiden Gröſsen oder $2k$, also auch k , mithin noch vielmehr $s + 2k - w$, und $w + 2k - s$ positiv.

35. Ist daher noch überdies $s + w - k$ gerade, und, wie nach (6.) erfordert wird, nicht negativ, so ist $\frac{s + w - k}{2}$ der höchste Werth, den α annehmen kann, und für diesen giebt es die *einzige mögliche* Auflösung:

$$\alpha = \frac{s + w - k}{2}, \beta = \frac{s + k - w}{2}, \gamma = 0, \delta = \frac{w + k - s}{2}, \epsilon = 0.$$

36. Ist aber noch überdies $s + w - k$ ungerade, und, wie nach (6.) erfordert wird, positiv, so ist $\frac{s + w - k - 1}{2}$ der höchste Werth, welchen α annehmen kann, und für diesen giebt es die beiden Auflösungen entweder

$$\alpha = \frac{s + w - k - 1}{2}, \beta = \frac{s + k - w - 3}{2}, \gamma = 1, \delta = \frac{w + k - s + 1}{2}, \epsilon = 0,$$

$$\text{oder} \quad \alpha = \frac{s + w - k - 1}{2}, \beta = \frac{s + k - w + 1}{2}, \gamma = 0, \delta = \frac{w + k - s - 3}{2}, \epsilon = 1,$$

und ausser diesen beiden sind für gedachten Werth von α keine andern möglich.

37. Ist hier $w + k - s = 1$, so wird die *zweite* Auflösung unmöglich, und ist $s + k - w = 1$, so wird es die erste. Ist hingegen $w + k - s > 1$, so ist die zweite Auflösung möglich, und ist $s + k - w > 1$, so ist es die erste.

38. Es können also beide Auflösungen in (36.) möglich seyn. Es kann aber auch eine möglich und die andere unmöglich seyn. Es können aber auch beide unmöglich seyn, wenn nämlich zugleich $s + k - w = 1$, und $w + k - s = 1$, oder, welches einerlei ist, wenn $k = 1$ und $s = w$ ist. Dann giebt es nach (17.) gar keine Auflösung.

39. Ist s , w und k so gegeben, daß

$$\frac{s + w - k}{2} \geq w,$$

so ist auch $s - w - k$ nicht negativ. Da nun, wenn die Aufgabe möglich seyn soll, nach (6.) $w + 2k - s$ nicht negativ seyn darf, so ist auch die Summe beider Größen oder k nicht negativ, also noch vielmehr $s - w$, $s + k - w$, $s + 2k - w$ nicht negativ. Da also $s + k - w$ nicht negativ ist, so ist auch $s \geq \frac{s + w - k}{2}$, folglich nach (33.) w der höchste Werth für α , und für diesen giebt es die *einzige mögliche* Auflösung:

$$\alpha = w, \beta = w + 2k - s, \gamma = s - w - k, \delta = 0, \varepsilon = 0.$$

40. Ist s , w und k so gegeben, daß

$$\frac{s + w - k}{2} \geq s,$$

so ist auch $w - s - k$ nicht negativ. Da nun, wenn die Aufgabe möglich seyn soll, nach (6.) $s + 2k - w$ nicht negativ seyn darf, so ist auch die Summe beider Größen oder k nicht negativ, also noch vielmehr $w - s$, $w + k - s$, $w + 2k - s$ nicht negativ. Da also $w + k - s$ nicht negativ ist, so ist auch $w \geq \frac{s + w - k}{2}$, folglich nach (33.) s der höchste Werth für α , und für diesen giebt es die *einzige mögliche* Auflösung:

$$\alpha = s, \beta = 0, \gamma = 0, \delta = s + 2k - w, \varepsilon = w - s - k.$$

41. Wie also auch die Zahlen s , w , k gegeben seyn mögen, so giebt es allemal, dafern nur jede der in (8.) erwähnten sechs Größen eine ganze nicht negative Zahl ist, für den höchsten Werth, welchen α nach (33.) annehmen kann, *höchstens zwei*, und *wenigstens eine* Auflösung, den einzigen in (17.) bemerkten Fall ausgenommen, wenn $s = w > 0$, und $k = 1$ gegeben ist, wo gar keine Auflösung möglich ist.

42. Aus der Gleichung 2) in (3.) erhellet sogleich, daß α niemals kleiner seyn könne als $\frac{s + w}{2} - k$.

43. Die Summe der beiden ganzen, nach (6.) nicht negativen Zahlen $s + 2k - w$ und $w + 2k - s$ ist $4k$, also ein Vielfaches von 4.

44. Je nachdem also die eine dieser Zahlen durch 4 dividirt 0, 1, 2, 3 zum Reste läßt, je nachdem wird auch die andere ebenfalls durch 4 dividirt 0, 3, 2, 1 zum Reste übrig lassen.

45. Läßt sich jede dieser Zahlen durch 4 ohne Rest dividiren, und ist $\frac{s+w}{2} - k$ nicht negativ, so ist dieses der kleinste Werth, den α annehmen kann, und für diesen giebt es die *einzige mögliche* Auflösung:

$$\alpha = \frac{s+w}{2} - k, \beta = 0, \gamma = \frac{s+2k-w}{4}, \delta = 0, \epsilon = \frac{w+2k-s}{4}.$$

46. Läßt aber $s + 2k - w$ den Rest 3, und $w + 2k - s$ den Rest 1, und ist $\frac{s+w+1}{2} - k$ nicht negativ, so ist dieses der kleinste Werth, den α annehmen kann, und für diesen giebt es die *einzige mögliche* Auflösung:

$$\alpha = \frac{s+w+1}{2} - k, \beta = 1, \gamma = \frac{s+2k-w-3}{4}, \delta = 0, \epsilon = \frac{w+2k-s-1}{4}.$$

47. Läßt aber umgekehrt $s + 2k - w$ den Rest 1, und $w + 2k - s$ den Rest 3, und ist $\frac{s+w+1}{2} - k$ nicht negativ, so ist dieses der kleinste Werth, den α annehmen kann, und für diesen giebt es die *einzige mögliche* Auflösung:

$$\alpha = \frac{s+w+1}{2} - k, \beta = 0, \gamma = \frac{s+2k-w-1}{4}, \delta = 1, \epsilon = \frac{w+2k-s-3}{4}.$$

48. Lassen endlich die beiden Zahlen $s + 2k - w$, und $w + 2k - s$ durch 4 dividirt 2 zum Reste, und ist $\frac{s+w}{2} + 1 - k$ nicht negativ, so giebt es für diesen Werth von α die beiden Auflösungen

entwe-

entweder

$$\alpha = \frac{s+w}{2} + 1 - k, \beta = 2, \gamma = \frac{s+2k-w-6}{4}, \delta = 0, \epsilon = \frac{w+2k-s-2}{4}$$

oder

$$\alpha = \frac{s+w}{2} + 1 - k, \beta = 0, \gamma = \frac{s+2k-w-2}{4}, \delta = 2, \epsilon = \frac{w+2k-s-6}{4}.$$

Ausser diesen beiden Auflösungen sind für gedachten Werth von α keine andern möglich.

49. Ist hier $s + 2k - w = 2$, so wird die erste Auflösung unmöglich, und ist $w + 2k - s = 2$, so wird die zweite unmöglich. Ist hingegen $s + 2k - w > 2$, so ist die erste Auflösung möglich, und ist $w + 2k - s > 2$, so ist die zweite möglich.

50. Es können also unter der Voraussetzung, dass $s + 2k - w$ und $w + 2k - s$ durch 4 dividirt 2 zum Reste lassen, und $\frac{s+w}{2} + 1 - k$ nicht negativ ist, beide Auflösungen in (48.) möglich seyn, es kann aber auch nur eine möglich, und die andere unmöglich seyn, und in beiden Fällen ist $\frac{s+w}{2} + 1 - k$ der niedrigste Werth, den α annehmen kann. Es können aber auch beide Auflösungen zugleich unmöglich seyn, wenn nämlich zugleich $s + 2k - w = 2$, und $w + 2k - s = 2$, oder, welches einerlei ist, wenn $s = w > 0$, $k = 1$ ist. Dann giebt es nach (17.) *gar keine* Auflösung.

51. Die in (45.) — (48.) angegebenen Bestimmungen des kleinsten Werthes von α und der zugehörigen Auflösungen gelten bloß dann, wenn dieser Werth nicht negativ ausfällt. Ist aber dieses der Fall, so ist 0 der niedrigste Werth von α .

52. Eben so erhellet, dass dann nothwendig $s + w < 2k$ seyn müsse.

53. Ist nun noch überdies $2k \geq w + 2s$, so ist
 $\alpha = 0, \beta = s, \gamma = 0, \delta = 2k - w - 2s, \epsilon = s + w - k$
 die erste Auflösung der Rubrik für $\alpha = 0$.

54. Ist hingegen $2k \leq w + 2s$, so ist
entweder

$$\alpha = 0, \beta = 2k - s - w, \gamma = s + \frac{1}{2}w - k, \delta = 0, \varepsilon = \frac{1}{2}w.$$

oder

$\alpha = 0, \beta = 2k - s - w - 1, \gamma = s + \frac{1}{2}(w + 1) - k, \delta = 1, \varepsilon = \frac{1}{2}(w - 1),$
je nachdem w gerade oder ungerade ist, die erste Auflösung der Rubrik
für $\alpha = 0$.

55. Ist abermals 0 der niedrigste Werth von α , ferner $s + w < 2k$,
und noch überdies $2k \geq s + 2w$, so ist

$$\alpha = 0, \beta = 2k - s - 2w, \gamma = s + w - k, \delta = w, \varepsilon = 0.$$

die letzte Auflösung der Rubrik für $\alpha = 0$.

56. Ist hingegen wie vorhin 0 der niedrigste Werth von α , und
 $s + w < 2k$, jedoch noch überdies $2k \leq s + 2w$, so ist
entweder

$$\alpha = 0, \beta = 0, \gamma = \frac{1}{2}s, \delta = 2k - w - s, \varepsilon = \frac{1}{2}s + w - k$$

oder

$$\alpha = 0, \beta = 1, \gamma = \frac{1}{2}(s - 1), \delta = 2k - w - s - 1, \varepsilon = \frac{1}{2}(s + 1) + w - k$$

je nachdem s gerade oder ungerade ist, die letzte Auflösung der Rubrik
für $\alpha = 0$.

57. Nun sind wir im Stande, sämtliche Auflösungen der vorgeleg-
ten Gleichungen in Rubriken, wie oben angegeben worden, nämlich so
darzustellen, daß jede Rubrik einerlei α enthalte, darinnen die Werthe
von β von oben nach unten abnehmen, jede folgende Rubrik aber ein
niedrigeres α enthalte, als die zunächst vorhergehende. Man hat zu dem
Ende folgende Regeln zu beobachten:

1) Man bestimme nach den Betrachtungen von (34.) bis (40.) den
höchsten Werth, welchen α annehmen kann, und die ihm entsprechen-
den eine oder zwei Auflösungen, und schreibe, wenn es zwei Auflösun-
gen giebt, diejenige zuerst, welche das grössere β enthält, so erhält man
die erste Rubrik. Diese Bestimmung geschieht,

wenn $s > \frac{s+w-k}{2}$ und auch $w > \frac{s+w-k}{2}$, nach (34.) bis (38.);

wenn $\frac{s+w-k}{2} \leq w$, nach (39.);

wenn $\frac{s+w-k}{2} \leq s$, nach (40.).

2) Aus der ersten Auflösung jeder Rubrik leite man eine andere Auflösung nach (24.) ab, und wenn dieß nicht geschehen kann, nach (26.), und wenn auch dieß nicht seyn kann, nach (29.), so bekommt man, wie in (25.), (27.) und (30.) gezeigt worden, die erste Auflösung der nächst folgenden Rubrik.

3) Aus der ersten Auflösung jeder Rubrik leite man alle übrige nach (20.), oder so ab, daß die Werthe von β und ε , so lange es geschehen kann, immer um 2 und 1 vermindert, die von δ und γ aber immer um 2 und 1 vermehrt werden.

4) So fahre man fort, bis man eine Rubrik erhält, aus deren erster Auflösung nach 2) keine neue abgeleitet werden kann, so ist dieses nach (32.) die letzte.

Einige Beispiele werden diese Regeln erläutern.

Erstes Beispiel. Es sey $s=7$, $w=8$, $k=11$, so ist $\frac{s+w-k}{2}=2$, also dieses *kleiner* als s und w . Es sind daher die Betrachtungen von (34.) bis (38.) anzuwenden. Nach diesen ist 2 der höchste Werth von α , für diesen ergibt sich nach (35.) die einzig mögliche Auflösung $\alpha=2$, $\beta=5$, $\gamma=0$, $\delta=6$, $\varepsilon=0$, aus welcher alle übrige abgeleitet werden, wie folgende Tafel angiebt:

α	β	γ	δ	ϵ
2	5	0	6	0
1	6	0	3	2
1	4	1	5	1
1	2	2	7	0
0	7	0	0	4
0	5	1	2	3
0	3	2	4	2
0	1	3	6	1

Zweites Beispiel. Es sey $s = 13$, $w = 14$, $k = 11$, so ist $\frac{s+w-k}{2} = 8$, also wieder dieses *kleiner* als s und w . Es sind daher die Betrachtungen von (34.) bis (38.) anzuwenden. Nach diesen ist 8 der höchste Werth von α , und für diesen ergibt sich nach (35.) die einzig mögliche Auflösung $\alpha = 8$, $\beta = 5$, $\gamma = 0$, $\delta = 6$, $\epsilon = 0$, aus welcher alle übrige abgeleitet werden, wie folgende Tafel angiebt:

α	β	γ	δ	ϵ
8	5	0	6	0
7	6	0	3	2
7	4	1	5	1
7	2	2	7	0
6	7	0	0	4
6	5	1	2	3
6	3	2	4	2
6	1	3	6	1
5	4	2	1	4
5	2	3	3	3
5	0	4	5	2
4	3	3	0	5
4	1	4	2	4
3	0	5	1	5

*) Weil bei diesem und dem ersten Beispiele die Werthe von k und $s - w$ einerlei sind, die Werthe von s und w aber im ersten Beispiele um 6 kleiner sind, als im andern, so würde man die Auflösungen des ersten Beispiels aus denen des zweiten ableiten können, wenn man bei allen Auflösungen des letztern, worinnen

Drittes Beispiel. Es sey $s = 17$, $w = 22$, $k = 10$, so ist $\frac{s+w-k}{2} = 14\frac{1}{2}$, also wieder dieses *kleiner* als s und w . Es sind daher abermals die Betrachtungen von (34.) bis (38.) anzuwenden. Nach diesen ist 14 der höchste Werth von α , für diesen ergeben sich nach (36.) zwei Auflösungen, aus welchen alle übrige abgeleitet werden, wie folgende Tafel angiebt:

α	β	γ	δ	ϵ
14	3	0	6	1
14	1	1	8	0
13	4	0	3	3
13	2	1	5	2
13	0	2	7	1
12	5	0	0	5
12	3	1	2	4
12	1	2	4	3
11	2	2	1	5
11	0	3	3	4
10	1	3	0	6

Viertes Beispiel. Es sey $s = 17$, $w = 18$, $k = 16$, so ist $\frac{s+w-k}{2} = 9\frac{1}{2}$, also wieder dieses *kleiner* als s und w . Es sind daher abermals die Betrachtungen von (34.) bis (38.) anzuwenden. Nach diesen ist 9 der höchste Werth von α , für diesen giebt es nach (36.) zwei Auflösungen, aus welchen alle übrige abgeleitet werden, wie folgende Tafel angiebt:

α nicht niedriger als 6 ist, die Werthe von α um 6 vermindert. Eben so könnte man auf ähnliche Art rückwärts die ersten Auflösungen des zweiten Beispiels, diejenigen nämlich, worinnen $\alpha \leq 6$ ist, aus denen des ersten ableiten, wenn man die Werthe von α um 6 vermehrt.

α	β	γ	δ	ε
9	8	0	7	1
9	6	1	9	0
8	9	0	4	3
8	7	1	6	2
8	5	2	8	1
8	3	3	10	0
7	10	0	1	5
7	8	1	3	4
7	6	2	5	3
7	4	3	7	2
7	2	4	9	1
7	0	5	11	0
6	9	1	0	6
6	7	2	2	5
6	5	3	4	4
6	3	4	6	3
6	1	5	8	2
5	6	3	1	6
5	4	4	3	5
5	2	5	5	4
5	0	6	7	3
4	5	4	0	7
4	3	5	2	6
4	1	6	4	5
3	2	6	1	7
3	0	7	3	6
2	1	7	0	8

Fünftes Beispiel. Es sey $s=5$, $w=18$, $k=7$, so ist $\frac{s+w-k}{2}=8$, also dieses größer als s . Es ist daher hier die Betrachtung in (40.) anzuwenden, und nach dieser giebt es die einzige Auflösung $\alpha=5$, $\beta=0$, $\gamma=0$, $\delta=1$, $\varepsilon=6$, aus welcher sich keine neue ableiten läßt. Dies war das Beispiel, welches Sie mir vorlegten.

Als Zusatz bemerke ich, daß das Verhältniß des Sauer- Wasser- und Kohlenstoffs ungeändert bleibt, wenn man s , w , k mit jeder gan-

zen Zahl multiplicirt. Dadurch wird die Menge der Auflösungen eigentlich unendlich groß, wenn man keine Gränze annimmt, welche die Werthe von α , β , γ , δ und ϵ nicht übersteigen dürfen. Nimmt man aber eine solche Gränze z. B. 3 an, so bleibt die Menge der Auflösungen immer endlich.

Erstes Beispiel. Es sey anfangs $s=2$, $w=2$, $k=3$, so giebt es nach (34.) bis (38.) die Auflösungen:

α	β	γ	δ	ϵ	
0	2	0	0	1	0
0	0	1	2	0	0

welche sämmtlich brauchbar sind, wenn 3 die Gränze der Elemente ist.

Nun sey $s=4$, $w=4$, $k=6$, so hat man eben so die Auflösungen:

α	β	γ	δ	ϵ	
1	3	0	3	0	0
0	4	0	0	2	1
0	2	1	2	1	0
0	0	2	4	0	0

Von diesen Auflösungen trifft die zweite und vierte mit beiden vorigen überein. Die erste und dritte aber ist neu, und brauchbar, wenn 3 die Gränze der Elemente ist.

Nun setze man $s=6$, $w=6$, $k=9$, so hat man die Auflösungen:

α	β	γ	δ	ϵ	
1	5	0	3	1	1
1	3	1	5	0	1
0	6	0	0	3	0
0	4	1	2	2	0
0	2	2	4	1	0
0	0	3	6	0	0

welche aber sämmtlich unbrauchbar sind, wenn 3 die Gränze der Elemente ist.

Eben so würde man lauter für diese Gränze unbrauchbare Auflösungen erhalten, wenn man $s=8$, $w=8$, $k=12$ annehmen wollte u. s. w.

Ist also 3 die Gränze der Elemente, so hat man in allem bloß die Auflösungen:

α	β	γ	δ	ϵ
1	3	0	3	0
0	12	01	02	12
0	02	02	01	01
0	0	1	2	0

Zweites Beispiel. Es sey anfangs $s=5$, $w=2$, $k=4$, so hat man nach (34.) bis (38.) die Auflösungen:

α	β	γ	δ	ϵ
1	2	01	01	0
0	1	2	0	1

welche beide für die Gränze 3 brauchbar sind.

Nun setze man $s=10$, $w=4$, $k=8$, so hat man die Auflösungen:

α	β	γ	δ	ϵ
3	7	0	1	0
2	6	1	0	1
2	4	2	2	0
1	3	3	1	1
1	1	4	3	0
0	2	4	0	2
0	0	5	2	1

von welchen nur noch die vierte neu und für die Gränze 3 brauchbar ist.

Setzte

Setzte man $s=15$, $w=6$, $k=12$, so würde man für die Gränze 3 lauter unbrauchbare Auflösungen erhalten, und das würde bei noch höhern Werthen von s , w und k noch vielmehr der Fall seyn.

Ist also 3 die Gränze, so hat man blofs die 3 brauchbaren Auflösungen:

α	β	γ	δ	ε
1	3	3	1	1
1	2	1	1	0
0	1	2	0	1

Drittes Beispiel. Es sey anfangs $s=3$, $w=4$, $k=4$, so hat man die Auflösungen

α	β	γ	δ	ε
1	2	0	1	1
1	0	1	3	0
0	1	1	0	2

welche sämmtlich für die Gränze 3 brauchbar sind.

Nun setze man $s=6$, $w=8$, $k=8$, so erhält man die Auflösungen

α	β	γ	δ	ε
3	3	0	5	0
2	4	0	2	2
2	2	1	4	1
2	0	2	6	0
1	3	1	1	3
1	1	2	3	2
0	2	2	0	4
0	0	3	2	3

von welchen blofs die fünfte, sechste und achte für die erwähnte Gränze brauchbar ist.

Setzte man $s=9$, $w=12$, $k=12$, so würde man für die Gränze 3 lauter unbrauchbare Auflösungen erhalten, und das würde noch vielmehr der Fall seyn, wenn man $s=12$, $w=16$, $k=16$ u. s. w. setzen wollte.

Es sind also für die Gränze 3 die brauchbaren Auflösungen bloß folgende:

α	β	γ	δ	ϵ
1	3	1	1	3
1	2	0	1	1
1	1	2	3	2
1	0	1	3	0
0	1	1	0	2
0	0	3	2	3

wie in Ihrem Briefe auch angegeben wurde.

Ueberhaupt ist zu bemerken, und leicht einzusehen, daß keine für erwähnte Gränze brauchbaren Auflösungen Statt finden können, wenn eine der drei Größen s , w und k größer als 12 gegeben ist.

α	β	γ	δ	ϵ
0	3	0	3	3
2	2	0	4	2
1	4	1	2	2
0	3	2	0	2
3	1	1	3	1
2	3	2	1	1
4	0	2	2	0
3	2	3	0	0

N a c h t r a g.

Was in (27.) von der *ersten* Auflösung einer Rubrik gesagt worden, gilt überhaupt von *jeder* Auflösung, wenn sie auch nicht eine erste in der zugehörigen Rubrik seyn sollte, indem der dort geführte Beweis dieses letztere nirgends voraussetzt.

Da übrigens nach gedachtem Beweis δ , also noch vielmehr $\delta - 1$ kleiner als 3 ist, so läßt sich auch auf die abgeleitete Auflösung das Verfahren in (24.) nicht anwenden.

Was ferner in (30.) gesagt worden, kann noch allgemeiner und bestimmter so ausgedrückt werden:

Läßt sich auf irgend eine Auflösung zwar nicht das Verfahren in (26.), wohl aber das in (29.) anwenden, so ist die gegebene sowohl, als auch die abgeleitete Auflösung eine *erste* in der zugehörigen Rubrik, und auf die gegebene sowohl, als abgeleitete Auflösung das Verfahren in (24.) nicht anwendbar. Denn weil sich auf die gegebene Auflösung das Verfahren in (29.) anwenden läßt, so ist darinnen $\alpha \geq 1$, $\beta \geq 3$. Weil aber das Verfahren in (26.) *nicht* darauf angewendet werden kann, entweder $\alpha < 1$, oder $\beta < 1$, oder $\delta < 1$. Die beiden ersten Annahmen aber können nicht Statt finden, weil sie der Voraussetzung $\alpha \geq 1$, $\beta \geq 3$ widersprechen. Es ist also nothwendig $\delta < 1$, mithin ist auch $\delta < 2$, und $\delta + 1 < 2$, also sowohl die gegebene als abgeleitete Auflösung nach (21.) eine *erste* in der zugehörigen Rubrik. Es ist aber auch $\delta < 3$, und $\delta + 1 < 3$, also sowohl auf die gegebene, als auch abgeleitete Auflösung das Verfahren in (24.) nicht anwendbar.

Wir lassen nun die mit vieler Mühe berechneten Tafeln folgen, welche alle oben (S. 69 — 75) angegebenen 961 Complexionen der fünf binären Verbindungen des Sauerstoffs, Wasserstoffs und Kohlenstoffs enthalten. Es bezeichnet:

a	einen Verhältnistheil (Massentheil, Atom)	Wasser
b	-	Kohlenoxydgas
c	-	Kohlensäure
d	-	Oelerzeugendes Gas
e	-	Kohlenwasserstoffgas.

Um die Tafeln nicht zu weitläufig zu machen, gingen wir bloß bis auf drei Verhältnistheile.

Zur Erklärung dieser Tafeln fügen wir nur noch folgendes bei. Die erste Spalte enthält die fortlaufenden Nummern der Complexionen. Die zweite die Nummern der mit jenen gleichgeltenden Complexionen, d. h. derjenigen, welche zwar an sich verschieden sind, aber doch auf einerlei Verhältniß der Grundstoffe führen. Da nur ein einziges Mal der Fall eintrat, wo 21 solche gleichgeltende Complexionen gefunden wurden, und die Nummern dieser 21 Complexionen wegen Mangel an Raum nicht füglich in der zweiten Spalte aufgeführt werden konnten: so haben wir bei diesen Complexionen, welche die mit den Nummern 55, 127, 188, 235, 242, 304, 311, 380, 387, 449, 456, 503, 568, 575, 643, 705, 712, 759, 824, 831, 900 bezeichneten sind, statt derselben den Buchstaben S gesetzt. Die dritte Spalte enthält die Zusammensetzungen der binären Verbindungen selbst, in der Ordnung, wie die Complexionen oben (S. 69 — 75) auf einander folgen, und zwar so, daß das letzte Element am weitesten zur Rechten mit a, das vorletzte zunächst zur Linken mit b u. s. w. als Coëfficient verbunden ist. Die vierte Spalte enthält die Summe der in der fünften, sechsten und siebenten angegebenen Verhältniszahlen des Sauer- Wasser- und Kohlenstoffs; es sind daher diese Zahlen in der vierten Spalte zugleich die stöchiometrischen Werthe von den in der dritten befindlichen Zusammensetzungen der binären Verbindungen. Endlich enthalten die drei letzten Spalten die Reduction der Verhältniszahlen der drei vorhergehenden Spalten auf die Summe 100.

Nummer	Nummer der gleichgeltenden Complexionen	Fortlaufende Complexionen	Stöchiometri- sche Zahlen				Nach 100 Theilen berechnet		
			Summe	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.
1		a	9	8	1	0	88,89	11,11	0
2		b	14	8	0	6	57,14	0	42,86
3	84,89,276,281	b+a	23	16	1	6	69,56	4,35	26,09
4		b+2a	32	24	2	6	75,00	6,25	18,75
5		b+3a	41	32	3	6	78,05	7,32	14,63
6	87,96,274,283	2b+a	37	24	1	12	64,87	2,70	32,43
7		2b+3a	55	40	3	12	72,73	5,45	21,82
8	82,95,282	3b+a	51	32	1	18	62,75	1,96	35,29
9	83,97,284	3b+2a	60	40	2	18	66,67	3,33	30,00
10		c	22	16	0	6	72,73	0	27,27
11		c+a	31	24	1	6	77,42	3,23	19,35
12		c+2a	40	32	2	6	80,00	5,00	15,00
13		c+3a	49	40	3	6	81,63	6,12	12,25
14		c+b	36	24	0	12	66,67	0	33,33
15		c+b+a	45	32	1	12	71,11	2,22	26,67
16		c+b+2a	54	40	2	12	74,08	3,70	22,22
17		c+b+3a	63	48	3	12	76,19	4,76	19,05
18		c+2b	50	32	0	18	64,00	0	36,00
19		c+2b+a	59	40	1	18	67,80	1,69	30,51
20		c+2b+2a	68	48	2	18	70,59	2,94	26,47
21		c+2b+3a	77	56	3	18	72,72	3,90	23,38
22		c+3b	64	40	0	24	62,50	0	37,50
23	98	c+3b+a	73	48	1	24	65,75	1,37	32,88
24	99	c+3b+2a	82	56	2	24	68,29	2,44	29,27
25	100	c+3b+3a	91	64	3	24	70,33	3,30	26,37
26		2c+a	53	40	1	12	75,47	1,89	22,64
27		2c+3a	71	56	3	12	78,87	4,23	16,90
28		2c+b	58	40	0	18	68,97	0	31,03
29		2c+b+a	67	48	1	18	71,64	1,49	26,87
30		2c+b+2a	76	56	2	18	73,68	2,64	23,68
31		2c+b+3a	85	64	3	18	75,29	3,53	21,18

Nummer	Nummer der gleichgeltenden Complexionen	Fortlaufende Complexionen	Stöchiometri- sche Zahlen				Nach 100 Theilen berechnet		
			Summe	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.
32		2c+2b+a	81	56	1	24	69,14	1,23	29,63
33		2c+2b+3a	99	72	3	24	72,73	3,03	24,24
34		2c+3b	86	56	0	30	65,12	0	34,88
35		2c+3b+a	95	64	1	30	67,37	1,05	31,58
36		2c+3b+2a	104	72	2	30	69,23	1,92	28,85
37		2c+3b+3a	113	80	3	30	70,80	2,65	26,55
38		3c+a	75	56	1	18	74,67	1,33	24,00
39		3c+2a	84	64	2	18	76,19	2,38	21,43
40		3c+b	80	56	0	24	70,00	0	30,00
41		3c+b+a	89	64	1	24	71,91	1,12	26,97
42		3c+b+2a	98	72	2	24	73,47	2,04	24,49
43		3c+b+3a	107	80	3	24	74,77	2,80	22,43
44		3c+2b	94	64	0	30	68,09	0	31,91
45		3c+2b+a	103	72	1	30	69,90	0,97	29,13
46		3c+2b+2a	112	80	2	30	71,42	1,79	26,79
47		3c+2b+3a	121	88	3	30	72,73	2,48	24,79
48		3c+3b+a	117	80	1	36	68,38	0,85	30,77
49		3c+3b+2a	126	88	2	36	69,84	1,59	28,57
50		d	7	0	1	6	0	14,29	85,71
51	486,545,736,797	d+a	16	8	2	6	50,00	12,50	37,50
52		d+2a	25	16	3	6	64,00	12,00	24,00
53		d+3a	34	24	4	6	70,59	11,76	17,65
54		d+b	21	8	1	12	38,10	4,76	57,14
55	S	d+b+a	30	16	2	12	53,33	6,67	40,00
56	243,313	d+b+2a	39	24	3	12	61,54	7,69	30,77
57	244	d+b+3a	48	32	4	12	66,67	8,33	25,00
58		d+2b	35	16	1	18	45,71	2,86	51,43
59	203,246,319,402,475	d+2b+a	44	24	2	18	54,55	4,54	40,91
60	205,247,321,404	d+2b+2a	53	32	3	18	60,38	5,66	33,96
61	248	d+2b+3a	62	40	4	18	64,52	6,45	29,03
62		d+3b	49	24	1	24	48,98	2,04	48,98

Nummer	Nummer der gleichgeltenden Complexionen	Fortlaufende Complexionen	Stöchiometri- sche Zahlen				Nach 100 Theilen berechnet		
			Summe	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.
63	66,139,211,250,330,410	d+3b+a	58	32	2	24	55,17	3,45	41,38
64	142,213,251,412	d+3b+2a	67	40	3	24	59,70	4,48	35,82
65	67,252,333,528	d+3b+3a	76	48	4	24	63,16	5,26	31,58
66	63,139,211,250,330,410	d+c	29	16	1	12	55,17	3,45	41,38
67	65,252,333,528	d+c+a	38	24	2	12	63,16	5,26	31,58
68		d+c+2a	47	32	3	12	68,09	6,38	25,53
69		d+c+3a	56	40	4	12	71,43	7,14	21,43
70		d+c+b	43	24	1	18	55,81	2,33	41,86
71	258,343	d+c+b+a	52	32	2	18	61,54	3,85	34,61
72	259,345	d+c+b+2a	61	40	3	18	65,57	4,92	29,51
73	260	d+c+b+3a	70	48	4	18	68,58	5,71	25,71
74		d+c+2b	57	32	1	24	56,14	1,75	42,11
75	262,351	d+c+2b+a	66	40	2	24	60,61	3,03	36,36
76	263,353	d+c+2b+2a	75	48	3	24	64,00	4,00	32,00
77	264	d+c+2b+3a	84	56	4	24	66,67	4,76	28,57
78		d+c+3b	71	40	1	30	56,34	1,41	42,25
79	154,266	d+c+3b+a	80	48	2	30	60,00	2,50	37,50
80	155,267	d+c+3b+2a	89	56	3	30	62,92	3,37	33,71
81	156,268	d+c+3b+3a	98	64	4	30	65,31	4,08	30,61
82	8,95,282	d+2c	51	32	1	18	62,75	1,96	35,29
83	9,97,284	d+2c+a	60	40	2	18	66,67	3,33	30,00
84	3,89,276,281	d+2c+2a	69	48	3	18	69,56	4,35	26,09
85		d+2c+3a	78	56	4	18	71,79	5,13	23,08
86		d+2c+b	65	40	1	24	61,54	1,54	36,92
87	6,96,274,283	d+2c+b+a	74	48	2	24	64,87	2,70	32,43
88	275	d+2c+b+2a	83	56	3	24	67,47	3,61	28,92
89	3,84,276,281	d+2c+b+3a	92	64	4	24	69,56	4,35	26,09
90		d+2c+2b	79	48	1	30	60,76	1,27	37,97
91	278	d+2c+2b+a	88	56	2	30	63,64	2,27	34,09
92	279	d+2c+2b+2a	97	64	3	30	65,98	3,09	30,93
93	280	d+2c+2b+3a	106	72	4	30	67,93	3,77	28,30

Nummer	Nummer der gleichgeltenden Complexionen	Fortlaufende Complexionen	Stöchiometri- sche Zahlen				Nach 100 Theilen berechnet		
			Summe	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.
94		$d+2c+3b$	93	56	1	36	60,21	1,08	38,71
95	8,82,282	$d+2c+3b+a$	102	64	2	36	62,75	1,96	35,29
96	6,87,274,283	$d+2c+3b+2a$	111	72	3	36	64,87	2,70	32,43
97	9,83,284	$d+2c+3b+3a$	120	80	4	36	66,67	3,33	30,00
98	23	$d+3c$	73	48	1	24	65,75	1,37	32,88
99	24	$d+3c+a$	82	56	2	24	68,29	2,44	29,27
100	25	$d+3c+2a$	91	64	3	24	70,33	3,30	26,37
101		$d+3c+3a$	100	72	4	24	72,00	4,00	24,00
102		$d+3c+b$	87	56	1	30	64,37	1,15	34,48
103		$d+3c+b+a$	96	64	2	30	66,67	2,08	31,25
104		$d+3c+b+2a$	105	72	3	30	68,57	2,86	28,57
105		$d+3c+b+3a$	114	80	4	30	70,17	3,51	26,32
106		$d+3c+2b$	101	64	1	36	63,37	0,99	35,64
107		$d+3c+2b+a$	110	72	2	36	65,45	1,82	32,73
108		$d+3c+2b+2a$	119	80	3	36	67,23	2,52	30,25
109		$d+3c+2b+3a$	128	88	4	36	68,75	3,13	28,12
110		$d+3c+3b$	115	72	1	42	62,61	0,87	36,52
111		$d+3c+3b+a$	124	80	2	42	64,52	1,61	33,87
112		$d+3c+3b+2a$	133	88	3	42	66,16	2,26	31,58
113		$d+3c+3b+3a$	142	96	4	42	67,60	2,82	29,58
114	543,664,734,859	$2d+a$	23	8	3	12	34,78	13,04	52,18
115		$2d+3a$	41	24	5	12	58,54	12,19	29,27
116		$2d+b$	28	8	2	18	28,57	7,14	64,29
117	306,439,551,742,871	$2d+b+a$	37	16	3	18	43,24	8,11	48,65
118	307,441,553,744	$2d+b+2a$	46	24	4	18	52,17	8,70	39,13
119	308	$2d+b+3a$	55	32	5	18	58,18	9,09	32,73
120	310,447	$2d+2b+a$	51	24	3	24	47,06	5,88	47,06
121	312,510,833	$2d+2b+3a$	69	40	5	24	57,97	7,25	34,78
122		$2d+3b$	56	24	2	30	42,86	3,57	53,57
123	198,314	$2d+3b+a$	65	32	3	30	49,23	4,62	46,15
124	199,315,512,839	$2d+3b+2a$	74	40	4	30	54,05	5,41	40,54

Nummer	Nummer der gleichgeltenden Complexionen	Fortlaufende Complexionen	Stöchiometri- sche Zahlen				Nach 100 Theilen berechnet		
			Summe	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.
125	200,316,513,841	2d+3b+3a	83	48	5	30	57,83	6,02	36,15
126	180,234,378	2d+c	36	16	2	18	44,44	5,56	50,00
127	S	2d+c+a	45	24	3	18	53,33	6,67	40,00
128	236,577,767	2d+c+2a	54	32	4	18	59,26	7,41	33,33
129	237	2d+c+3a	63	40	5	18	63,49	7,94	28,57
130	238	2d+c+b	50	24	2	24	48,00	4,00	48,00
131	239,322,471,583,772	2d+c+b+a	59	32	3	24	54,24	5,08	40,68
132	240,323,473,585,774	2d+c+b+2a	68	40	4	24	58,82	5,88	35,30
133	241,324	2d+c+b+3a	77	48	5	24	62,34	6,49	31,17
134		2d+c+2b	64	32	2	30	50,00	3,13	46,87
135	326,479	2d+c+2b+a	73	40	3	30	54,79	4,11	41,10
136	327,481,522	2d+c+2b+2a	82	48	4	30	58,54	4,88	36,58
137	328,523	2d+c+2b+3a	91	56	5	30	61,54	5,49	32,97
138		2d+c+3b	78	40	2	36	51,28	2,57	46,15
139	63,66,211,250,330,410	2d+c+3b+a	87	48	3	36	55,17	3,45	41,38
140	214,331,526	2d+c+3b+2a	96	56	4	36	58,33	4,17	37,50
141	215,332,527	2d+c+3b+3a	105	64	5	36	60,95	4,76	34,29
142	64,213,251,412	2d+2c+a	67	40	3	24	59,70	4,48	35,82
143	253	2d+2c+3a	85	56	5	24	65,88	5,88	28,24
144	254	2d+2c+b	72	40	2	30	55,55	2,78	41,67
145	255,338	2d+2c+b+a	81	48	3	30	59,26	3,70	37,04
146	256,339	2d+2c+b+2a	90	56	4	30	62,22	4,45	33,33
147	257,340	2d+2c+b+3a	99	64	5	30	64,65	5,05	30,30
148	342	2d+2c+2b+a	95	56	3	36	58,95	3,16	37,89
149	344	2d+2c+2b+3a	113	72	5	36	63,72	4,42	31,86
150		2d+2c+3b	100	56	2	42	56,00	2,00	42,00
151	346	2d+2c+3b+a	109	64	3	42	58,72	2,75	38,53
152	347	2d+2c+3b+2a	118	72	4	42	61,02	3,39	35,59
153	348	2d+2c+3b+3a	127	80	5	42	62,99	3,94	33,07
154	79,266	2d+3c	80	48	2	30	60,00	2,50	37,50
155	80,267	2d+3c+a	89	56	3	30	62,92	3,37	33,71

Nummer	Nummer der gleichgeltenden Complexionen					Fortlaufende Complexionen	Stöchiometrische Zahlen				Nach 100 Theilen berechnet		
							Summe	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.
156	81,268	81,268	03	7	84	$2d+3c+2a$	98	64	4	30	65,31	4,08	30,61
157	269	269	81	2	01	$2d+3c+3a$	107	72	5	30	67,29	4,67	28,04
158	270	270	81	3	42	$2d+3c+b$	94	56	2	36	59,57	2,13	38,30
159	271	271	81	4	83	$2d+3c+b+a$	103	64	3	36	62,14	2,91	34,95
160	272	272	81	5	04	$2d+3c+b+2a$	112	72	4	36	64,29	3,57	32,14
161	273	273	81	6	45	$2d+3c+b+3a$	121	80	5	36	66,12	4,13	29,75
162	274	274	81	7	86	$2d+3c+2b$	108	64	2	42	59,26	1,85	38,89
163	275	275	81	8	07	$2d+3c+2b+a$	117	72	3	42	61,54	2,56	35,90
164	276	276	81	9	48	$2d+3c+2b+2a$	126	80	4	42	63,49	3,18	33,33
165	277	277	81	0	89	$2d+3c+2b+3a$	135	88	5	42	65,19	3,70	31,11
166	278	278	81	1	30	$2d+3c+3b$	122	72	2	48	59,02	1,64	39,34
167	279	279	81	2	71	$2d+3c+3b+a$	131	80	3	48	61,07	2,29	36,64
168	280	280	81	3	12	$2d+3c+3b+2a$	140	88	4	48	62,86	2,86	34,28
169	281	281	81	4	53	$2d+3c+3b+3a$	149	96	5	48	64,43	3,36	32,21
170	484,663,858	484,663,858	03	8	44	$3d+a$	30	8	4	18	26,67	13,33	60,00
171	485,665,860	485,665,860	03	9	85	$3d+2a$	39	16	5	18	41,03	12,82	46,15
172	486,667,862	486,667,862	03	0	26	$3d+b$	35	8	3	24	22,86	8,57	68,57
173	230,370,427,618,671,866	230,370,427,618,671,866	03	1	67	$3d+b+a$	44	16	4	24	36,36	9,09	54,55
174	371,488,673,868	371,488,673,868	03	2	08	$3d+b+2a$	53	24	5	24	45,28	9,44	45,28
175	231,372,621,812	231,372,621,812	03	3	49	$3d+b+3a$	62	32	6	24	51,61	9,68	38,71
176	372,489,674,869	372,489,674,869	03	4	90	$3d+2b$	49	16	3	30	32,65	6,12	61,23
177	374,490	374,490	03	5	31	$3d+2b+a$	58	24	4	30	41,38	6,90	51,72
178	375,491,570,953	375,491,570,953	03	6	72	$3d+2b+2a$	67	32	5	30	47,76	7,46	44,78
179	376,492,571,955	376,492,571,955	03	7	13	$3d+2b+3a$	76	40	6	30	52,63	7,90	39,47
180	126,234,378	126,234,378	03	8	54	$3d+3b+a$	72	32	4	36	44,44	5,56	50,00
181	379,574,960	379,574,960	03	9	95	$3d+3b+2a$	81	40	5	36	49,38	6,17	44,45
182	298	298	03	0	36	$3d+c$	43	16	3	24	37,21	6,98	55,81
183	299,498,695,807,890	299,498,695,807,890	03	1	77	$3d+c+a$	52	24	4	24	46,15	7,69	46,16
184	300,499,697,809,892	300,499,697,809,892	03	2	18	$3d+c+2a$	61	32	5	24	52,46	8,20	39,34
185	301,500	301,500	03	3	59	$3d+c+3a$	70	40	6	24	57,14	8,57	34,29
186	302	302	03	4	00	$3d+c+b$	57	24	3	30	42,11	5,26	52,63

Nummer	Nummer der gleichgeltenden Complexionen	Fortlaufende Complexionen	Stöchiometri- sche Zahlen				Nach 100 Theilen berechnet		
			Summe	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.
187	303,386,502,703,898	3d+c+b+a	66	32	4	30	48,49	6,06	45,45
188	S	3d+c+b+2a	75	40	5	30	53,33	6,67	40,00
189	305,388,504	3d+c+b+3a	84	48	6	30	57,14	7,14	35,72
190		3d+c+2b	71	32	3	36	45,07	4,23	50,70
191	390,506	3d+c+2b+a	80	40	4	36	50,00	5,00	45,00
192	391,507,586	3d+c+2b+2a	89	48	5	36	53,93	5,62	40,45
193	392,508,587	3d+c+2b+3a	98	56	6	36	57,14	6,12	36,74
194		3d+c+3b	85	40	3	42	47,06	3,53	49,41
195	394	3d+c+3b+a	94	48	4	42	51,06	4,26	44,68
196	395,590	3d+c+3b+2a	103	56	5	42	54,37	4,85	40,78
197	396,591	3d+c+3b+3a	112	64	6	42	57,14	5,36	37,50
198	123,314	3d+2c	65	32	3	30	49,23	4,62	46,15
199	124,315,512,839	3d+2c+a	74	40	4	30	54,05	5,41	40,54
200	125,316,513,841	3d+2c+2a	83	48	5	30	57,83	6,02	36,15
201	317,514	3d+2c+3a	92	56	6	30	60,87	6,52	32,61
202	318	3d+2c+b	79	40	3	36	50,63	3,80	45,57
203	59,246,319,402,475	3d+2c+b+a	88	48	4	36	54,55	4,54	40,91
204	320,403,516	3d+2c+b+2a	97	56	5	36	57,73	5,16	37,11
205	60,247,321,404	3d+2c+b+3a	106	64	6	36	60,38	5,66	33,96
206		3d+2c+2b	93	48	3	42	51,61	3,23	45,16
207	406,518	3d+2c+2b+a	102	56	4	42	54,90	3,92	41,18
208	407,519	3d+2c+2b+2a	111	64	5	42	57,66	4,50	37,84
209	408,520	3d+2c+2b+3a	120	72	6	42	60,00	5,00	35,00
210		3d+2c+3b	107	56	3	48	52,34	2,80	44,86
211	63,66,139,250,330,410	3d+2c+3b+a	116	64	4	48	55,17	3,45	41,38
212	411	3d+2c+3b+2a	125	72	5	48	57,60	4,00	38,40
213	64,142,251,412	3d+2c+3b+3a	134	80	6	48	59,70	4,48	35,82
214	140,331,526	3d+3c+a	96	56	4	36	58,33	4,17	37,50
215	141,332,527	3d+3c+2a	105	64	5	36	60,95	4,76	34,29
216	334	3d+3c+b	101	56	3	42	55,45	2,97	41,58
217	335,530	3d+3c+b+a	110	64	4	42	58,18	3,64	38,18

Nummer	Nummer der gleichgeltenden Complexionen	Fortlaufende Complexionen	Stöchiometri- sche Zahlen				Nach 100 Theilen berechnet		
			Summe	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.
218	336,531	$3d+3c+b+2a$	119	72	5	42	60,51	4,20	35,29
219	337,532	$3d+3c+b+3a$	128	80	6	42	62,50	4,69	32,81
220		$3d+3c+2b$	115	64	3	48	55,65	2,61	41,74
221	534	$3d+3c+2b+a$	124	72	4	48	58,06	3,23	38,71
222	535	$3d+3c+2b+2a$	133	80	5	48	60,15	3,76	36,09
223	536	$3d+3c+2b+3a$	142	88	6	48	61,97	4,23	33,80
224		$3d+3c+3b+a$	138	80	4	54	57,97	2,90	39,13
225		$3d+3c+3b+2a$	147	88	5	54	59,86	3,40	36,74
226		e	8	0	2	6	0	25,00	75,00
227		e+a	17	8	3	6	47,06	17,65	35,29
228		e+2a	26	16	4	6	61,54	15,38	23,08
229		e+3a	35	24	5	6	68,57	14,29	17,14
230	173,370,427,618,671,866	e+b	22	8	2	12	36,36	9,09	54,55
231	175,372,621,812	e+b+a	31	16	3	12	51,61	9,68	38,71
232		e+b+2a	40	24	4	12	60,00	10,00	30,00
233		e+b+3a	49	32	5	12	65,31	10,20	24,49
234	126,180,378	e+2b	36	16	2	18	44,44	5,56	50,00
235	S	e+2b+a	45	24	3	18	53,33	6,67	40,00
236	128,577,767	e+2b+2a	54	32	4	18	59,26	7,41	33,33
237	129	e+2b+3a	63	40	5	18	63,49	7,94	28,57
238	130	e+3b	50	24	2	24	48,00	4,00	48,00
239	131,322,471,583,772	e+3b+a	59	32	3	24	54,24	5,08	40,68
240	132,323,473,585,774	e+3b+2a	68	40	4	24	58,82	5,88	35,30
241	133,324	e+3b+3a	77	48	5	24	62,34	6,49	31,17
242	S	e+c	30	16	2	12	53,33	6,67	40,00
243	56,313	e+c+a	39	24	3	12	61,54	7,69	30,77
244	57	e+c+2a	48	32	4	12	66,67	8,33	25,00
245		e+c+3a	57	40	5	12	70,18	8,77	21,05
246	59,203,319,402,475	e+c+b	44	24	2	18	54,55	4,54	40,91
247	60,205,321,404	e+c+b+a	53	32	3	18	60,38	5,66	33,96
248	61	e+c+b+2a	62	40	4	18	64,52	6,45	29,03

Nummer	Nummer der gleichgeltenden Complexionen	Fortlaufende Complexionen	Stöchiometri- sche Zahlen				Nach 100 Theilen berechnet		
			Summe	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.
249		$e+c+b+3a$	71	48	5	18	67,61	7,04	25,35
250	63,66,139,211,330,410	$e+c+2b$	58	32	2	24	55,17	3,45	41,38
251	64,142,213,412	$e+c+2b+a$	67	40	3	24	59,70	4,48	35,82
252	65,67,333,528	$e+c+2b+2a$	76	48	4	24	63,16	5,26	31,58
253	143	$e+c+2b+3a$	85	56	5	24	65,88	5,88	28,24
254	144	$e+c+3b$	72	40	2	30	55,55	2,78	41,67
255	145,338	$e+c+3b+a$	81	48	3	30	59,26	3,70	37,04
256	146,339	$e+c+3b+2a$	90	56	4	30	62,22	4,45	33,33
257	147,340	$e+c+3b+3a$	99	64	5	30	64,65	5,05	30,30
258	71,343	$e+2c$	52	32	2	18	61,54	3,85	34,61
259	72,345	$e+2c+a$	61	40	3	18	65,57	4,92	29,51
260	73	$e+2c+2a$	70	48	4	18	68,58	5,71	25,71
261		$e+2c+3a$	79	56	5	18	70,89	6,33	22,78
262	75,351	$e+2c+b$	66	40	2	24	60,61	3,03	36,36
263	76,353	$e+2c+b+a$	75	48	3	24	64,00	4,00	32,00
264	77	$e+2c+b+2a$	84	56	4	24	66,67	4,76	28,57
265		$e+2c+b+3a$	93	64	5	24	68,81	5,38	25,81
266	79,154	$e+2c+2b$	80	48	2	30	60,00	2,50	37,50
267	80,155	$e+2c+2b+a$	89	56	3	30	62,92	3,37	33,71
268	81,156	$e+2c+2b+2a$	98	64	4	30	65,31	4,08	30,61
269	157	$e+2c+2b+3a$	107	72	5	30	67,29	4,67	28,04
270	158	$e+2c+3b$	94	56	2	36	59,57	2,13	38,30
271	159	$e+2c+3b+a$	103	64	3	36	62,14	2,91	34,95
272	160	$e+2c+3b+2a$	112	72	4	36	64,29	3,57	32,14
273	161	$e+2c+3b+3a$	121	80	5	36	66,12	4,13	29,75
274	6,87,96,283	$e+3c$	74	48	2	24	64,87	2,70	32,43
275	88	$e+3c+a$	83	56	3	24	67,47	3,61	28,92
276	3,84,89,281	$e+3c+2a$	92	64	4	24	69,56	4,35	26,09
277		$e+3c+3a$	101	72	5	24	71,29	4,95	23,76
278	91	$e+3c+b$	88	56	2	30	63,64	2,27	34,09
279	92	$e+3c+b+a$	97	64	3	30	65,98	3,09	30,93

Nummer	Nummer der gleichgeltenden Complexionen					Fortlaufende Complexionen	Stöchiometri- sche Zahlen				Nach 100 Theilen berechnet		
							Summe	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.
280	93					$e+3c+b+2a$	106	72	4	30	67,93	3,77	28,30
281	3,84,89,276					$e+3c+b+3a$	115	80	5	30	69,56	4,35	26,09
282	8,82,95					$e+3c+2b$	102	64	2	36	62,75	1,96	35,29
283	6,87,96,274					$e+3c+2b+a$	111	72	3	36	64,87	2,70	32,43
284	9,83,97					$e+3c+2b+2a$	120	80	4	36	66,67	3,33	30,00
285						$e+3c+2b+3a$	129	88	5	36	68,22	3,88	27,90
286						$e+3c+3b$	116	72	2	42	62,07	1,72	36,21
287						$e+3c+3b+a$	125	80	3	42	64,00	2,40	33,60
288						$e+3c+3b+2a$	134	88	4	42	65,67	2,99	31,34
289						$e+3c+3b+3a$	143	96	5	42	67,13	3,50	29,37
290						$e+d$	15	0	3	12	0	20,00	80,00
291						$e+d+a$	24	8	4	12	33,33	16,67	50,00
292						$e+d+2a$	33	16	5	12	48,49	15,15	36,36
293						$e+d+3a$	42	24	6	12	57,14	14,29	28,57
294						$e+d+b$	29	8	3	18	27,58	10,35	62,07
295	494,799					$e+d+b+a$	38	16	4	18	42,10	10,53	47,37
296	495,801					$e+d+b+2a$	47	24	5	18	51,06	10,64	38,30
297	496					$e+d+b+3a$	56	32	6	18	57,14	10,72	32,14
298	182					$e+d+2b$	43	16	3	24	37,21	6,98	55,81
299	183,498,695,807,890					$e+d+2b+a$	52	24	4	24	46,15	7,69	46,16
300	184,499,697,809,892					$e+d+2b+2a$	61	32	5	24	52,46	8,20	39,34
301	185,500					$e+d+2b+3a$	70	40	6	24	57,14	8,57	34,29
302	186					$e+d+3b$	57	24	3	30	42,11	5,26	52,63
303	187,386,502,703,898					$e+d+3b+a$	66	32	4	30	48,49	6,06	45,45
304	S					$e+d+3b+2a$	75	40	5	30	53,33	6,67	40,00
305	189,388,504					$e+d+3b+3a$	84	48	6	30	57,14	7,14	35,72
306	117,439,551,742,871					$e+d+c$	37	16	3	18	43,24	8,11	48,65
307	118,441,553,744					$e+d+c+a$	46	24	4	18	52,17	8,70	39,13
308	119					$e+d+c+2a$	55	32	5	18	58,18	9,09	32,73
309						$e+d+c+3a$	64	40	6	18	62,50	9,37	28,13
310	120,447					$e+d+c+b$	51	24	3	24	47,06	5,88	47,06

Nummer	Nummer der gleichgeltenden Complexionen	Fortlaufende Complexionen	Stöchiometri- sche Zahlen				Nach 100 Theilen berechnet		
			Summe	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.
311	S	$e+d+c+b+a$	60	32	4	24	53,33	6,67	40,00
312	121,510,833	$e+d+c+b+2a$	69	40	5	24	57,97	7,25	34,78
313	56,243	$e+d+c+b+3a$	78	48	6	24	61,54	7,69	30,77
314	123,198	$e+d+c+2b$	65	32	3	30	49,23	4,62	46,15
315	124,199,512,839	$e+d+c+2b+a$	74	40	4	30	54,05	5,41	40,54
316	125,200,513,841	$e+d+c+2b+2a$	83	48	5	30	57,83	6,02	36,15
317	201,514	$e+d+c+2b+3a$	92	56	6	30	60,87	6,52	32,61
318	202	$e+d+c+3b$	79	40	3	36	50,63	3,80	45,57
319	59,203,246,402,475	$e+d+c+3b+a$	88	48	4	36	54,55	4,54	40,91
320	204,403,516	$e+d+c+3b+2a$	97	56	5	36	57,73	5,16	37,11
321	60,205,247,404	$e+d+c+3b+3a$	106	64	6	36	60,38	5,66	33,96
322	131,239,471,583,772	$e+d+2c$	59	32	3	24	54,24	5,08	40,68
323	132,240,473,585,774	$e+d+2c+a$	68	40	4	24	58,82	5,88	35,30
324	133,241	$e+d+2c+2a$	77	48	5	24	62,34	6,49	31,17
325		$e+d+2c+3a$	86	56	6	24	65,11	6,98	27,91
326	135,479,	$e+d+2c+b$	73	40	3	30	54,79	4,11	41,10
327	136,481,522	$e+d+2c+b+a$	82	48	4	30	58,54	4,88	36,58
328	137,523	$e+d+2c+b+2a$	91	56	5	30	61,54	5,49	32,97
329	524	$e+d+2c+b+3a$	100	64	6	30	64,00	6,00	30,00
330	63,66,139,211,250,410	$e+d+2c+2b$	87	48	3	36	55,17	3,45	41,38
331	140,214,526	$e+d+2c+2b+a$	96	56	4	36	58,33	4,17	37,50
332	141,215,527	$e+d+2c+2b+2a$	105	64	5	36	60,95	4,76	34,29
333	65,67,252,528	$e+d+2c+2b+3a$	114	72	6	36	63,16	5,26	31,58
334	216	$e+d+2c+3b$	101	56	3	42	55,45	2,97	41,58
335	217,530	$e+d+2c+3b+a$	110	64	4	42	58,18	3,64	38,18
336	218,531	$e+d+2c+3b+2a$	119	72	5	42	60,51	4,20	35,29
337	219,532	$e+d+2c+3b+3a$	128	80	6	42	62,50	4,69	32,81
338	145,255	$e+d+3c$	81	48	3	30	59,26	3,70	37,04
339	146,256	$e+d+3c+a$	90	56	4	30	62,22	4,45	33,33
340	147,257	$e+d+3c+2a$	99	64	5	30	64,65	5,05	30,30
341		$e+d+3c+3a$	108	72	6	30	66,67	5,55	27,78

Nummer	Nummer der gleichgeltenden Complexionen	Fortlaufende Complexionen	Stöchiometri- sche Zahlen				Nach 100 Theilen berechnet		
			Summe	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.
342	148	$e+d+3c+b$	95	56	3	36	58,95	3,16	37,89
343	71,258,	$e+d+3c+b+a$	104	64	4	36	61,54	3,85	34,61
344	149	$e+d+3c+b+2a$	113	72	5	36	63,72	4,42	31,86
345	72,259	$e+d+3c+b+3a$	122	80	6	36	65,57	4,92	29,51
346	151	$e+d+3c+2b$	109	64	3	42	58,72	2,75	38,53
347	152	$e+d+3c+2b+a$	118	72	4	42	61,02	3,39	35,59
348	153	$e+d+3c+2b+2a$	127	80	5	42	62,99	3,94	33,07
349		$e+d+3c+2b+3a$	136	88	6	42	64,71	4,41	30,88
350		$e+d+3c+3b$	123	72	3	48	58,54	2,44	39,02
351	75,262	$e+d+3c+3b+a$	132	80	4	48	60,61	3,03	36,36
352		$e+d+3c+3b+2a$	141	88	5	48	62,41	3,55	34,04
353	76,263	$e+d+3c+3b+3a$	150	96	6	48	64,00	4,00	32,00
354		$e+2d$	22	0	4	18	0	18,18	81,82
355		$e+2d+a$	31	8	5	18	25,81	16,13	58,06
356		$e+2d+2a$	40	16	6	18	40,00	15,00	45,00
357		$e+2d+3a$	49	24	7	18	48,98	14,29	36,73
358		$e+2d+b$	36	8	4	24	22,22	11,11	66,67
359	554,923	$e+2d+b+a$	45	16	5	24	35,56	11,11	53,33
360	555,925	$e+2d+b+2a$	54	24	6	24	44,45	11,11	44,44
361	556	$e+2d+b+3a$	63	32	7	24	50,79	11,11	38,10
362		$e+2d+2b$	50	16	4	30	32,00	8,00	60,00
363	558,931	$e+2d+2b+a$	59	24	5	30	40,68	8,47	50,85
364	559,750,933	$e+2d+2b+2a$	68	32	6	30	47,06	8,82	44,12
365	560,751	$e+2d+2b+3a$	77	40	7	30	51,95	9,09	38,96
366		$e+2d+3b$	64	24	4	36	37,50	6,25	56,25
367	450,562	$e+2d+3b+a$	73	32	5	36	43,84	6,85	49,31
368	451,563,754	$e+2d+3b+2a$	82	40	6	36	48,78	7,32	43,90
369	452,564,755	$e+2d+3b+3a$	91	48	7	36	52,75	7,69	39,56
370	173,230,427,618,671,866	$e+2d+c$	44	16	4	24	36,36	9,09	54,55
371	174,488,673,868	$e+2d+c+a$	53	24	5	24	45,28	9,44	45,28
372	175,231,621,812	$e+2d+c+2a$	62	32	6	24	51,61	9,68	38,71

Nummer	Nummer der gleichgeltenden Complexionen	Fortlaufende Complexionen	Stöchiometri- sche Zahlen				Nach 100 Theilen berechnet		
			Summe	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.
373	489	$e+2d+c+3a$	71	40	7	24	56,34	9,86	33,80
374	177,490	$e+2d+c+b$	58	24	4	30	41,38	6,90	51,72
375	178,491,570,953	$e+2d+c+b+a$	67	32	5	30	47,76	7,46	44,78
376	179,492,571,955	$e+2d+c+b+2a$	76	40	6	30	52,63	7,90	39,47
377	493,572	$e+2d+c+b+3a$	85	48	7	30	56,47	8,24	35,29
378	126,180,234	$e+2d+c+2b$	72	32	4	36	44,44	5,56	50,00
379	181,574,960	$e+2d+c+2b+a$	81	40	5	36	49,38	6,17	44,45
380	S	$e+2d+c+2b+2a$	90	48	6	36	53,33	6,67	40,00
381	576,766	$e+2d+c+2b+3a$	99	56	7	36	56,57	7,07	36,36
382		$e+2d+c+3b$	86	40	4	42	46,51	4,65	48,84
383	466,578	$e+2d+c+3b+a$	95	48	5	42	50,53	5,26	44,21
384	467,579,768	$e+2d+c+3b+2a$	104	56	6	42	53,85	5,77	40,38
385	468,580,769	$e+2d+c+3b+3a$	113	64	7	42	56,64	6,19	37,17
386	187,303,502,703,898	$e+2d+2c$	66	32	4	30	48,49	6,06	45,45
387	S	$e+2d+2c+a$	75	40	5	30	53,33	6,67	40,00
388	189,305,504	$e+2d+2c+2a$	84	48	6	30	57,14	7,14	35,72
389	505	$e+2d+2c+3a$	93	56	7	30	60,21	7,53	32,26
390	191,506	$e+2d+2c+b$	80	40	4	36	50,00	5,00	45,00
391	192,507,586	$e+2d+2c+b+a$	89	48	5	36	53,93	5,62	40,45
392	193,508,587	$e+2d+2c+b+2a$	98	56	6	36	57,14	6,12	36,74
393	509,588	$e+2d+2c+b+3a$	107	64	7	36	59,81	6,54	33,65
394	195	$e+2d+2c+2b$	94	48	4	42	51,06	4,26	44,68
395	196,590	$e+2d+2c+2b+a$	103	56	5	42	54,37	4,85	40,78
396	197,591	$e+2d+2c+2b+2a$	112	64	6	42	57,14	5,36	37,50
397	592	$e+2d+2c+2b+3a$	121	72	7	42	59,50	5,79	34,71
398		$e+2d+2c+3b$	108	56	4	48	51,85	3,70	44,45
399	594	$e+2d+2c+3b+a$	117	64	5	48	54,70	4,27	41,03
400	595	$e+2d+2c+3b+2a$	126	72	6	48	57,14	4,76	38,10
401	596	$e+2d+2c+3b+3a$	135	80	7	48	59,26	5,18	35,56
402	59,203,246,319,475	$e+2d+3c$	88	48	4	36	54,55	4,54	40,91
403	204,320,516	$e+2d+3c+a$	97	56	5	36	57,73	5,16	37,11

Nummer	Nummer der gleichgeltenden Complexionen	Fortlaufende Complexionen	Stöchiometri- sche Zahlen				Nach 100 Theilen berechnet		
			Summe	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.
404	60,205,247,321	e+2d+3c+2a	106	64	6	36	60,38	5,66	33,96
405	517	e+2d+3c+3a	115	72	7	36	62,61	6,09	31,30
406	207,518	e+2d+3c+b	102	56	4	42	54,90	3,92	41,18
407	208,519	e+2d+3c+b+a	111	64	5	42	57,66	4,50	37,84
408	209,520	e+2d+3c+b+2a	120	72	6	42	60,00	5,00	35,00
409	521	e+2d+3c+b+3a	129	80	7	42	62,01	5,43	32,56
410	63,66,139,211,250,330	e+2d+3c+2b	116	64	4	48	55,17	3,45	41,38
411	212	e+2d+3c+2b+a	125	72	5	48	57,60	4,00	38,40
412	64,142,213,251	e+2d+3c+2b+2a	134	80	6	48	59,70	4,48	35,82
413		e+2d+3c+2b+3a	143	88	7	48	61,54	4,89	33,57
414		e+2d+3c+3b	130	72	4	54	55,38	3,08	41,54
415		e+2d+3c+3b+a	139	80	5	54	57,55	3,60	38,85
416		e+2d+3c+3b+2a	148	88	6	54	59,46	4,05	36,49
417		e+2d+3c+3b+3a	157	96	7	54	61,15	4,46	34,39
418		e+3d	29	0	5	24	0	17,24	82,76
419	724	e+3d+a	38	8	6	24	21,05	15,79	63,16
420	725	e+3d+2a	47	16	7	24	34,04	14,89	51,07
421	726	e+3d+3a	56	24	8	24	42,86	14,28	42,86
422		e+3d+b	43	8	5	30	18,60	11,63	69,77
423	614,728	e+3d+b+a	52	16	6	30	30,77	11,54	57,69
424	615,729	e+3d+b+2a	61	24	7	30	39,35	11,47	49,18
425	616,730	e+3d+b+3a	70	32	8	30	45,71	11,43	42,86
426		e+3d+2b	57	16	5	36	28,07	8,77	63,16
427	173,230,370,618,671,866	e+3d+2b+a	66	24	6	36	36,36	9,09	54,55
428	619,732,810	e+3d+2b+2a	75	32	7	36	42,67	9,33	48,00
429	620,733,811	e+3d+2b+3a	84	40	8	36	47,62	9,52	42,86
430		e+3d+3b	71	24	5	42	33,80	7,04	59,16
431	622	e+3d+3b+a	80	32	6	42	40,00	7,50	52,50
432	623,814	e+3d+3b+2a	89	40	7	42	44,94	7,87	47,19
433	624,815	e+3d+3b+3a	98	48	8	42	48,98	8,16	42,86
434	546	e+3d+c	51	16	5	30	31,37	9,81	58,82

Nummer	Nummer der gleichgeltenden Complexionen	Fortlaufende Complexionen	Stöchiometri- sche Zahlen				Nach 100 Theilen berechnet		
			Summe	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.
435	547,738	$e+3d+c+a$	60	24	6	30	40,00	10,00	50,00
436	548,739	$e+3d+c+2a$	69	32	7	30	46,38	10,14	43,48
437	549,740	$e+3d+c+3a$	78	40	8	30	51,28	10,26	38,46
438	550	$e+3d+c+b$	65	24	5	36	36,92	7,69	55,39
439	117,306,551,742,871	$e+3d+c+b+a$	74	32	6	36	43,24	8,11	48,65
440	552,630,743	$e+3d+c+b+2a$	83	40	7	36	48,19	8,44	43,37
441	118,307,553,744	$e+3d+c+b+3a$	92	48	8	36	52,17	8,70	39,13
442		$e+3d+c+2b$	79	32	5	42	40,51	6,33	53,16
443	632,746	$e+3d+c+2b+a$	88	40	6	42	45,45	6,82	47,73
444	633,747,826	$e+3d+c+2b+2a$	97	48	7	42	49,48	7,21	43,31
445	634,748,827	$e+3d+c+2b+3a$	106	56	8	42	52,83	7,55	39,62
446		$e+3d+c+3b$	93	40	5	48	43,01	5,38	51,61
447	120,310	$e+3d+c+3b+a$	102	48	6	48	47,06	5,88	47,06
448	636,830	$e+3d+c+3b+2a$	111	56	7	48	50,45	6,31	43,24
449	S	$e+3d+c+3b+3a$	120	64	8	48	53,33	6,67	40,00
450	367,562	$e+3d+2c$	73	32	5	36	43,84	6,85	49,31
451	368,563,754	$e+3d+2c+a$	82	40	6	36	48,78	7,32	43,90
452	369,564,755	$e+3d+2c+2a$	91	48	7	36	52,75	7,69	39,56
453	565,756	$e+3d+2c+3a$	100	56	8	36	56,00	8,00	36,00
454	566	$e+3d+2c+b$	87	40	5	42	45,98	5,75	48,27
455	567,642,758	$e+3d+2c+b+a$	96	48	6	42	50,00	6,25	43,75
456	S	$e+3d+2c+b+2a$	105	56	7	42	53,33	6,67	40,00
457	569,644,760	$e+3d+2c+b+3a$	114	64	8	42	56,14	7,02	36,84
458		$e+3d+2c+2b$	101	48	5	48	47,53	4,95	47,52
459	646,762	$e+3d+2c+2b+a$	110	56	6	48	50,91	5,45	43,64
460	647,763	$e+3d+2c+2b+2a$	119	64	7	48	53,78	5,88	40,34
461	648,764	$e+3d+2c+2b+3a$	128	72	8	48	56,25	6,25	37,50
462		$e+3d+2c+3b$	115	56	5	54	48,69	4,35	46,96
463	650	$e+3d+2c+3b+a$	124	64	6	54	51,61	4,84	43,55
464	651	$e+3d+2c+3b+2a$	133	72	7	54	54,14	5,26	40,60
465	652	$e+3d+2c+3b+3a$	142	80	8	54	56,34	5,63	38,03

Nummer	Nummer der gleichgeltenden Complexionen	Fortlaufende Complexionen	Stöchiometri- sche Zahlen				Nach 100 Theilen berechnet		
			Summe	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.
466	383,578	$e+3d+3c$	95	48	5	42	50,53	5,26	44,21
467	384,579,768	$e+3d+3c+a$	104	56	6	42	53,85	5,77	40,38
468	385,580,769	$e+3d+3c+2a$	113	64	7	42	56,64	6,19	37,17
469	581,770	$e+3d+3c+3a$	122	72	8	42	59,02	6,56	34,42
470	582	$e+3d+3c+b$	109	56	5	48	51,37	4,59	44,04
471	131,239,322,583,772	$e+3d+3c+b+a$	118	64	6	48	54,24	5,08	40,68
472	584,773	$e+3d+3c+b+2a$	127	72	7	48	56,69	5,51	37,80
473	132,240,323,585,774	$e+3d+3c+b+3a$	136	80	8	48	58,82	5,88	35,30
474		$e+3d+3c+2b$	123	64	5	54	52,03	4,07	43,90
475	59,203,246,319,402	$e+3d+3c+2b+a$	132	72	6	54	54,55	4,54	40,91
476	776	$e+3d+3c+2b+2a$	141	80	7	54	56,74	4,96	38,30
477	777	$e+3d+3c+2b+3a$	150	88	8	54	58,67	5,33	36,00
478		$e+3d+3c+3b$	137	72	5	60	52,55	3,65	43,80
479	135,326,	$e+3d+3c+3b+a$	146	80	6	60	54,79	4,11	41,10
480		$e+3d+3c+3b+2a$	155	88	7	60	56,77	4,52	38,71
481	136,327,522	$e+3d+3c+3b+3a$	164	96	8	60	58,54	4,88	36,58
482		$2e+a$	25	8	5	12	32,00	20,00	48,00
483		$2e+3a$	43	24	7	12	55,81	16,28	27,91
484	170,663,858	$2e+b$	30	8	4	18	26,67	13,33	60,00
485	171,665,860	$2e+b+a$	39	16	5	18	41,03	12,82	46,15
486	51,545,736,797	$2e+b+2a$	48	24	6	18	50,00	12,50	37,50
487		$2e+b+3a$	57	32	7	18	56,14	12,28	31,58
488	174,371,673,868	$2e+2b+a$	53	24	5	24	45,28	9,44	45,28
489	373	$2e+2b+3a$	71	40	7	24	56,34	9,86	33,80
490	177,374	$2e+3b$	58	24	4	30	41,38	6,90	51,72
491	178,375,570,953	$2e+3b+a$	67	32	5	30	47,76	7,46	44,78
492	179,376,571,955	$2e+3b+2a$	76	40	6	30	52,63	7,90	39,47
493	377,572	$2e+3b+3a$	85	48	7	30	56,47	8,24	35,29
494	295,799	$2e+c$	38	16	4	18	42,10	10,53	47,37
495	296,801	$2e+c+a$	47	24	5	18	51,06	10,64	38,30
496	297	$2e+c+2a$	56	32	6	18	57,14	10,72	32,14

Nummer	Nummer der gleichgeltenden Complexionen	Fortlaufende Complexionen	Stöchiometri- sche Zahlen				Nach 100 Theilen berechnet		
			Summe	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.
497		$2e+c+3a$	65	40	7	18	61,54	10,77	27,69
498	183,299,695,807,890	$2e+c+b$	52	24	4	24	46,15	7,69	46,16
499	184,300,697,809,892	$2e+c+b+a$	61	32	5	24	52,46	8,20	39,34
500	185,301	$2e+c+b+2a$	70	40	6	24	57,14	8,57	34,29
501		$2e+c+b+3a$	79	48	7	24	60,76	8,86	30,38
502	187,303,386,703,898	$2e+c+2b$	66	32	4	30	48,49	6,06	45,45
503	S	$2e+c+2b+a$	75	40	5	30	53,33	6,67	40,00
504	189,305,388	$2e+c+2b+2a$	84	48	6	30	57,14	7,14	35,72
505	389	$2e+c+2b+3a$	93	56	7	30	60,21	7,53	32,26
506	191,390,	$2e+c+3b$	80	40	4	36	50,00	5,00	45,00
507	192,391,586	$2e+c+3b+a$	89	48	5	36	53,93	5,62	40,45
508	193,392,587	$2e+c+3b+2a$	98	56	6	36	57,14	6,12	36,74
509	393,588	$2e+c+3b+3a$	107	64	7	36	59,81	6,54	33,65
510	121,312,833	$2e+2c+a$	69	40	5	24	57,97	7,25	34,78
511		$2e+2c+3a$	87	56	7	24	64,37	8,04	27,59
512	194,199,315,839	$2e+2c+b$	74	40	4	30	54,05	5,41	40,54
513	125,200,316,841	$2e+2c+b+a$	83	48	5	30	57,83	6,02	36,15
514	201,317	$2e+2c+b+2a$	92	56	6	30	60,87	6,52	32,61
515		$2e+2c+b+3a$	101	64	7	30	63,37	6,93	29,70
516	204,320,403	$2e+2c+2b+a$	97	56	5	36	57,73	5,16	37,11
517	405	$2e+2c+2b+3a$	115	72	7	36	62,61	6,09	31,30
518	207,406	$2e+2c+3b$	102	56	4	42	54,90	3,92	41,18
519	208,407	$2e+2c+3b+a$	111	64	5	42	57,66	4,50	37,84
520	209,408	$2e+2c+3b+2a$	120	72	6	42	60,00	5,00	35,00
521	409	$2e+2c+3b+3a$	129	80	7	42	62,01	5,43	32,56
522	136,327,481	$2e+3c$	82	48	4	30	58,54	4,88	36,58
523	137,328	$2e+3c+a$	91	56	5	30	61,54	5,49	32,97
524	329	$2e+3c+2a$	100	64	6	30	64,00	6,00	30,00
525		$2e+3c+3a$	109	72	7	30	66,06	6,42	27,52
526	140,214,331	$2e+3c+b$	96	56	4	36	58,33	4,17	37,50
527	141,215,332	$2e+3c+b+a$	105	64	5	36	60,95	4,76	34,29

Nummer	Nummer der gleichgeltenden Complexionen	Fortlaufende Complexionen	Stöchiometri- sche Zahlen				Nach 100 Theilen berechnet		
			Summe	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.
528	65,67,252,333	$2e+3c+b+2a$	114	72	6	36	63,16	5,26	31,58
529		$2e+3c+b+3a$	123	80	7	36	65,04	5,69	29,27
530	217,335	$2e+3c+2b$	110	64	4	42	58,18	3,64	38,18
531	218,336	$2e+3c+2b+a$	119	72	5	42	60,51	4,20	35,29
532	219,337	$2e+3c+2b+2a$	128	80	6	42	62,50	4,69	32,81
533		$2e+3c+2b+3a$	137	88	7	42	64,23	5,11	30,66
534	221	$2e+3c+3b$	124	72	4	48	58,06	3,23	38,71
535	222	$2e+3c+3b+a$	133	80	5	48	60,15	3,76	36,09
536	223	$2e+3c+3b+2a$	142	88	6	48	61,97	4,23	33,80
537		$2e+3c+3b+3a$	151	96	7	48	63,58	4,63	31,79
538		$2e+d$	23	0	5	18	0	21,74	78,26
539		$2e+d+a$	32	8	6	18	25,00	18,75	56,25
540		$2e+d+2a$	41	16	7	18	39,03	17,07	43,90
541		$2e+d+3a$	50	24	8	18	48,00	16,00	36,00
542		$2e+d+b$	37	8	5	24	21,62	13,51	64,87
543	114,664,734,859	$2e+d+b+a$	46	16	6	24	34,78	13,04	52,18
544	735	$2e+d+b+2a$	55	24	7	24	43,63	12,73	43,64
545	51,486,736,797	$2e+d+b+3a$	64	32	8	24	50,00	12,50	37,50
546	434	$2e+d+2b$	51	16	5	30	31,37	9,81	58,82
547	435,738	$2e+d+2b+a$	60	24	6	30	40,00	10,00	50,00
548	436,739	$2e+d+2b+2a$	69	32	7	30	46,38	10,14	43,48
549	437,740	$2e+d+2b+3a$	78	40	8	30	51,28	10,26	38,46
550	438	$2e+d+3b$	65	24	5	36	36,92	7,69	55,39
551	117,306,439,742,871	$2e+d+3b+a$	74	32	6	36	43,24	8,11	48,65
552	440,630,743	$2e+d+3b+2a$	83	40	7	36	48,19	8,44	43,37
553	118,307,441,744	$2e+d+3b+3a$	92	48	8	36	52,17	8,70	39,13
554	359,923	$2e+d+c$	45	16	5	24	35,56	11,11	53,33
555	360,925	$2e+d+c+a$	54	24	6	24	44,45	11,11	44,44
556	361	$2e+d+c+2a$	63	32	7	24	50,79	11,11	38,10
557		$2e+d+c+3a$	72	40	8	24	55,56	11,11	33,33
558	363,931	$2e+d+c+b$	59	24	5	30	40,68	8,47	50,85

Nummer	Nummer der gleichgeltenden Complexionen	Fortlaufende Complexionen	Stöchiometrische Zahlen				Nach 100 Theilen berechnet		
			Summe	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.
559	364,750,933	$2e+d+c+b+a$	68	32	6	30	47,06	8,82	44,12
560	365,751	$2e+d+c+b+2a$	77	40	7	30	51,95	9,09	38,96
561	752	$2e+d+c+b+3a$	86	48	8	30	55,82	9,30	34,88
562	367,450	$2e+d+c+2b$	73	32	5	36	43,84	6,85	49,31
563	368,451,754	$2e+d+c+2b+a$	82	40	6	36	48,78	7,32	43,90
564	369,452,755	$2e+d+c+2b+2a$	91	48	7	36	52,75	7,69	39,56
565	453,756,	$2e+d+c+2b+3a$	100	56	8	36	56,00	8,00	36,00
566	454	$2e+d+c+3b$	87	40	5	42	45,98	5,75	48,27
567	455,642,758	$2e+d+c+3b+a$	96	48	6	42	50,00	6,25	43,75
568	S	$2e+d+c+3b+2a$	105	56	7	42	53,33	6,67	40,00
569	457,644,760	$2e+d+c+3b+3a$	114	64	8	42	56,14	7,02	36,84
570	178,375,491,953	$2e+d+2c$	67	32	5	30	47,76	7,46	44,78
571	179,376,492,955	$2e+d+2c+a$	76	40	6	30	52,63	7,90	39,47
572	377,493	$2e+d+2c+2a$	85	48	7	30	56,47	8,24	35,29
573		$2e+d+2c+3a$	94	56	8	30	59,57	8,51	31,92
574	181,379,960	$2e+d+2c+b$	81	40	5	36	49,38	6,17	44,45
575	S	$2e+d+2c+b+a$	90	48	6	36	53,33	6,67	40,00
576	381,766	$2e+d+2c+b+2a$	99	56	7	36	56,57	7,07	36,36
577	128,236,767	$2e+d+2c+b+3a$	108	64	8	36	59,26	7,41	33,33
578	383,466	$2e+d+2c+2b$	95	48	5	42	50,53	5,26	44,21
579	384,467,768	$2e+d+2c+2b+a$	104	56	6	42	53,85	5,77	40,38
580	385,468,769	$2e+d+2c+2b+2a$	113	64	7	42	56,64	6,19	37,17
581	469,770	$2e+d+2c+2b+3a$	122	72	8	42	59,02	6,56	34,42
582	470	$2e+d+2c+3b$	109	56	5	48	51,37	4,59	44,04
583	131,239,322,471,772	$2e+d+2c+3b+a$	118	64	6	48	54,24	5,08	40,68
584	472,773	$2e+d+2c+3b+2a$	127	72	7	48	56,69	5,51	37,80
585	132,240,323,473,774	$2e+d+2c+3b+3a$	136	80	8	48	58,82	5,88	35,30
586	192,391,507	$2e+d+3c$	89	48	5	36	53,93	5,62	40,45
587	193,392,508	$2e+d+3c+a$	98	56	6	36	57,14	6,12	36,74
588	393,509	$2e+d+3c+2a$	107	64	7	36	59,81	6,54	33,65
589		$2e+d+3c+3a$	116	72	8	36	62,07	6,90	31,03

Nummer	Nummer der gleichgeltenden Complexionen	Fortlaufende Complexionen	Stöchiometri- sche Zahlen				Nach 100 Theilen berechnet		
			Summe	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.
590	196,395	$2e+d+3c+b$	103	56	5	42	54,37	4,85	40,78
591	197,396	$2e+d+3c+b+a$	112	64	6	42	57,14	5,36	37,50
592	397	$2e+d+3c+b+2a$	121	72	7	42	59,50	5,79	34,71
593		$2e+d+3c+b+3a$	130	80	8	42	61,54	6,15	32,31
594	399	$2e+d+3c+2b$	117	64	5	48	54,70	4,27	41,03
595	400	$2e+d+3c+2b+a$	126	72	6	48	57,14	4,76	38,10
596	401	$2e+d+3c+2b+2a$	135	80	7	48	59,26	5,18	35,56
597		$2e+d+3c+2b+3a$	144	88	8	48	61,11	5,56	33,33
598		$2e+d+3c+3b$	131	72	5	54	54,96	3,82	41,22
599		$2e+d+3c+3b+a$	140	80	6	54	57,14	4,29	38,57
600		$2e+d+3c+3b+2a$	149	88	7	54	59,06	4,70	36,24
601		$2e+d+3c+3b+3a$	158	96	8	54	60,76	5,06	34,18
602		$2e+2d+a$	39	8	7	24	20,51	17,95	61,54
603		$2e+2d+3a$	57	24	9	24	42,11	15,78	42,11
604		$2e+2d+b$	44	8	6	30	18,18	13,64	68,18
605	794	$2e+2d+b+a$	53	16	7	30	30,19	13,21	56,60
606	795	$2e+2d+b+2a$	62	24	8	30	38,71	12,90	48,39
607	796	$2e+2d+b+3a$	71	32	9	30	45,07	12,68	42,25
608	798	$2e+2d+2b+a$	67	24	7	36	35,82	10,45	53,73
609	800	$2e+2d+2b+3a$	85	40	9	36	47,06	10,59	42,35
610		$2e+2d+3b$	72	24	6	42	33,33	8,33	58,34
611	690,802	$2e+2d+3b+a$	81	32	7	42	39,51	8,64	51,85
612	691,803	$2e+2d+3b+2a$	90	40	8	42	44,44	8,89	46,67
613	692,804	$2e+2d+3b+3a$	99	48	9	42	48,49	9,09	42,42
614	423,728	$2e+2d+c$	52	16	6	30	30,77	11,54	57,69
615	424,729	$2e+2d+c+a$	61	24	7	30	39,35	11,47	49,18
616	425,730	$2e+2d+c+2a$	70	32	8	30	45,71	11,43	42,86
617	731	$2e+2d+c+3a$	79	40	9	30	50,63	11,39	37,98
618	173,230,370,427,671,866	$2e+2d+c+b$	66	24	6	36	36,36	9,09	54,55
619	428,732,810	$2e+2d+c+b+a$	75	32	7	36	42,67	9,33	48,00
620	429,733,811	$2e+2d+c+b+2a$	84	40	8	36	47,62	9,52	42,86

Nummer	Nummer der gleichgeltenden Complexionen	Fortlaufende Complexionen	Stöchiometri- sche Zahlen				Nach 100 Theilen berechnet		
			Summe	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.
621	175,231,372,812	$2e+2d+c+b+3a$	93	48	9	36	51,61	9,68	38,71
622	431	$2e+2d+c+2b$	80	32	6	42	40,00	7,50	52,50
623	432,814	$2e+2d+c+2b+a$	89	40	7	42	44,94	7,87	47,19
624	433,815	$2e+2d+c+2b+2a$	98	48	8	42	48,98	8,16	42,86
625	816	$2e+2d+c+2b+3a$	107	56	9	42	52,34	8,41	39,25
626		$2e+2d+c+3b$	94	40	6	48	42,55	6,38	51,07
627	706,818	$2e+2d+c+3b+a$	103	48	7	48	46,60	6,80	46,60
628	707,819	$2e+2d+c+3b+2a$	112	56	8	48	50,00	7,14	42,86
629	708,820	$2e+2d+c+3b+3a$	121	64	9	48	52,89	7,44	39,67
630	440,552,743	$2e+2d+2c+a$	83	40	7	36	48,19	8,44	43,37
631	745	$2e+2d+2c+3a$	101	56	9	36	55,45	8,91	35,64
632	443,746	$2e+2d+2c+b$	88	40	6	42	45,45	6,82	47,73
633	444,747,826	$2e+2d+2c+b+a$	97	48	7	42	49,48	7,21	43,31
634	445,748,827	$2e+2d+2c+b+2a$	106	56	8	42	52,83	7,55	39,62
635	749,828	$2e+2d+2c+b+3a$	115	64	9	42	55,65	7,83	36,52
636	448,830	$2e+2d+2c+2b+a$	111	56	7	48	50,45	6,31	43,24
637	832	$2e+2d+2c+2b+3a$	129	72	9	48	55,81	6,98	37,21
638		$2e+2d+2c+3b$	116	56	6	54	48,28	5,17	46,55
639	834	$2e+2d+2c+3b+a$	125	64	7	54	51,20	5,60	43,20
640	835	$2e+2d+2c+3b+2a$	134	72	8	54	53,73	5,97	40,30
641	836	$2e+2d+2c+3b+3a$	143	80	9	54	55,95	6,29	37,76
642	455,567,758	$2e+2d+3c$	96	48	6	42	50,00	6,25	43,75
643	S	$2e+2d+3c+a$	105	56	7	42	53,33	6,67	40,00
644	457,569,760	$2e+2d+3c+2a$	114	64	8	42	56,14	7,02	36,84
645	761	$2e+2d+3c+3a$	123	72	9	42	58,54	7,32	34,14
646	459,762	$2e+2d+3c+b$	110	56	6	48	50,91	5,45	43,64
647	460,763	$2e+2d+3c+b+a$	119	64	7	48	53,78	5,88	40,34
648	461,764	$2e+2d+3c+b+2a$	128	72	8	48	56,25	6,25	37,50
649	765	$2e+2d+3c+b+3a$	137	80	9	48	58,39	6,57	35,04
650	463	$2e+2d+3c+2b$	124	64	6	54	51,61	4,84	43,55
651	464	$2e+2d+3c+2b+a$	133	72	7	54	54,14	5,26	40,60

Nummer	Nummer der gleichgeltenden Complexionen					Fortlaufende Complexionen	Stöchiometrische Zahlen				Nach 100 Theilen berechnet		
							Summe	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.
652	465	10,12	0,2	0	8	2e+2d+3c+2b+2a	142	80	8	54	56,34	5,63	38,03
653	465	10,12	0,2	0	8	2e+2d+3c+2b+3a	151	88	9	54	58,28	5,96	35,76
654	465	10,12	0,2	0	8	2e+2d+3c+3b	138	72	6	60	52,17	4,35	43,48
655	465	10,12	0,2	0	8	2e+2d+3c+3b+a	147	80	7	60	54,42	4,76	40,82
656	465	10,12	0,2	0	8	2e+2d+3c+3b+2a	156	88	8	60	56,41	5,13	38,46
657	465	10,12	0,2	0	8	2e+2d+3c+3b+3a	165	96	9	60	58,18	5,46	36,36
658	465	10,12	0,2	0	8	2e+3d	37	0	7	30	0	18,92	81,08
659	465	10,12	0,2	0	8	2e+3d+a	46	8	8	30	17,39	17,39	65,22
660	465	10,12	0,2	0	8	2e+3d+2a	55	16	9	30	29,09	16,36	54,55
661	465	10,12	0,2	0	8	2e+3d+3a	64	24	10	30	37,50	15,62	46,88
662	465	10,12	0,2	0	8	2e+3d+b	51	8	7	36	15,69	13,72	70,59
663	170,484,858	10,12	0,2	0	8	2e+3d+b+a	60	16	8	36	26,67	13,33	60,00
664	114,543,734,859	10,12	0,2	0	8	2e+3d+b+2a	69	24	9	36	34,78	13,04	52,18
665	171,485,860	10,12	0,2	0	8	2e+3d+b+3a	78	32	10	36	41,03	12,82	46,15
666	465	10,12	0,2	0	8	2e+3d+2b	65	16	7	42	24,62	10,77	64,61
667	862	10,12	0,2	0	8	2e+3d+2b+a	74	24	8	42	32,43	10,81	56,76
668	863	10,12	0,2	0	8	2e+3d+2b+2a	83	32	9	42	38,56	10,84	50,60
669	864	10,12	0,2	0	8	2e+3d+2b+3a	92	40	10	42	43,48	10,87	45,65
670	465	10,12	0,2	0	8	2e+3d+3b	79	24	7	48	30,38	8,86	60,76
671	173,230,370,427,618,866	10,12	0,2	0	8	2e+3d+3b+a	88	32	8	48	36,36	9,09	54,55
672	867	10,12	0,2	0	8	2e+3d+3b+2a	97	40	9	48	41,24	9,28	49,48
673	174,371,488,868	10,12	0,2	0	8	2e+3d+3b+3a	106	48	10	48	45,28	9,44	45,28
674	786	10,12	0,2	0	8	2e+3d+c	59	16	7	36	27,12	11,86	61,02
675	787	10,12	0,2	0	8	2e+3d+c+a	68	24	8	36	35,29	11,77	52,94
676	788	10,12	0,2	0	8	2e+3d+c+2a	77	32	9	36	41,56	11,69	46,75
677	789	10,12	0,2	0	8	2e+3d+c+3a	86	40	10	36	46,51	11,63	41,86
678	790	10,12	0,2	0	8	2e+3d+c+b	73	24	7	42	32,88	9,59	57,53
679	791,874	10,12	0,2	0	8	2e+3d+c+b+a	82	32	8	42	39,02	9,76	51,22
680	792,875	10,12	0,2	0	8	2e+3d+c+b+2a	91	40	9	42	43,96	9,89	46,15
681	793,876	10,12	0,2	0	8	2e+3d+c+b+3a	100	48	10	42	48,00	10,00	42,00
682	465	10,12	0,2	0	8	2e+3d+c+2b	87	32	7	48	36,78	8,05	55,17

Nummer	Nummer der gleichgeltenden Complexionen					Fortlaufende Complexionen	Stöchiometri- sche Zahlen				Nach 100 Theilen berechnet			
							Summe	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.	
683	878	2	08,84	00	7	40	$2e+3d+c+2b+a$	96	40	8	48	41,67	8,33	50,00
684	879	2	24,12	00	8	27	$2e+3d+c+2b+2a$	105	48	9	48	45,71	8,58	45,71
685	880	0	00,22	00	9	08	$2e+3d+c+2b+3a$	114	56	10	48	49,12	8,77	42,11
686	881	0	00,22	00	10	88	$2e+3d+c+3b$	101	40	7	54	39,60	6,93	53,47
687	882	2	20,04	00	7	27	$2e+3d+c+3b+a$	110	48	8	54	43,64	7,27	49,09
688	883	2	20,04	00	8	08	$2e+3d+c+3b+2a$	119	56	9	54	47,06	7,56	45,38
689	884	2	00,22	00	9	88	$2e+3d+c+3b+3a$	128	64	10	54	50,00	7,81	42,19
690	611,802	1	08,22	00	01	00	$2e+3d+2c$	81	32	7	42	39,51	8,64	51,85
691	612,803	2	24,12	00	7	8	$2e+3d+2c+a$	90	40	8	42	44,44	8,89	46,67
692	613,804	2	00,22	00	8	01	$2e+3d+2c+2a$	99	48	9	42	48,49	9,09	42,42
693	805	2	20,04	00	8	8	$2e+3d+2c+3a$	108	56	10	42	51,85	9,26	38,89
694	806	2	00,22	00	9	01	$2e+3d+2c+b$	95	40	7	48	42,10	7,37	50,53
695	183,299,498,807,890	1	08,22	00	01	00	$2e+3d+2c+b+a$	104	48	8	48	46,15	7,69	46,16
696	808,891	2	00,22	00	9	01	$2e+3d+2c+b+2a$	113	56	9	48	49,56	7,96	42,48
697	184,300,499,809,892	1	00,22	00	01	00	$2e+3d+2c+b+3a$	122	64	10	48	52,46	8,20	39,34
698	893	2	20,04	00	7	40	$2e+3d+2c+2b$	109	48	7	54	44,04	6,42	49,54
699	894	2	00,22	00	8	01	$2e+3d+2c+2b+a$	118	56	8	54	47,46	6,78	45,76
700	895	2	00,22	00	9	01	$2e+3d+2c+2b+2a$	127	64	9	54	50,39	7,09	42,52
701	896	2	00,22	00	10	01	$2e+3d+2c+2b+3a$	136	72	10	54	52,94	7,35	39,71
702	897	2	00,22	00	11	01	$2e+3d+2c+3b$	123	56	7	60	45,53	5,69	48,78
703	187,303,386,502,898	1	08,22	00	01	00	$2e+3d+2c+3b+a$	132	64	8	60	48,49	6,06	45,45
704	899	2	00,22	00	12	01	$2e+3d+2c+3b+2a$	141	72	9	60	51,07	6,38	42,55
705	S	2	00,22	00	13	01	$2e+3d+2c+3b+3a$	150	80	10	60	53,33	6,67	40,00
706	627,818	2	00,22	00	14	01	$2e+3d+3c$	103	48	7	48	46,60	6,80	46,60
707	628,819	2	00,22	00	15	01	$2e+3d+3c+a$	112	56	8	48	50,00	7,14	42,86
708	629,820	2	00,22	00	16	01	$2e+3d+3c+2a$	121	64	9	48	52,89	7,44	39,67
709	821	2	00,22	00	17	01	$2e+3d+3c+3a$	130	72	10	48	55,39	7,69	36,92
710	822	2	00,22	00	18	01	$2e+3d+3c+b$	117	56	7	54	47,86	5,98	46,16
711	823	2	00,22	00	19	01	$2e+3d+3c+b+a$	126	64	8	54	50,79	6,35	42,86
712	S	2	00,22	00	20	01	$2e+3d+3c+b+2a$	135	72	9	54	53,33	6,67	40,00
713	825	2	00,22	00	21	01	$2e+3d+3c+b+3a$	144	80	10	54	55,56	6,94	37,50

Nummer	Nummer der gleichgeltenden Complexionen	Fortlaufende Complexionen	Stöchiometri- sche Zahlen				Nach 100 Theilen berechnet		
			Summe	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.
714		$2e+3d+3c+2b$	131	64	7	60	48,86	5,34	45,80
715		$2e+3d+3c+2b+a$	140	72	8	60	51,43	5,71	42,86
716		$2e+3d+3c+2b+2a$	149	80	9	60	53,69	6,04	40,27
717		$2e+3d+3c+2b+3a$	158	88	10	60	55,70	6,33	37,97
718		$2e+3d+3c+3b$	145	72	7	66	49,65	4,83	45,52
719		$2e+3d+3c+3b+a$	154	80	8	66	51,95	5,19	42,86
720		$2e+3d+3c+3b+2a$	163	88	9	66	53,99	5,52	40,49
721		$2e+3d+3c+3b+3a$	172	96	10	66	55,81	5,81	38,38
722		$3e+a$	33	8	7	18	24,24	21,21	54,55
723		$3e+2a$	42	16	8	18	38,09	19,05	42,86
724	419	$3e+b$	38	8	6	24	21,05	15,79	63,16
725	420	$3e+b+a$	47	16	7	24	34,04	14,89	51,07
726	421	$3e+b+2a$	56	24	8	24	42,86	14,28	42,86
727		$3e+b+3a$	65	32	9	24	49,23	13,85	36,92
728	423,614	$3e+2b$	52	16	6	30	30,77	11,54	57,69
729	424,615	$3e+2b+a$	61	24	7	30	39,35	11,47	49,18
730	425,616	$3e+2b+2a$	70	32	8	30	45,71	11,43	42,86
731	617	$3e+2b+3a$	79	40	9	30	50,63	11,39	37,98
732	428,619,810	$3e+3b+a$	75	32	7	36	42,67	9,33	48,00
733	429,620,811	$3e+3b+2a$	84	40	8	36	47,62	9,52	42,86
734	114,543,664,859	$3e+c$	46	16	6	24	34,78	13,04	52,18
735	544	$3e+c+a$	55	24	7	24	43,63	12,73	43,64
736	51,486,545,797	$3e+c+2a$	64	32	8	24	50,00	12,50	37,50
737		$3e+c+3a$	73	40	9	24	54,79	12,33	32,88
738	435,547	$3e+c+b$	60	24	6	30	40,00	10,00	50,00
739	436,548	$3e+c+b+a$	69	32	7	30	46,38	10,14	43,48
740	437,549	$3e+c+b+2a$	78	40	8	30	51,28	10,26	38,46
741		$3e+c+b+3a$	87	48	9	30	55,17	10,35	34,48
742	117,306,439,551,871	$3e+c+2b$	74	32	6	36	43,24	8,11	48,65
743	440,552,630	$3e+c+2b+a$	83	40	7	36	48,19	8,44	43,37
744	118,307,441,553	$3e+c+2b+2a$	92	48	8	36	52,17	8,70	39,13

Nummer	Nummer der gleichgeltenden Complexionen	Fortlaufende Complexionen	Stöchiometri- sche Zahlen				Nach 100 Theilen berechnet		
			Summe	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.
745	631	$3e+c+2b+3a$	101	56	9	36	55,45	8,91	35,64
746	443,632	$3e+c+3b$	88	40	6	42	45,45	6,82	47,73
747	444,633,826	$3e+c+3b+a$	97	48	7	42	49,48	7,21	43,31
748	445,634,827	$3e+c+3b+2a$	106	56	8	42	52,83	7,55	39,62
749	635,828	$3e+c+3b+3a$	115	64	9	42	55,65	7,83	36,52
750	364,559,933	$3e+2c$	68	32	6	30	47,06	8,82	44,12
751	365,560	$3e+2c+a$	77	40	7	30	51,95	9,09	38,96
752	561	$3e+2c+2a$	86	48	8	30	55,82	9,30	34,88
753		$3e+2c+3a$	95	56	9	30	58,95	9,47	31,58
754	368,451,563	$3e+2c+b$	82	40	6	36	48,78	7,32	43,90
755	369,452,564	$3e+2c+b+a$	91	48	7	36	52,75	7,69	39,56
756	453,565	$3e+2c+b+2a$	100	56	8	36	56,00	8,00	36,00
757		$3e+2c+b+3a$	109	64	9	36	58,71	8,26	33,03
758	455,567,642	$3e+2c+2b$	96	48	6	42	50,00	6,25	43,75
759	S	$3e+2c+2b+a$	105	56	7	42	53,33	6,67	40,00
760	457,569,644	$3e+2c+2b+2a$	114	64	8	42	56,14	7,02	36,84
761	645	$3e+2c+2b+3a$	123	72	9	42	58,54	7,32	34,14
762	459,646	$3e+2c+3b$	110	56	6	48	50,91	5,45	43,64
763	460,647	$3e+2c+3b+a$	119	64	7	48	53,78	5,88	40,34
764	461,648	$3e+2c+3b+2a$	128	72	8	48	56,25	6,25	37,50
765	649	$3e+2c+3b+3a$	137	80	9	48	58,39	6,57	35,04
766	381,576	$3e+3c+a$	99	56	7	36	56,57	7,07	36,36
767	128,236,577	$3e+3c+2a$	108	64	8	36	59,26	7,41	33,33
768	384,467,579	$3e+3c+b$	104	56	6	42	53,85	5,77	40,38
769	385,468,580	$3e+3c+b+a$	113	64	7	42	56,64	6,19	37,17
770	469,581	$3e+3c+b+2a$	122	72	8	42	59,02	6,56	34,42
771		$3e+3c+b+3a$	131	80	9	42	61,07	6,87	32,06
772	131,239,322,471,583	$3e+3c+2b$	118	64	6	48	54,24	5,08	40,68
773	472,584	$3e+3c+2b+a$	127	72	7	48	56,69	5,51	37,80
774	132,240,323,473,585	$3e+3c+2b+2a$	136	80	8	48	58,82	5,88	35,30
775		$3e+3c+2b+3a$	145	88	9	48	60,69	6,21	33,10

Nummer	Nummer der gleichgeltenden Complexionen					Fortlaufende Complexionen	Stöchiometrische Zahlen				Nach 100 Theilen berechnet		
							Summe	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.
776	476					$3e+3c+3b+a$	141	80	7	54	56,74	4,96	38,30
777	477					$3e+3c+3b+2a$	150	88	8	54	58,67	5,33	36,00
778						$3e+d$	31	0	7	24	0	22,58	77,42
779						$3e+d+a$	40	8	8	24	20,00	20,00	60,00
780						$3e+d+2a$	49	16	9	24	32,65	18,37	48,98
781						$3e+d+3a$	58	24	10	24	41,38	17,24	41,38
782						$3e+d+b$	45	8	7	30	17,78	15,55	66,67
783						$3e+d+b+a$	54	16	8	30	29,63	14,81	55,56
784						$3e+d+b+2a$	63	24	9	30	38,10	14,30	47,60
785						$3e+d+b+3a$	72	32	10	30	44,44	13,89	41,67
786	674					$3e+d+2b$	59	16	7	36	27,12	11,86	61,02
787	675					$3e+d+2b+a$	68	24	8	36	35,29	11,77	52,94
788	676					$3e+d+2b+2a$	77	32	9	36	41,56	11,69	46,75
789	677					$3e+d+2b+3a$	86	40	10	36	46,51	11,63	41,86
790	678					$3e+d+3b$	73	24	7	42	32,88	9,59	57,53
791	679,874					$3e+d+3b+a$	82	32	8	42	39,02	9,76	51,22
792	680,875					$3e+d+3b+2a$	91	40	9	42	43,96	9,89	46,15
793	681,876					$3e+d+3b+3a$	100	48	10	42	48,00	10,00	42,00
794	605					$3e+d+c$	53	16	7	30	30,19	13,21	56,60
795	606					$3e+d+c+a$	62	24	8	30	38,71	12,90	48,39
796	607					$3e+d+c+2a$	71	32	9	30	45,07	12,68	42,25
797	51,486,545,736					$3e+d+c+3a$	80	40	10	30	50,00	12,50	37,50
798	608					$3e+d+c+b$	67	24	7	36	35,82	10,45	53,73
799	295,494					$3e+d+c+b+a$	76	32	8	36	42,10	10,53	47,37
800	609					$3e+d+c+b+2a$	85	40	9	36	47,06	10,59	42,35
801	296,495					$3e+d+c+b+3a$	94	48	10	36	51,06	10,64	38,30
802	611,690					$3e+d+c+2b$	81	32	7	42	39,51	8,64	51,85
803	612,691					$3e+d+c+2b+a$	90	40	8	42	44,44	8,89	46,67
804	613,692					$3e+d+c+2b+2a$	99	48	9	42	48,49	9,09	42,42
805	693					$3e+d+c+2b+3a$	108	56	10	42	51,85	9,26	38,89
806	694					$3e+d+c+3b$	95	40	7	48	42,10	7,37	50,53

Nummer	Nummer der gleichgeltenden Complexionen	Fortlaufende Complexionen	Stöchiometri- sche Zahlen				Nach 100 Theilen berechnet		
			Summe	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.
807	183,299,498,695,890	$3e+d+c+3b+a$	104	48	8	48	46,15	7,69	46,16
808	696,891	$3e+d+c+3b+2a$	113	56	9	48	49,56	7,96	42,48
809	184,300,499,697,892	$3e+d+c+3b+3a$	122	64	10	48	52,46	8,20	39,34
810	428,619,732	$3e+d+2c$	75	32	7	36	42,67	9,33	48,00
811	429,620,733	$3e+d+2c+a$	84	40	8	36	47,62	9,52	42,86
812	175,231,372,621,	$3e+d+2c+2a$	93	48	9	36	51,61	9,68	38,71
813		$3e+d+2c+3a$	102	56	10	36	54,90	9,80	35,30
814	432,623	$3e+d+2c+b$	89	40	7	42	44,94	7,87	47,19
815	433,624	$3e+d+2c+b+a$	98	48	8	42	48,98	8,16	42,86
816	625	$3e+d+2c+b+2a$	107	56	9	42	52,34	8,41	39,25
817		$3e+d+2c+b+3a$	116	64	10	42	55,17	8,62	36,21
818	627,706	$3e+d+2c+2b$	103	48	7	48	46,60	6,80	46,60
819	628,707	$3e+d+2c+2b+a$	112	56	8	48	50,00	7,14	42,86
820	629,708	$3e+d+2c+2b+2a$	121	64	9	48	52,89	7,44	39,67
821	709	$3e+d+2c+2b+3a$	130	72	10	48	55,39	7,69	36,92
822	710	$3e+d+2c+3b$	117	56	7	54	47,86	5,98	46,16
823	711	$3e+d+2c+3b+a$	126	64	8	54	50,79	6,35	42,86
824	S	$3e+d+2c+3b+2a$	135	72	9	54	53,33	6,67	40,00
825	713	$3e+d+2c+3b+3a$	144	80	10	54	55,56	6,94	37,50
826	444,633,747	$3e+d+3c$	97	48	7	42	49,48	7,21	43,31
827	445,634,748	$3e+d+3c+a$	106	56	8	42	52,83	7,55	39,62
828	635,749	$3e+d+3c+2a$	115	64	9	42	55,65	7,83	36,52
829		$3e+d+3c+3a$	124	72	10	42	58,06	8,06	33,88
830	448,636	$3e+d+3c+b$	111	56	7	48	50,45	6,31	43,24
831	S	$3e+d+3c+b+a$	120	64	8	48	53,33	6,67	40,00
832	637	$3e+d+3c+b+2a$	129	72	9	48	55,81	6,98	37,21
833	121,312,510	$3e+d+3c+b+3a$	138	80	10	48	57,97	7,25	34,78
834	639	$3e+d+3c+2b$	125	64	7	54	51,20	5,60	43,20
835	640	$3e+d+3c+2b+a$	134	72	8	54	53,73	5,97	40,30
836	641	$3e+d+3c+2b+2a$	143	80	9	54	55,95	6,29	37,76
837		$3e+d+3c+2b+3a$	152	88	10	54	57,89	6,58	35,53

Nummer	Nummer der gleichgeltenden Complexionen	Fortlaufende Complexionen	Stöchiometri- sche Zahlen				Nach 100 Theilen berechnet		
			Summe	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.
838		$3e+d+3c+3b$	139	72	7	60	51,80	5,04	43,16
839	124,199,315,512	$3e+d+3c+3b+a$	148	80	8	60	54,05	5,41	40,54
840		$3e+d+3c+3b+2a$	157	88	9	60	56,05	5,73	38,22
841	125,200,316,513	$3e+d+3c+3b+3a$	166	96	10	60	57,83	6,02	36,15
842		$3e+2d$	38	0	8	30	0	21,05	78,95
843		$3e+2d+a$	47	8	9	30	17,02	19,15	63,83
844		$3e+2d+2a$	56	16	10	30	28,57	17,86	53,57
845		$3e+2d+3a$	65	24	11	30	36,92	16,92	46,16
846		$3e+2d+b$	52	8	8	36	15,38	15,38	69,24
847		$3e+2d+b+a$	61	16	9	36	26,23	14,75	59,02
848		$3e+2d+b+2a$	70	24	10	36	34,29	14,29	51,42
849		$3e+2d+b+3a$	79	32	11	36	40,51	13,92	45,57
850		$3e+2d+2b$	66	16	8	42	24,24	12,12	63,64
851		$3e+2d+2b+a$	75	24	9	42	32,00	12,00	56,00
852		$3e+2d+2b+2a$	84	32	10	42	38,10	11,90	50,00
853		$3e+2d+2b+3a$	93	40	11	42	43,01	11,83	45,16
854		$3e+2d+3b$	80	24	8	48	30,00	10,00	60,00
855	934	$3e+2d+3b+a$	89	32	9	48	35,96	10,11	53,93
856	935	$3e+2d+3b+2a$	98	40	10	48	40,82	10,20	48,98
857	936	$3e+2d+3b+3a$	107	48	11	48	44,86	10,28	44,86
858	170,484,663	$3e+2d+c$	60	16	8	36	26,67	13,33	60,00
859	114,543,664,734	$3e+2d+c+a$	69	24	9	36	34,78	13,04	52,18
860	171,485,665	$3e+2d+c+2a$	78	32	10	36	41,03	12,82	46,15
861		$3e+2d+c+3a$	87	40	11	36	45,98	12,64	41,38
862	667	$3e+2d+c+b$	74	24	8	42	32,43	10,81	56,76
863	668	$3e+2d+c+b+a$	83	32	9	42	38,56	10,84	50,60
864	669	$3e+2d+c+b+2a$	92	40	10	42	43,48	10,87	45,65
865		$3e+2d+c+b+3a$	101	48	11	42	47,53	10,89	41,58
866	173,230,370,427,618,671	$3e+2d+c+2b$	88	32	8	48	36,36	9,09	54,55
867	672	$3e+2d+c+2b+a$	97	40	9	48	41,24	9,28	49,48
868	174,371,488,673	$3e+2d+c+2b+2a$	106	48	10	48	45,28	9,44	45,28

Nummer	Nummer der gleichgeltenden Complexionen	Fortlaufende Complexionen	Stöchiometri- sche Zahlen				Nach 100 Theilen berechnet		
			Summe	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.
869		$3e+2d+c+2b+3a$	115	56	11	48	48,69	9,57	41,74
870		$3e+2d+c+3b$	102	40	8	54	39,22	7,84	52,94
871	117,306,439,551,742	$3e+2d+c+3b+a$	111	48	9	54	43,24	8,11	48,65
872	950	$3e+2d+c+3b+2a$	120	56	10	54	46,67	8,33	45,00
873	951	$3e+2d+c+3b+3a$	129	64	11	54	49,61	8,53	41,86
874	679,791	$3e+2d+2c$	82	32	8	42	39,02	9,76	51,22
875	680,792	$3e+2d+2c+a$	91	40	9	42	43,96	9,89	46,15
876	681,793	$3e+2d+2c+2a$	100	48	10	42	48,00	10,00	42,00
877		$3e+2d+2c+3a$	109	56	11	42	51,38	10,09	38,53
878	683	$3e+2d+2c+b$	96	40	8	48	41,67	8,33	50,00
879	684	$3e+2d+2c+b+a$	105	48	9	48	45,71	8,58	45,71
880	685	$3e+2d+2c+b+2a$	114	56	10	48	49,12	8,77	42,11
881		$3e+2d+2c+b+3a$	123	64	11	48	52,03	8,94	39,03
882	687	$3e+2d+2c+2b$	110	48	8	54	43,64	7,27	49,09
883	688	$3e+2d+2c+2b+a$	119	56	9	54	47,06	7,56	45,38
884	689	$3e+2d+2c+2b+2a$	128	64	10	54	50,00	7,81	42,19
885		$3e+2d+2c+2b+3a$	137	72	11	54	52,55	8,03	39,42
886		$3e+2d+2c+3b$	124	56	8	60	45,16	6,45	48,39
887		$3e+2d+2c+3b+a$	133	64	9	60	48,12	6,77	45,11
888		$3e+2d+2c+3b+2a$	142	72	10	60	50,71	7,04	42,25
889		$3e+2d+2c+3b+3a$	151	80	11	60	52,98	7,28	39,74
890	183,299,498,695,807	$3e+2d+3c$	104	48	8	48	46,15	7,69	46,16
891	696,808	$3e+2d+3c+a$	113	56	9	48	49,56	7,96	42,48
892	184,300,499,697,809	$3e+2d+3c+2a$	122	64	10	48	52,46	8,20	39,34
893		$3e+2d+3c+3a$	131	72	11	48	54,96	8,40	36,64
894	699	$3e+2d+3c+b$	118	56	8	54	47,46	6,78	45,76
895	700	$3e+2d+3c+b+a$	127	64	9	54	50,39	7,09	42,52
896	701	$3e+2d+3c+b+2a$	136	72	10	54	52,94	7,35	39,71
897		$3e+2d+3c+b+3a$	145	80	11	54	55,17	7,59	37,24
898	187,303,386,502,703	$3e+2d+3c+2b$	132	64	8	60	48,49	6,06	45,45
899	704	$3e+2d+3c+2b+a$	141	72	9	60	51,07	6,38	42,55

Nummer	Nummer der gleichgeltenden Complexionen	Fortlaufende Complexionen	Stöchiometri- sche Zahlen				Nach 100 Theilen berechnet		
			Summe	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.
900	S	$3e+2d+3c+2b+2a$	150	80	10	60	53,33	6,67	40,00
901		$3e+2d+3c+2b+3a$	159	88	11	60	55,35	6,92	37,73
902		$3e+2d+3c+3b$	146	72	8	66	49,32	5,48	45,20
903		$3e+2d+3c+3b+a$	155	80	9	66	51,61	5,81	42,58
904		$3e+2d+3c+3b+2a$	164	88	10	66	53,66	6,10	40,24
905		$3e+2d+3c+3b+3a$	173	96	11	66	55,49	6,36	38,15
906		$3e+3d+a$	54	8	10	36	14,81	18,52	66,67
907		$3e+3d+2a$	63	16	11	36	25,40	17,46	57,14
908		$3e+3d+b$	59	8	9	42	13,56	15,25	71,19
909		$3e+3d+b+a$	68	16	10	42	23,53	14,71	61,76
910		$3e+3d+b+2a$	77	24	11	42	31,17	14,29	54,54
911		$3e+3d+b+3a$	86	32	12	42	37,21	13,95	48,84
912		$3e+3d+2b$	73	16	9	48	21,92	12,33	65,75
913		$3e+3d+2b+a$	82	24	10	48	29,27	12,19	58,54
914		$3e+3d+2b+2a$	91	32	11	48	35,16	12,09	52,75
915		$3e+3d+2b+3a$	100	40	12	48	40,00	12,00	48,00
916		$3e+3d+3b+a$	96	32	10	54	33,33	10,42	56,25
917		$3e+3d+3b+2a$	105	40	11	54	38,09	10,48	51,43
918		$3e+3d+c$	67	16	9	42	23,88	13,43	62,69
919		$3e+3d+c+a$	76	24	10	42	31,58	13,16	55,26
920		$3e+3d+c+2a$	85	32	11	42	37,65	12,94	49,41
921		$3e+3d+c+3a$	94	40	12	42	42,55	12,77	44,68
922		$3e+3d+c+b$	81	24	9	48	29,63	11,11	59,26
923	359,554	$3e+3d+c+b+a$	90	32	10	48	35,56	11,11	53,33
924		$3e+3d+c+b+2a$	99	40	11	48	40,40	11,11	48,49
925	360,555	$3e+3d+c+b+3a$	108	48	12	48	44,45	11,11	44,44
926		$3e+3d+c+2b$	95	32	9	54	33,69	9,47	56,84
927		$3e+3d+c+2b+a$	104	40	10	54	38,46	9,62	51,92
928		$3e+3d+c+2b+2a$	113	48	11	54	42,48	9,73	47,79
929		$3e+3d+c+2b+3a$	122	56	12	54	45,90	9,84	44,26
930		$3e+3d+c+3b$	109	40	9	60	36,70	8,26	55,04

Nummer	Nummer der gleichgeltenden Complexionen	Fortlaufende Complexionen	Stöchiometri- sche Zahlen				Nach 100 Theilen berechnet		
			Summe	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.
931	363,558	$3e+3d+c+3b+a$	118	48	10	60	40,68	8,47	50,85
932		$3e+3d+c+3b+2a$	127	56	11	60	44,10	8,66	47,24
933	364,559,750	$3e+3d+c+3b+3a$	136	64	12	60	47,06	8,82	44,12
934	585	$3e+3d+2c$	89	32	9	48	35,96	10,11	53,93
935	856	$3e+3d+2c+a$	98	40	10	48	40,82	10,20	48,98
936	857	$3e+3d+2c+2a$	107	48	11	48	44,86	10,28	44,86
937		$3e+3d+2c+3a$	116	56	12	48	48,28	10,34	41,38
938		$3e+3d+2c+b$	103	40	9	54	38,83	8,74	52,43
939		$3e+3d+2c+b+a$	112	48	10	54	42,86	8,93	48,21
940		$3e+3d+2c+b+2a$	121	56	11	54	46,28	9,09	44,63
941		$3e+3d+2c+b+3a$	130	64	12	54	49,23	9,23	41,54
942		$3e+3d+2c+2b$	117	48	9	60	41,03	7,69	51,28
943		$3e+3d+2c+2b+a$	126	56	10	60	44,44	7,94	47,62
944		$3e+3d+2c+2b+2a$	135	64	11	60	47,41	8,15	44,44
945		$3e+3d+2c+2b+3a$	144	72	12	60	50,00	8,33	41,67
946		$3e+3d+2c+3b$	131	56	9	66	42,75	6,87	50,38
947		$3e+3d+2c+3b+a$	140	64	10	66	45,72	7,14	47,14
948		$3e+3d+2c+3b+2a$	149	72	11	66	48,32	7,38	44,30
949		$3e+3d+2c+3b+3a$	158	80	12	66	50,63	7,60	41,77
950	872	$3e+3d+3c+a$	120	56	10	54	46,67	8,33	45,00
951	873	$3e+3d+3c+2a$	129	64	11	54	49,61	8,53	41,86
952		$3e+3d+3c+b$	125	56	9	60	44,80	7,20	48,00
953	178,375,491,570	$3e+3d+3c+b+a$	134	64	10	60	47,76	7,46	44,78
954		$3e+3d+3c+b+2a$	143	72	11	60	50,35	7,69	41,96
955	179,376,492,571	$3e+3d+3c+b+3a$	152	80	12	60	52,63	7,90	39,47
956		$3e+3d+3c+2b$	139	64	9	66	46,04	6,48	47,48
957		$3e+3d+3c+2b+a$	148	72	10	66	48,65	6,76	44,59
958		$3e+3d+3c+2b+2a$	157	80	11	66	50,95	7,01	42,04
959		$3e+3d+3c+2b+3a$	166	88	12	66	53,01	7,23	39,76
960	181,379,574	$3e+3d+3c+3b+a$	162	88	10	72	49,38	6,17	44,45
961		$3e+3d+3c+3b+2a$	171	88	11	72	51,46	6,43	42,11

Es sind zwar in der zweiten Spalte der Tafeln die *Nummern* der gleichgeltenden Complexionen aufgeführt worden; nachträglich wollen wir aber auch die *Mengen* derselben und die ersten Nummern einer jeden Gruppe gleichgeltender Complexionen anführen. So wie nämlich nur eine schon oben (S. 132.) angeführte Gruppe von ein- und zwanzig gleichgeltenden Complexionen vorkommt, eben so kommen vor:

A) 2 Gruppen von *sieben* gleichgeltenden Complexionen

B) 7 - - *sechs* - - - -

C) 14 - - *fünf* - - - -

D) 27 - - *vier* - - - -

E) 66 - - *drei* - - - -

F) 105 - - *zwei* - - - -

Die ersten Nummern sind

von A) 63, 173

- B) 59, 117, 131, 132, 183, 184, 187

- C) 3, 6, 51, 60, 64, 65, 114, 118, 124, 125, 174, 175, 178, 179

- D) 8, 9, 121, 126, 128, 136, 140, 141, 170, 171, 181, 189, 192, 193, 204, 364, 368, 369, 384, 385, 428, 429, 440, 444, 445, 455, 457

- E) 56, 71, 72, 75, 76, 79, 80, 81, 120, 123, 133, 135, 137, 145, 146, 147, 177, 185, 191, 196, 197, 201, 207, 208, 209, 217, 218, 219, 295, 296, 359, 360, 363, 365, 367, 377, 381, 383, 393, 423, 424, 425, 432, 433, 435, 436, 437, 443, 448, 453, 459, 460, 461, 469, 472, 611, 612, 613, 627, 628, 629, 635, 679, 680, 681, 696

- F) 23, 24, 25, 57, 61, 73, 77, 88, 91, 92, 93, 119, 129, 130, 143, 144, 148, 149, 151, 152, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 182, 186, 195, 202, 212, 216, 221, 222, 223, 297, 329, 361,

373, 389, 397, 399, 400, 401, 405, 409, 419, 420, 421, 431,
 434, 438, 454, 463, 464, 465, 470, 476, 477, 544, 561, 605,
 606, 607, 608, 609, 617, 625, 631, 637, 639, 640, 641, 645,
 649, 667, 668, 669, 672, 674, 675, 676, 677, 678, 683,
 684, 685, 687, 688, 689, 693, 694, 699, 700, 701, 704, 709,
 710, 711, 713, 855, 856, 857, 872, 873.

**Die Anzahl der Complexionen, für die es keine gleichgeltenden
 giebt, ist 298. Die Nummern derselben anzuführen, ist überflüssig.**

Bischof an den Präsidenten Nees von Esenbeck.

Sie haben aus dem Gange unserer bisherigen Untersuchungen ersehen, auf welchem Wege ich in Verbindung mit unserm Freunde *Rothe*, die Aufgabe, welche Sie mir vorlegten, zu lösen versucht habe. Um nun unsere Untersuchungen wieder an die Erfahrung, von der ich ausgegangen, anknüpfen zu können, wollen wir nur noch einen kurzen Blick auf die vorzüglichsten Resultate, die sich uns ergeben haben, werfen.

Durch das elektrochemische System gewannen wir die Ansicht, daß die organischen Körper aus binären Verbindungen der Elemente sich bilden; mit Hülfe der Combinationslehre ordneten wir die Zusammensetzungen dieser binären Verbindungen, und es wurde uns dadurch die Möglichkeit gegeben, die fast zahllose Mannichfaltigkeit der Natur in ihren Bildungen, sofern wir die materielle Verschiedenheit ihrer Erzeugnisse durch verschiedene Mischungsverhältnisse der Elemente bedingt betrachten, zu erreichen.

Wir fanden ferner, daß nicht *alle* Complexionen, welche die Combinationslehre zuläßt, *zugleich* Statt finden können, indem eine Anzahl derselben als gleichbedeutend mit andern ausgeschlossen werden mußte; allein es gelang uns, für die übrig bleibenden nützlichen Complexionen ein gewisses Gesetz aufzufinden, wornach die Menge derselben für *jede* Anzahl von binären Verbindungen, die aus den Elementen entstehen können, sich bestimmen läßt. Auf dem der Mathematik eigenthümlichen Wege, die Untersuchungen zu immer größerer Allgemeinheit zu führen, kamen wir endlich dahin, jenes Gesetz auch auf jede Anzahl von Verhältnistheilen, (Massentheilen, Atomen) die in eine organische Verbindung eingehen, auszudehnen.

Wir berechneten Tafeln für die fünf bekannten binären Verbindungen, wobei wir übrigens nur eine willkürliche Gränze für die Anzahl der Verhältnistheile setzen konnten. Diese Tafeln führten uns noch

weiter: wir fanden nämlich eine große Anzahl von Complexionen, welche auf einerlei Verhältnisse der Grundstoffe führten, obgleich sie an sich verschieden sind. Diefs veranlafte neue Untersuchungen, und es gelang uns, diese gleichgeltenden Complexionen, unabhängig von den Tafeln, durch Schlüsse zu bestimmen; zugleich fanden wir aber, daß sich nicht alle Verhältnisse der Grundstoffe durch unsere fünf binären Verbindungen hervorbringen lassen; sondern daß, diefs nur dann geschehen könne, wenn gewisse Bedingungsungleichungen Statt finden.

Ehe ich nun einzeln alle die bisher analysirten Pflanzenkörper durchgehe, und unsere aufgefundenen Gesetze durch die Erfahrung zu bewähren suche, muß ich vorher noch einiges im Allgemeinen erinnern.

Zur Erläuterung der Note S. 63 habe ich folgendes zu bemerken: So verschieden auch immer die Verfahrungsarten bei der Analyse der Pflanzenkörper seyn mögen, so kommen sie doch alle, wie oben (S. 32, 36 und 37) gezeigt worden, darin überein, daß die vegetabilische Substanz mit einem sauerstoffreichen Körper in einem verschlossenen Gefäße verbrannt, und aus den Producten der Verbrennung das Mischungsverhältniß gedachter Substanz bestimmt wird. Diese Producte sind bei denjenigen Körpern, welche von rein vegetabilischer Mischung sind, stets Wasser und Kohlensäure. Da nun die Chemiker nicht durchaus einerlei Mischungsverhältnisse dieser beiden binären Verbindungen zum Grunde legen, so müssen ihre Angaben etwas von einander abweichen, wenn auch die Resultate der Analysen selbst mit einander übereinstimmen. Es ist aber leicht einzusehen, daß es für unsern Zweck, nämlich für die Anordnung der Elemente nach binären Verbindungen, ganz einerlei ist, welches Mischungsverhältniß des Wassers und der Kohlensäure angenommen wird, wenn man nur das nämliche auch bei Berechnung der Tafeln anwendet; denn angenommen, man erwählte ein ganz unrichtiges, so hebt sich ja gegenseitig der Fehler, und nur die Verhältnisse der Elemente, also die 3 letzten Spalten der Tafeln, werden unrichtig ausfallen, worauf übrigens hier gar nichts ankommt. Da ich nun oben

(S. 63.) für den Sauer - Wasser - und Kohlenstoff die Verhältniszahlen 8, 1 und 6 gesetzt habe, und darnach die Tafeln berechnet worden sind, so müssen wir auch bei den Analysen dieselben Verhältniszahlen zum Grunde legen, und darnach die Verhältnisse der Elemente berechnen. Dieß kann jedoch nur füglich bei den Analysen von *Berzelius* geschehen, der jederzeit genau angiebt, wie viel er durch Verbrennung einer bestimmten Quantität irgend eines Pflanzenkörpers, Wasser und Kohlensäure erhalten hat. Ueberhaupt scheint es, daß vor *Berzelius* keiner mit so vieler Sorgfalt und Genauigkeit, solche Untersuchungen angestellt hat; obgleich ich keineswegs die Verdienste, welche sich namentlich *Gay - Lussac*, *Thenard* und *von Saussure* hierin erworben, verkenne. Ich werde daher auch vorzugsweise *Berzelius's* Analysen benützen, und nur, wenn diese mangeln, zu ändern meine Zuflucht nehmen.

Größtentheils finden wir in unsern Tafeln näherungsweise die Mischungsverhältnisse der Elemente von den analysirten Substanzen. Wenn aber mehr als 3 Verhältnistheile einer binären Verbindung in einen Pflanzenkörper eingehen, so sind die Tafeln unzureichend. Wie sich indess auch für diesen Fall die den gegebenen Verhältnissen der Elemente entsprechenden binären Verbindungen und die Anzahl der Verhältnistheile auffinden lassen, ergibt sich aus den von *Rothe* (S. 122. §. 57.) angegebenen Regeln. Es wird jedoch erfordert, daß folgende 3 Bedingungsungleichungen, welche unmittelbar aus §. 6. S. 110. folgen, Statt finden. Wenn nämlich O die Gewichtstheile des Sauerstoffs, H des Wasserstoffs und C des Kohlenstoffs bezeichnen; so muß

$$\frac{1}{8} O + H \geq \frac{1}{8} C$$

$$\frac{1}{8} O + \frac{1}{3} C \geq H$$

$$H + \frac{1}{3} C \geq \frac{1}{8} O$$

seyn, ausserdem lassen sich auf keine Weise die gegebenen Verhältnisse der Elemente durch die fünf binären Verbindungen darstellen.

Die Regeln zur Auffindung der den Verhältnissen der Elemente entsprechenden Complexionen erfordern ferner, daß die Zahlen für den Sauer-

Sauer - Wasser - und Kohlenstoff von der Art gegeben sind, daß die erstere durch 8 und die letztere durch 6 theilbar ist. Um nun aus den in Hunderttheilen gegebenen Zahlen der Elemente die eben erwähnten Verhältniszahlen zu finden, was der Natur der Sache nach nur approximativ geschehen kann, verfähre man, wie das nachstehende Beispiel zeigt.

Es sey die Zusammensetzung eines Pflanzenkörpers

Sauerstoff = 15

Wasserstoff = 20

Kohlenstoff = 65

100

Man dividire zunächst die erste Zahl durch 8, die zweite durch 1 und die dritte durch 6, so erhält man $\frac{15}{8} = 1,875$, $\frac{20}{1} = 20$, $\frac{65}{6} = 10,833\ldots$

und nun setze man für den kleinsten dieser Quotienten, der also hier 1,875 ist, nach der Reihe die Werthe 1, 2, 3, 4, 5 so ist

$1,875 : 20 = 1 : 10,66\ldots$

$= 2 : 21,33\ldots$

$= 3 : 32$

$= 4 : 42,66\ldots$

ferner

$1,875 : 10,833 = 1 : 5,77\ldots$

$= 2 : 11,55\ldots$

$= 3 : 17,33\ldots$

$= 4 : 23,11\ldots$

Es lassen sich folglich näherungsweise für

s die Werthe 1, 2, 3, 4

w - - - 11, 21, 32, 43

k - - - 6, 12, 17, 23

setzen, wo s, w und k die oben (S. 110. §. 1.) angezeigte Bedeutung haben.

Berechnet man nun für diese verschiedenen Werthe von s , w und k die Verhältnisse der Elemente, so findet sich, daß nach den ersten der größte Unterschied 0,45, nach den zweiten 1,05, nach den dritten 0,81, und nach den vierten 0,21 ist. Je nachdem nun 0,45 oder nur 0,21 der größte mögliche Beobachtungsfehler ist, kann man die ersten oder letzten Werthe annehmen. Dieser größte mögliche Beobachtungsfehler kann aber begreiflicher Weise nur dadurch gefunden werden, daß ein und derselbe Pflanzenkörper mehrmals mit aller Sorgfalt zerlegt wird; der größte Unterschied zwischen den verschiedenen durch die Analyse erhaltenen Resultaten giebt dann diesen größten Fehler.

Häufig wird der Fall eintreten, daß man den Resultaten der Analyse desto näher kommt, je höhere Werthe für s , w und k gesetzt werden. Zu erinnern ist aber hier, daß man nicht nach Willkühr diese Werthe steigern könne; denn aus den Gleichungen für s , w und k *) (S. 110. §. 1.) folgt unmittelbar, daß jede dieser drei Größen nicht größer seyn

*) Es ist leicht einzusehen, wie sich diese Gleichungen (a. a. O.) ergeben haben. Nach S. 64 und 67 ist nämlich

	Sauerst.	Wasserst.	Kohlenst.
a =	8	1	6
b =	8	1	6
c =	2.8	1	6
d =		1	6
e =		2.1	6
folglich			
aa =	a8	a1	a6
βb =	β8	β1	β6
γc =	γ2.8	γ1	γ6
δd =		δ1	δ6
εe =		ε2.1	ε6

Addirt man nun die Verhältnistheile des Sauer- Wasser- und Kohlenstoffs der fünf binären Verbindungen zusammen, so erhält man allgemein

	a8	+ β8	+ γ2.8	= 8s
folglich	a	+ β	+ 2γ	= s
ferner	a	+ δ	+ 2ε	= w
und endlich	β6	+ γ6	+ δ6 + ε6	= 6k
folglich	β	+ γ	+ δ + ε	= k

dürfe als das 4fache des Maximums der Verhältnistheile für die binären Verbindungen. Setzt man daher, wie bei Berechnung unserer Tafeln geschehen, die Zahl 3 als das Maximum, so kann jede der drei Gröfsen s , w und k nicht höher als bis auf 12 steigen. Allein da aus den oben (S. 62.) angegebenen Gründen dieses Maximum ohne allen Zweifel höher als 3 ist, so habe ich bei den einzelnen Pflanzenkörpern, die ich nun betrachten werde, die gleichgeltenden Complexionen für die höhern Zahlen berechnet. Ich ging bis auf 8 Verhältnistheile, mithin kann keine der Gröfsen s , w und k die Gränze 32 übersteigen; ich will aber damit gar nicht behaupten, als sey dieses das wahre Maximum: weiter unten werde ich indess meine Ansichten entwickeln, wie man hoffen kann, es auf experimentalen Wege zu finden.

Gemeiner Zucker.

Berzelius *) verbrannte 0,9675 Th. der basischen Verbindung des gemeinen Zuckers mit Bleioxyd, welche nach frühern Analysen 0,4 Zucker enthalten, mit überoxydirtsalzsaurem Kali, und erhielt 0,2305 Wasser und 0,651 Kohlensäure. Hieraus ergiebt sich nach den oben (S. 64.) angegebenen Verhältniszahlen für diese beiden binären Verbindungen, daß die Zusammensetzung des Zuckers nach Hunderttheilen ist:

Sauerstoff	=	49,21
Wasserstoff	=	6,40
Kohlenstoff	=	44,39
		100,00 **)

*) Thomson's Annals of Philos. V. v. P. 295.

**) Bezeichnet man nämlich allgemein das Wasser mit a , die Kohlensäure mit c und die zur Analyse angewandte Quantität des Pflanzenkörpers mit M , so ist, wie leicht einzusehen

$$\begin{aligned} \text{der Sauerstoff} &= \frac{99M - 11a - 27c}{99M} \cdot 100 \\ \text{der Wasserstoff} &= \frac{a}{9M} \cdot 100 \\ \text{der Kohlenstoff} &= \frac{3c}{11M} \cdot 100 \end{aligned}$$

Hiermit stimmen sehr nahe *Gay-Lussac* und *Thenard* *) überein; *Prout* **) weicht aber etwas hiervon ab.

Diese Verhältnisse der Elemente nähern sich am meisten den gleichgeltenden Complexionen 455, 567, 642 und 758 in den Tafeln, nach welchen der Zucker besteht aus

$$\begin{array}{rcl} \text{Sauerstoff} & = & 50,00 \\ \text{Wasserstoff} & = & 6,25 \\ \text{Kohlenstoff} & = & 43,75 \\ & & 100,00 \end{array}$$

Um nun die gleichgeltenden Complexionen für 8 Verhältnistheile aufzufinden, hat man für

$$\begin{array}{rcl} s & \text{die Werthe} & 6, 12, 18, 24 \\ w & - & 6, 12, 18, 24 \\ k & - & 7, 14, 21, 28 \text{ ***}) \end{array}$$

zu setzen, und es ergeben sich dann überhaupt nach *Rothe's* Regel (S. 122. §. 57.) folgende 33 gleichgeltende Complexionen:

$4d + c + 2b + 2a$	$3e + 3d + c + 7b + 3a$	$5e + 5d + 4c + 7b + 3a$
$7d + 7b + 5a$	$3e + 4d + 3c + 4b + 2a$	$5e + 6d + 6c + 4b + 2a$
$e + 2d + 4b + 2a$	$3e + 5d + 5c + b + a$	$5e + 7d + 8c + b + a$
$e + 3d + 2c + b + a$	$3e + 8d + 4c + 6b + 4a$	$6e + 4d + 5c + 6b + 2a$
$e + 6d + c + 6b + 4a$	$4e + 3d + 4c + 3b + a$	$6e + 5d + 7c + 3b + a$
$e + 7d + 3c + 3b + 3a$	$4e + 6d + 3c + 8b + 4a$	$7e + 2d + 4c + 8b + 2a$
$e + 8d + 5c + 2a$	$4e + 7d + 5c + 5b + 3a$	$7e + 3d + 6c + 5b + a$
$2e + d + c + 3b + a$	$4e + 8d + 7c + 2b + 2a$	$7e + 4d + 8c + 2b$
$2e + 2d + 3c$	$5e + c + 8b + 2a$	$7e + 7d + 7c + 7b + 3a$
$2e + 5d + 2c + 5b + 3a$	$5e + d + 3c + 5b + a$	$8e + d + 5c + 7b + a$
$3e + 2c + 2b$	$5e + 2d + 5c + 2b$	$8e + 2d + 7c + 4b$

*) *Rech.* II. 289.

**) *Schweigg. Journ.* B. XXII. S. 454.

***) Die ersten Werthe für s , w und k ergeben sich aus den Zahlen der 5ten, 6ten und 7ten Spalte der Complexion Nro. 455 in den Tafeln, wenn man die erste durch 8 (die Verhältniszahl des Sauerstoffs) und die letzte durch 6 (die Verhältniszahl des Kohlenstoffs) dividirt, die übrigen erhält man, wenn man jene ersten Werthe doppelt, dreifach u. s. w. nimmt.

Milchzucker.

Berzelius *) verbrannte 0,4 Milchzucker, und erhielt 0,244 Wasser und 0,5805 Kohlensäure. Demnach ist die Zusammensetzung des Milchzuckers:

Sauerstoff	=	53,64
Wasserstoff	=	6,78
Kohlenstoff	=	39,58
		100,00

Da aber *Berzelius* fand, daß der krystallisirte Milchzucker $12\frac{1}{3}$ Proc. Wasser enthält, so ist die eigentliche Zusammensetzung desselben

Sauerstoff	=	48,68
Wasserstoff	=	6,17
Kohlenstoff	=	45,15
		100,00

Thenard und *Gay-Lussac* **) weichen, da sie keine Rücksicht auf das Krystallisationswasser nehmen, etwas hievon ab.

Diese Verhältnisse der Elemente nähern sich am meisten den gleichgeltenden Complexionen 187, 303, 386, 502, 703, 898 in den Tafeln, nach welchen der Milchzucker besteht, aus:

Sauerstoff	=	48,49
Wasserstoff	=	6,06
Kohlenstoff	=	45,45
		100,00

Um nun die gleichgeltenden Complexionen für 8 Verhältnistheile aufzufinden, hat man für

s die Werthe	4, 8, 12, 16, 20, 24
w - -	4, 8, 12, 16, 20, 24
k - -	5, 10, 15, 20, 25, 30

*) a. a. O. 266.

**) a. a. O. 293.

zu setzen, und es ergeben sich dann überhaupt nach S. 122. §. 57. folgende 40 gleichgeltende Complexionen:

$3d + c + b + a$	$2e + 7d + 5c + b + a$	$5e + 5d + 5c + 5b + a$
$5d + 5b + 3a$	$3e + d + c + 5b + a$	$5e + 6d + 7c + 2b$
$8d + c + 6b + 4a$	$3e + 2d + 3c + 2b$	$5e + 8d + 6c + 6b + 2a$
$e + d + 3b + a$	$3e + 4d + 2c + 6b + 2a$	$6e + 3d + 4c + 7b + a$
$e + 2d + 2c$	$3e + 5d + 4c + 3b + a$	$6e + 6d + 5c + 8b + 2a$
$e + 4d + c + 4b + 2a$	$3e + 7d + 3c + 7b + 3a$	$6e + 7d + 7c + 5b + a$
$e + 5d + 3c + b + a$	$3e + 8d + 5c + 4b + 2a$	$7e + 2d + 5c + 6b$
$e + 6d + 8b + 4a$	$4e + 2d + c + 8b + 2a$	$7e + 5d + 6c + 7b + a$
$e + 7d + 2c + 5b + 3a$	$4e + 3d + 3c + 5b + a$	$7e + 6d + 8c + 4b$
$e + 8d + 4c + 2b + 2a$	$4e + 4d + 5c + 2b$	$7e + 8d + 7c + 8b + 2a$
$2e + c + 2b$	$4e + 7d + 6c + 3b + a$	$8e + 4d + 7c + 6b$
$2e + 3d + 2c + 3b + a$	$5e + d + 2c + 7b + a$	$8e + 7d + 8c + 7b + a$
$2e + 5d + c + 7b + 3a$	$5e + 2d + 4c + 4b$	
$2e + 6d + 3c + 4b + 2a$	$5e + 4d + 3c + 8b + 2a$	

Stärke zucker.
Nach von Saussure's *) Analyse des Stärkezuckers besteht derselbe aus:

Sauerstoff	=	55,87
Wasserstoff	=	6,84
Kohlenstoff	=	37,29
		100,00

Diese Verhältnisse nähern sich am meisten den gleichgeltenden Complexionen 637 , 832 in den Tafeln, nach welchen der Stärkezucker besteht aus:

Sauerstoff	=	55,81
Wasserstoff	=	6,98
Kohlenstoff	=	37,21
		100,00

*) Gilb. n. Ann. B. XIX. S. 136.

Um nun die gleichgeltenden Complexionen für 8 Verhältnistheile aufzufinden, hat man für

$$\begin{array}{rcl} s & \text{die Werthe} & 9, 18, 27 \\ w & - & 9, 18, 27 \\ k & - & 8, 16, 24 \end{array}$$

zu setzen, und es ergeben sich dann überhaupt nach S. 122. §. 57. folgende 26 gleichgeltende Complexionen:

$4d + 4b + 5a$	$3e + d + 3c + b + 2a$	$5e + 4d + 7c + 4a$
$5d + 2c + b + 4a$	$3e + 4d + c + 8b + 8a$	$6e + d + 4c + 5b + 5a$
$e + 3d + c + 3b + 4a$	$3e + 5d + 3c + 5b + 7a$	$6e + 7d + 8c + 3b + 8a$
$e + 4d + 3c + 3a$	$3e + 6d + 5c + 2b + 6a$	$7e + 5c + 4b + 4a$
$e + 8d + 3c + 4b + 8a$	$4e + 4c + a$	$7e + d + 7c + b + 3a$
$2e + d + 5b + 4a$	$4e + 3d + 2c + 7b + 7a$	$7e + 5d + 7c + 5b + 8a$
$2e + 2d + 2c + 2b + 3a$	$4e + 5d + 6c + b + 5a$	$8e + 3d + 6c + 7b + 8a$
$2e + 7d + 4c + 3b + 7a$	$5e + 2d + 3c + 6b + 6a$	$8e + 4d + 8c + 4b + 7a$
$3e + c + 4b + 3a$	$5e + 3d + 5c + 3b + 5a$	

Weintraubenzucker.

Nach von Saussure's*) Analyse des Weintraubenzuckers besteht derselbe aus:

$$\text{Sauerstoff} = 56,51$$

$$\text{Wasserstoff} = 6,78$$

$$\text{Kohlenstoff} = 36,71$$

$$\hline 100,00$$

Diese Verhältnisse nähern sich am meisten den gleichgeltenden Complexionen 381, 576, 766 in den Tafeln, nach welchen der Weintraubenzucker besteht aus:

$$\text{Sauerstoff} = 56,57$$

$$\text{Wasserstoff} = 7,07$$

$$\text{Kohlenstoff} = 36,36$$

$$\hline 100,00$$

*) a. a. O. S. 137.

Um nun die gleichgeltenden Complexionen für 8 Verhältnistheile aufzufinden, hat man für

s die Werthe 7, 14, 21, 28

w - - 7, 14, 21, 28

k - - 6, 12, 18, 24

zu setzen, und es ergeben sich dann überhaupt nach S. 122. §. 57. folgende 31 gleichgeltende Complexionen:

3d + 3b + 4a	3e + 2d + c + 6b + 6a	5e + 4d + 5c + 4b + 7a
4d + 2c + 3a	3e + 3d + 3c + 3b + 5a	5e + 5d + 7c + b + 6a
7d + 2c + 3b + 7a	3e + 4d + 5c + 4a	6e + 2d + 4c + 6b + 7a
e + 2d + c + 2b + 3a	3e + 7d + 5c + 3b + 8a	6e + 4d + 8c + 5a
e + 5d + c + 5b + 7a	3e + 8d + 7c + 7a	7e + 3c + 8b + 7a
e + 6d + 3c + 2b + 6a	4e + d + 2c + 5b + 5a	7e + d + 5c + 5b + 6a
2e + 4b + 3a	4e + 5d + 4c + 5b + 8a	7e + 2d + 7c + 2b + 5a
2e + d + 2c + b + 2a	4e + 6d + 6c + 2b + 7a	8e + 6c + 4b + 5a
2e + 3d + 7b + 7a	5e + 3c + 4b + 4a	8e + d + 8c + b + 4a
2e + 5d + 4c + b + 5a	5e + d + 5c + b + 3a	
3e + 3c + a	5e + 3d + 3c + 7b + 8a	

M a n n a z u c k e r.

Nach von Saussure's*) Analyse des Mannazuckers enthält derselbe zwar 0,32 Procent Stickstoff; ich zweifle aber an diesen so geringen Stickstoffgehalt, und nehme ihn von rein vegetabilischer Mischung an. Vertheilt man diesen Stickstoffgehalt auf die übrigen Elemente, so erhält man für die Zusammensetzung dieses Pflanzenkörpers

Sauerstoff = 45,94

Wasserstoff = 6,08

Kohlenstoff = 47,98

100,00

*) a. a. O. S. 145.

Diese Verhältnisse nähern sich den gleichgeltenden Complexionen 443, 632, 746; kommen aber am nächsten den beiden 454, 566 in den Tafeln, wornach der Mannazucker besteht aus:

Sauerstoff	=	45,98
Wasserstoff	=	5,75
Kohlenstoff	=	48,27
		100,00

Um nun die gleichgeltenden Complexionen für 8 Verhältnistheile aufzufinden, hat man für

s	die Werthe	5, 10, 15, 20
w	-	5, 10, 15, 20
k	-	7, 14, 21, 28

zu setzen, und es ergeben sich dann in Allem nach S. 122. §. 57. folgende 15 gleichgeltende Complexionen:

$4d + c + 2b + a$	$e + 7d + 3c + 3b + a$	$3e + 4d + 3c + 4b$
$7d + 7b + 3a$	$e + 8d + 5c$	$3e + 8d + 4c + 6b + a$
$e + 2d + 4b + a$	$2e + d + c + 3b$	$4e + 6d + 3c + 8b + a$
$e + 3d + 2c + b$	$2e + 5d + 2c + 5b + a$	$4e + 7d + 5c + 5b$
$e + 6d + c + 6b + 2a$	$3e + 3d + c + 7b + a$	$5e + 5d + 4c + 7b$

Stellen wir nun die verschiedenen *niedrigsten* Werthe für s, w und k, welche bei den bisher betrachteten Zuckerarten gesetzt worden sind, zusammen, so ergibt sich

	für	s	w	k
bei dem gemeinen Zucker		6	6	7
- - Milchzucker		4	4	5
- - Stärkezucker		9	9	8
- - Weintraubenzucker		7	7	6
- - Mannazucker		5	5	7

Hier finden wir, daß der Weintraubenzucker den geringsten Kohlenstoffgehalt hat, dann folgt der Stärkezucker, dann der gemeine Zucker, dann der Milchzucker und endlich der Mannazucker, in welchem der Kohlenstoff am meisten überwiegt. Wir bemerken ferner, daß in allen diesen verschiedenen Zuckerarten die Verhältnistheile des Sauer- Wasser- und Kohlenstoffs sich *fast* verhalten wie 1 : 1 : 1, und daß mithin eine Complexion, welche eine *gleiche* Anzahl von Verhältnistheilen der Elemente enthält, als ein mittleres Verhältniß zwischen den verschiedenen Zuckerarten zu betrachten ist. Die merkwürdigen 21 gleichgeltenden Complexionen, welche in den Tafeln mit S bezeichnet worden, sind aber von der Art, daß sich in ihnen die Verhältnistheile des Sauer- Wasser- und Kohlenstoffs verhalten wie 1 : 1 : 1. Es dringt sich uns daher die Ansicht auf, diese 21 gleichgeltenden Complexionen, und die ihnen entsprechenden Verhältnisse der Elemente, für das *Grundverhältniß* aller verschiedenen Zuckerarten und diese für bloße Modificationen desselben zu halten. Vielleicht tritt dieses Grundverhältniß in der Natur nie rein hervor, da vielleicht niemals *alle* Bedingungen, von welchen die Bildung einer Pflanzensubstanz in ihrer ursprünglichen Reinheit abhängt, *zugleich* gegeben sind; es kann daher wohl seyn, daß uns nie die Analyse irgend eines Zuckers jenes Grundverhältniß geben wird. Doch ist es sehr merkwürdig, daß *Prout's* Analyse des Zuckers *) vollkommen

*) Nach ihm (*Schweigg. Journ. B. XXII. S. 454.*) besteht nämlich der Zucker aus:

Sauerstoff = 6,66

Wasserstoff = 39,99

Kohlenstoff = 53,33

99,98

und der Harnruhr-Zucker und Milchzucker gaben so ähnliche Resultate, daß er sie alle als wesentlich gleiche Substanzen betrachtet, die nur in ihren äussern Kennzeichen durch geringe Quantitäten einer fremdartigen Substanz ein wenig verschieden sind.

mit den Verhältnissen der Elemente in jenen 21 gleichgeltenden Complexionen übereinstimmt.

Die obigen Werthe für s , w und k in den dort aufgezählten Zuckerarten zeigen ferner, daß die Verhältnistheile des Sauer- und Wasserstoffs stets gleich sind, daß aber der Kohlenstoff um eins kleiner oder gröfser, und bei dem Mannazucker um 2 gröfser ist. Es ist höchst wahrscheinlich, daß es noch viele, in verschiedenen Pflanzensäften enthaltene Zuckerarten giebt, welche denjenigen Complexionen entsprechen, die in den Tafeln *zunächst* an jede der 21 gleichgeltenden Complexionen gränzen. Jede Complexion (blofs mit einigen wenigen Ansnahmen) nämlich, welche einer in den Tafeln mit S bezeichneten vorhergeht und ihr folgt, ist von der Art, daß die Verhältnistheile des Sauer- und Wasserstoffs einander gleich, die des Kohlenstoffs aber um 1 gröfser oder kleiner sind, und so finden sich von 1 Verhältnistheil Sauer- und Wasserstoff an bis zu 11 Verhältnistheilen die dazwischen liegenden von der angezeigten Art. Ausser diesen, zunächst an die 21 gleichgeltenden Complexionen gränzenden sind noch einige wenige von dieser Art, die aber, die 96ste ausgenommen, mit jenen gleichgeltend sind.

Sucht man nun endlich auch die gleichgeltenden Complexionen der mit S bezeichneten für 8 Verhältnistheile, so hat man für

s	die Werthe	1, 2, 3, 4	3_2
w	-	1, 2, 3, 4	3_2
k	-	1, 2, 3, 4	3_2

zu setzen, und man erhält dann folgende 239 gleichgeltende Complexionen:

$d + b + a$	$5d + 2c + b + 3a$	$8d + c + 6b + 7a$
$2d + c + a$	$6d + c + 4b + 5a$	$8d + 3c + 2b + 5a$
$3d + c + b + 2a$	$7d + c + 5b + 6a$	$e + 2b + a$
$4d + c + 2b + 3a$	$7d + 2c + 3b + 5a$	$e + c$
$5d + c + 3b + 4a$	$7d + 3c + b + 4a$	$e + d + 3b + 2a$

$e + d + c + b + a$	$2e + d + c + 3b + 2a$	$3e + 2d + 2c + 4b + 3a$
$e + 2d + 4b + 3a$	$2e + d + 2c + b + a$	$3e + 2d + 3c + 2b + 2a$
$e + 2d + c + 2b + 2a$	$2e + 2d + c + 4b + 3a$	$3e + 2d + 4c + a$
$e + 2d + 2c + a$	$2e + 2d + 3c + a$	$3e + 3d + c + 7b + 5a$
$e + 3d + 5b + 4a$	$2e + 3d + 7b + 5a$	$3e + 3d + 2c + 5b + 4a$
$e + 3d + c + 3b + 3a$	$2e + 3d + c + 5b + 4a$	$3e + 3d + 4c + b + 2a$
$e + 3d + 2c + b + 2a$	$2e + 3d + 2c + 3b + 3a$	$3e + 4d + c + 8b + 6a$
$e + 4d + 6b + 5a$	$2e + 3d + 3c + b + 2a$	$3e + 4d + 2c + 6b + 5a$
$e + 4d + c + 4b + 4a$	$2e + 4d + c + 6b + 5a$	$3e + 4d + 3c + 4b + 4a$
$e + 4d + 2c + 2b + 3a$	$2e + 4d + 3c + 2b + 3a$	$3e + 4d + 4c + 2b + 3a$
$e + 4d + 3c + 2a$	$2e + 5d + c + 7b + 6a$	$3e + 4d + 5c + 2a$
$e + 5d + 7b + 6a$	$2e + 5d + 2c + 5b + 5a$	$3e + 5d + 2c + 7b + 6a$
$e + 5d + c + 5b + 5a$	$2e + 5d + 3c + 3b + 4a$	$3e + 5d + 3c + 5b + 5a$
$e + 5d + 2c + 3b + 4a$	$2e + 5d + 4c + b + 3a$	$3e + 5d + 4c + 3b + 4a$
$e + 5d + 3c + b + 3a$	$2e + 6d + c + 8b + 7a$	$3e + 5d + 5c + b + 3a$
$e + 6d + 8b + 7a$	$2e + 6d + 3c + 4b + 5a$	$3e + 6d + 2c + 8b + 7a$
$e + 6d + c + 6b + 6a$	$2e + 6d + 5c + 3a$	$3e + 6d + 4c + 4b + 5a$
$e + 6d + 2c + 4b + 5a$	$2e + 7d + 2c + 7b + 7a$	$3e + 6d + 5c + 2b + 4a$
$e + 6d + 3c + 2b + 4a$	$2e + 7d + 3c + 5b + 6a$	$3e + 7d + 3c + 7b + 7a$
$e + 6d + 4c + 3a$	$2e + 7d + 4c + 3b + 5a$	$3e + 7d + 4c + 5b + 6a$
$e + 7d + c + 7b + 7a$	$2e + 7d + 5c + b + 4a$	$3e + 7d + 5c + 3b + 5a$
$e + 7d + 2c + 5b + 6a$	$2e + 8d + 3c + 6b + 7a$	$3e + 7d + 6c + b + 4a$
$e + 7d + 3c + 3b + 5a$	$2e + 8d + 5c + 2b + 5a$	$3e + 8d + 3c + 8b + 8a$
$e + 7d + 4c + b + 4a$	$3e + c + 4b + 2a$	$3e + 8d + 4c + 6b + 7a$
$e + 8d + c + 8b + 8a$	$3e + 2c + 2b + a$	$3e + 8d + 5c + 4b + 6a$
$e + 8d + 2c + 6b + 7a$	$3e + d + 7b + 4a$	$3e + 8d + 6c + 2b + 5a$
$e + 8d + 3c + 4b + 6a$	$3e + d + c + 5b + 3a$	$3e + 8d + 7c + 4a$
$e + 8d + 4c + 2b + 5a$	$3e + d + 2c + 3b + 2a$	$4e + c + 6b + 3a$
$e + 8d + 5c + 4a$	$3e + d + 3c + b + a$	$4e + 3c + 2b + a$
$2e + c + 2b + a$	$3e + 2d + 8b + 5a$	$4e + d + c + 7b + 4a$
$2e + d + 5b + 3a$	$3e + 2d + c + 6b + 4a$	$4e + d + 2c + 5b + 3a$

$4e + d + 3c + 3b + 2a$
 $4e + d + 4c + b + a$
 $4e + 2d + c + 8b + 5a$
 $4e + 2d + 3c + 4b + 3a$
 $4e + 2d + 5c + a$
 $4e + 3d + 2c + 7b + 5a$
 $4e + 3d + 3c + 5b + 4a$
 $4e + 3d + 4c + 3b + 3a$
 $4e + 3d + 5c + b + 2a$
 $4e + 4d + 3c + 6b + 5a$
 $4e + 4d + 5c + 2b + 3a$
 $4e + 5d + 3c + 7b + 6a$
 $4e + 5d + 4c + 5b + 5a$
 $4e + 5d + 5c + 3b + 4a$
 $4e + 5d + 6c + b + 3a$
 $4e + 6d + 3c + 8b + 7a$
 $4e + 6d + 5c + 4b + 5a$
 $4e + 6d + 7c + 3a$
 $4e + 7d + 4c + 7b + 7a$
 $4e + 7d + 5c + 5b + 6a$
 $4e + 7d + 6c + 3b + 5a$
 $4e + 7d + 7c + b + 4a$
 $4e + 8d + 5c + 6b + 7a$
 $4e + 8d + 7c + 2b + 5a$
 $5e + c + 8b + 4a$
 $5e + 2c + 6b + 3a$
 $5e + 3c + 4b + 2a$
 $5e + 4c + 2b + a$
 $5e + d + 2c + 7b + 4a$
 $5e + d + 3c + 5b + 3a$
 $5e + d + 4c + 3b + 2a$

$5e + d + 5c + b + a$
 $5e + 2d + 2c + 8b + 5a$
 $5e + 2d + 3c + 6b + 4a$
 $5e + 2d + 4c + 4b + 3a$
 $5e + 2d + 5c + 2b + 2a$
 $5e + 2d + 6c + a$
 $5e + 3d + 3c + 7b + 5a$
 $5e + 3d + 4c + 5b + 4a$
 $5e + 3d + 5c + 3b + 3a$
 $5e + 3d + 6c + b + 2a$
 $5e + 4d + 3c + 8b + 6a$
 $5e + 4d + 4c + 6b + 5a$
 $5e + 4d + 5c + 4b + 4a$
 $5e + 4d + 6c + 2b + 3a$
 $5e + 4d + 7c + 2a$
 $5e + 5d + 4c + 7b + 6a$
 $5e + 5d + 6c + 3b + 4a$
 $5e + 5d + 7c + b + 3a$
 $5e + 6d + 4c + 8b + 7a$
 $5e + 6d + 5c + 6b + 6a$
 $5e + 6d + 6c + 4b + 5a$
 $5e + 6d + 7c + 2b + 4a$
 $5e + 6d + 8c + 3a$
 $5e + 7d + 5c + 7b + 7a$
 $5e + 7d + 6c + 5b + 6a$
 $5e + 7d + 7c + 3b + 5a$
 $5e + 7d + 8c + b + 4a$
 $5e + 8d + 5c + 8b + 8a$
 $5e + 8d + 6c + 6b + 7a$
 $5e + 8d + 7c + 4b + 6a$
 $5e + 8d + 8c + 2b + 5a$

$6e + 5c + 2b + a$
 $6e + d + 3c + 7b + 4a$
 $6e + d + 4c + 5b + 3a$
 $6e + d + 5c + 3b + 2a$
 $6e + d + 6c + b + a$
 $6e + 2d + 3c + 8b + 5a$
 $6e + 2d + 5c + 4b + 3a$
 $6e + 2d + 7c + a$
 $6e + 3d + 4c + 7b + 5a$
 $6e + 3d + 5c + 5b + 4a$
 $6e + 3d + 7c + b + 2a$
 $6e + 4d + 5c + 6b + 5a$
 $6e + 4d + 7c + 2b + 3a$
 $6e + 5d + 5c + 7b + 6a$
 $6e + 5d + 6c + 5b + 5a$
 $6e + 5d + 7c + 3b + 4a$
 $6e + 5d + 8c + b + 3a$
 $6e + 6d + 5c + 8b + 7a$
 $6e + 6d + 7c + 4b + 5a$
 $6e + 7d + 6c + 7b + 7a$
 $6e + 7d + 7c + 5b + 6a$
 $6e + 7d + 8c + 3b + 5a$
 $6e + 8d + 7c + 6b + 7a$
 $7e + 3c + 8b + 4a$
 $7e + 4c + 6b + 3a$
 $7e + 5c + 4b + 2a$
 $7e + 6c + 2b + a$
 $7e + d + 4c + 7b + 4a$
 $7e + d + 5c + 5b + 3a$
 $7e + d + 6c + 3b + 2a$
 $7e + d + 7c + b + a$

$7e + 2d + 4c + 8b + 5a$	$7e + 5d + 6c + 7b + 6a$	$8e + d + 7c + 3b + 2a$
$7e + 2d + 5c + 6b + 4a$	$7e + 5d + 7c + 5b + 5a$	$8e + d + 8c + b + a$
$7e + 2d + 6c + 4b + 3a$	$7e + 5d + 8c + 3b + 4a$	$8e + 2d + 5c + 8b + 5a$
$7e + 2d + 7c + 2b + 2a$	$7e + 6d + 6c + 8b + 7a$	$8e + 2d + 7c + 4b + 3a$
$7e + 2d + 8c + a$	$7e + 6d + 7c + 6b + 6a$	$8e + 3d + 6c + 7b + 5a$
$7e + 3d + 5c + 7b + 5a$	$7e + 6d + 8c + 4b + 5a$	$8e + 3d + 7c + 5b + 4a$
$7e + 3d + 6c + 5b + 4a$	$7e + 7d + 8c + 5b + 6a$	$8e + 3d + 8c + 3b + 3a$
$7e + 3d + 7c + 3b + 3a$	$7e + 8d + 7c + 8b + 8a$	$8e + 4d + 7c + 6b + 5a$
$7e + 3d + 8c + b + 2a$	$7e + 8d + 8c + 6b + 7a$	$8e + 5d + 7c + 7b + 6a$
$7e + 4d + 5c + 8b + 6a$	$8e + 5c + 6b + 3a$	$8e + 5d + 8c + 5b + 5a$
$7e + 4d + 6c + 6b + 5a$	$8e + 7c + 2b + a$	$8e + 6d + 7c + 8b + 7a$
$7e + 4d + 7c + 4b + 4a$	$8e + d + 5c + 7b + 4a$	$8e + 7d + 8c + 7b + 7a$
$7e + 4d + 8c + 2b + 3a$	$8e + d + 6c + 5b + 3a$	

Es ist leicht einzusehen, daß nur allein das Grundverhältniß des Zuckers eine so sehr große Anzahl gleichgeltender Complexioneu zulassen könne. Denn da diese Substanz in ihrer ursprünglichen Reinheit genommen *gleiche* Verhältnistheile der Elemente enthält, so muß für eine gewisse Gränze derselben die Anzahl der Werthe für s , w und k größer seyn, als bei *irgend einem andern* Verhältnisse der Elemente; je größer aber die Anzahl der Werthe für s , w und k ist, desto mehr gleichgeltende Complexionen sind möglich.

Sofern aber, und es scheint nicht zu bezweifeln, der Zucker mit allen seinen Abänderungen unter allen nähern Bestandtheilen der Pflanzen derjenige ist, welcher am allgemeinsten in dem Pflanzenreiche verbreitet ist: so muß uns der Umstand, daß gerade diese Substanz aus der größtmöglichen Anzahl gleichgeltender Complexionen gebildet werden kann, auf eine gewisse Beziehung aufmerksam machen, in der die Pflanzensubstanzen zu der Anzahl der ihnen entsprechenden Complexionen stehen möchten. Es scheint mir nämlich sehr wahrscheinlich, daß eine Pflanzensubstanz je mehr sie in der Natur verbreitet ist, desto mehr gleichgeltende Complexionen zulassen müsse. Wenn unsere Grundan-

sicht, auf der unser ganzes Gebäude beruht, daß die Pflanzenkörper aus binären Verbindungen der Elemente sich bilden, die richtige ist, so kann dieß auch gar nicht anders seyn. Die Natur wird denjenigen Pflanzensubstanzen, welche sie unter den verschiedensten Umständen, unter mancherlei Himmelsstrichen, aus den verschiedenartigsten Nahrungsmitteln u. s. w. hervorbringen muß, ein solches Mischungsverhältniß der Elemente gegeben haben, daß dieß auf die mannichfaltigste Weise aus den binären Verbindungen geschehen könne.

Wir sehen demnach ein, daß der Zucker, welcher im Pflanzenreiche überall hervortritt, welcher als erstes Product des Keimens den ganzen Vegetationsproceß einzuleiten scheint, in seiner ursprünglichen Reinheit auf keine andere Weise zusammengesetzt seyn könne, als aus gleichen Verhältnistheilen Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlenstoff. Es ist ferner leicht einzusehen, daß alle diejenigen Pflanzensubstanzen, welche sich in ihrer Zusammensetzung dem Zucker nähern, d. h. welche den Verhältnissen 1 : 1 : 1 der Elemente nahe kommen, die meisten gleichgeltenden Complexionen zulassen; mithin, nächst dem Zucker am all- gemein verbreitesten vorkommen werden. Daß je mehr die Verhältnistheile der Elemente der Gleichheit sich nähern, desto größer die Anzahl der gleichgeltenden Complexionen wird, dieß ist ein vollkommen begründetes und klar vor Augen liegendes Gesetz; daß aber die Substanzen, welche viele gleichgeltende Complexionen zulassen, häufiger in der Natur vorkommen als andere, welche nicht so viele zulassen, dieses ist freilich bloß Vermuthung, die indess durch die folgenden weiteren Untersuchungen einige Wahrscheinlichkeit mehr erhält.

Ich kehre nun nach diesen allgemeinen Betrachtungen wieder zu den einzelnen Pflanzenstoffen zurück.

S t ä r k e m e h l.

Berzelius *) verbrannte 0,555 einer Verbindung aus Bleioxyd und

*) a. a. O. 272.

Stärkemehl, welche von dem letztern 0,4 enthält, und erhielt 0,239 Wasser und 0,643 Kohlensäure. Diefes giebt für die Zusammensetzung des Stärkemehls

Sauerstoff	=	49,52
Wasserstoff	=	6,64
Kohlenstoff	=	43,84
		100,00

Nach einer andern Analyse dieses Chemikers mit unverbundenem Stärkemehl ist seine Zusammensetzung

Sauerstoff	=	49,72
Wasserstoff	=	6,68
Kohlenstoff	=	43,60
		100,00

Thenard und *Gay-Lussac* *) stimmen fast ganz genau hiermit überein; *von Saussure* **) weicht aber etwas ab.

Diese Verhältnisse nähern sich den gleichgeltenden Complexionen 368, 451, 563, 754, und noch mehr: 444, 633, 747, 826, in welchen letzteren ist

Sauerstoff	=	49,48
Wasserstoff	=	7,21
Kohlenstoff	=	43,31
		100,00

Um nun die gleichgeltenden Complexionen für 8 Verhältnistheile aufzufinden, hat man für

s	die Werthe	6, 12, 18, 24
w	-	7, 14, 21, 28
k	-	7, 14, 21, 28

*) a. a. O. 292.

**) a. a. O. 135.

zu setzen, und es ergeben sich dann folgende 35 gleichgeltende Complexionen:

$4d + 3b + 3a$	$3e + 5d + 3c + 3b + 3a$	$6e + 5d + 4c + 6b + 4a$
$5d + 2c + 2a$	$3e + 6d + 5c + 2a$	$6e + 7d + 8c + 2a$
$e + 3d + c + 2b + 2a$	$4e + 3d + 2c + 5b + 3a$	$7e + 5c + 2b$
$e + 7d + c + 5b + 5a$	$4e + 7d + 2c + 8b + 6a$	$7e + 3d + 3c + 8b + 4a$
$e + 8d + 3c + 2b + 4a$	$4e + 8d + 4c + 5b + 5a$	$7e + 4d + 5c + 5b + 3a$
$2e + d + 4b + 2a$	$5e + d + c + 7b + 3a$	$7e + 5d + 7c + 2b + 2a$
$2e + 2d + 2c + b + a$	$5e + 2d + 3c + 4b + 2a$	$7e + 8d + 5c + 8b + 6a$
$2e + 5d + 7b + 5a$	$5e + 3d + 5c + b + a$	$8e + 2d + 4c + 7b + 3a$
$2e + 7d + 4c + b + 3a$	$5e + 6d + 3c + 7b + 5a$	$8e + 3d + 6c + 4b + 2a$
$3e + c + 3b + a$	$5e + 7d + 5c + 4b + 4a$	$8e + 4d + 8c + b + a$
$3e + d + 3c$	$5e + 8d + 7c + b + 3a$	$8e + 7d + 6c + 7b + 5a$
$3e + 4d + c + 6b + 4a$	$6e + d + 4c + 3b + a$	

Auch die Nummern 178, 181, 187 mit ihren gleichgeltenden Complexionen und noch mehrere andere in den Tafeln nähern sich mehr oder weniger dem Mischungsverhältnisse des Stärkmehls. Da die Elemente in dieser Substanz den Verhältnissen 1 : 1 : 1 ziemlich nahe kommen, so muß dem gemäß, was oben bemerkt worden, eine verhältnißmäßig große Anzahl gleichgeltender Complexionen Statt finden, welches sich auch bestätigt hat. Offenbar ist aber auch das Amylum ein näherer Pflanzenbestandtheil, der, da er in den Saamen aller Getreidearten vorkommt, ziemlich häufig verbreitet ist. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die verschiedenen den obigen Verhältnissen der Elemente sich nähernden Complexionen, den verschiedenen Arten des Stärkmehls entsprechen, und daß es auch für diese Pflanzensubstanz ein gewisses *Grundverhältniß* giebt. Allein, um hierüber mit einiger Gewißheit entscheiden zu können, müssen erst mehrere Stärkmehlarten aus verschiedenen Saamen der Analyse unterworfen worden seyn.

A r a b i s c h e s G u m m i.

Berzelius *) verbrannte 0,4 arabisches Gummi, und erhielt 0,231 Wasser und 0,6196 Kohlensäure. Diefß giebt für das arabische Gummi die Zusammensetzung:

Sauerstoff	=	51,33
Wasserstoff	=	6,42
Kohlenstoff	=	42,25
		100,00

Nach einer andern Analyse dieses Chemikers ist sie

Sauerstoff	=	51,55
Wasserstoff	=	6,38
Kohlenstoff	=	42,07
		100,00 **)

Diese Verhältnisse nähern sich den gleichgeltenden Complexionen 459, 646, 762 und noch mehr 448, 636, 830, in welchen ist

*) a. a. O. 270.

**) *Thenard* und *Gäy - Lussac* (a. a. O. 290.) stimmen ziemlich nahe mit dieser Zusammensetzung überein. *Von Saussure* (a. a. O. 144.) weicht aber etwas ab, und giebt noch ausserdem 0,44 Proc. Stickstoff an. Für diesen Stickstoffgehalt sprechen ausserdem die Versuche *Cruikshank's* (*Rollo on Diabetes* p.452.), der aus der durch trockne Destillation des arabischen Gummi und des Gummi-Tragant erhaltenen brenzlichen Schleimsäure, mittelst Kalk Ammoniak entwickelte. Auch *Berzelius* fand bei seiner Analyse Spuren von Salpetersäure, deren Entstehung er einer geringen Menge Pflanzenweissstoff im Gummi zuschreibt. *Vauquelin* (*Gilb. n. Ann.* B. XII. S. 140.) schließt aus seinen Versuchen, daß der Schleim aus Leinsaamen und wahrscheinlich aller Pflanzenschleim größtentheils aus Gummi besteht, und daß jener von diesem durch die Gegenwart einer bedeutenden Menge Stickstoff sich unterscheidet. Nach diesem allen führe ich das reine Gummi unter den Pflanzenkörpern von vegetabilischer Mischung auf.

Sauerstoff = 50,45

Wasserstoff = 6,31

Kohlenstoff = 43,24

100,00

Um nun die gleichgeltenden Complexionen für 8 Verhältnistheile aufzufinden, hat man für

s die Werthe 7, 14, 21, 28

w - - 7, 14, 21, 28

k - - 8, 16, 24, 32

zu setzen, und es ergeben sich dann folgende 29 gleichgeltende Complexionen:

4d + 4b + 3a	3e + d + 3c + b	5e + 7d + 5c + 7b + 4a
5d + 2c + b + 2a	3e + 4d + c + 8b + 4a	5e + 8d + 7c + 4b + 3a
e + 3d + c + 3b + 2a	3e + 5d + 3c + 5b + 3a	6e + d + 4c + 5b + a
e + 4d + 3c + a	3e + 6d + 5c + 2b + 2a	6e + 7d + 8c + 3b + 2a
e + 7d + c + 7b + 5a	4e + 3d + 2c + 7b + 3a	7e + 5c + 4b
e + 8d + 3c + 4b + 4a	4e + 5d + 6c + b + a	7e + 4d + 5c + 8b + 3a
2e + d + 5b + 2a	4e + 8d + 4c + 8b + 5a	5e + 5d + 7c + 5b + 2a
2e + 2d + 2c + 2b + a	5e + 2d + 3c + 6b + 2a	8e + 3d + 6c + 7b + 2a
2e + 7d + 4c + 3b + 3a	5e + 3d + 5c + 3b + a	8e + 4d + 8c + 4b + a
3e + c + 4b + a	5e + 4d + 7c	

Das Gummi ist eine Substanz, welche sich am meisten dem Zucker nähert. Die verschiedenen Complexionen, deren Verhältnisse der Elemente dem Gummi sich nähern, entsprechen ohne Zweifel den verschiedenen Gummi- und Pflanzenschleimarten.

Holzfasern vom Eichenholz.

Nach Gay-Lussac's und Thenard's Analyse *) besteht das Eichenholz aus:

*) a. a. O. 295.

Sauerstoff	=	41,78
Wasserstoff	=	5,69
Kohlenstoff	=	52,53
		100,00

Diese Verhältnisse kommen am nächsten den beiden gleichgeltenden Complexionen 186 und 302, nach welchen ist

Sauerstoff	=	42,11
Wasserstoff	=	5,26
Kohlenstoff	=	52,63
		100,00

Um nun die gleichgeltenden Complexionen für 8 Verhältnistheile aufzufinden, hat man für

s	die Werthe	3, 6, 9, 12, 15, 18
w	-	3, 6, 9, 12, 15, 18
k	-	5, 10, 15, 20, 25, 30

zu setzen, und man erhält dann folgende 8 gleichgeltende Complexionen:

$3d + c + b$	$e + d + 3b$	$e + 7d + 2c + 5b$
$5e + 5b + a$	$e + 4d + c + 4b$	$2e + 5d + c + 7b$
$8d + c + 6b + a$	$e + 6d + 8b + a$	

H o l z f a s e r v o m B u c h e n h o l z.

Nach der Analyse von *Gay-Lussac* und *Thenard**) besteht das Büchenholz aus:

Sauerstoff	=	42,73
Wasserstoff	=	5,82
Kohlenstoff	=	51,45
		100,00

Diese Verhältnisse kommen am nächsten der Complexion 446, nach welcher ist

Sauer-

*) a. a. O. 297.

Sauerstoff	=	43,01
Wasserstoff	=	5,38
Kohlenstoff	=	51,61
		100,00

Um nun die gleichgeltenden Complexionen für 8 Verhältnistheile aufzufinden, hat man für

s die Werthe 5, 10, 15, 20

w - - - 5, 10, 15, 20

k - - - 8, 16, 24, 32

zu setzen, und man erhält dann folgende 7 gleichgeltende Complexionen:

$4d + 4b + a$	$e + 7d + c + 7b + a$	$2e + d + 5b$
$5d + 2c + b$	$e + 8d + 3c + 4b$	$3e + 4d + c + 8b$
$e + 3d + c + 3b$		

So wie die Holzfaser aus Eichenholz und Buchenholz sich etwas verschieden in ihrer Grundmischung zeigt, so ist auch zu vermuthen, daß die aus anderen Holzarten in den Verhältnissen der Elemente variire. Wir finden, daß in den beiden obigen Pflanzenkörpern die Verhältnistheile des Sauer- und Wasserstoffs einander gleich sind, der Kohlenstoff aber mehr als in den bisher betrachteten Substanzen, hervortritt.

Ich gehe nun über zu den vegetabilischen Säuren, und fange die Untersuchung mit der Citronensäure an, welche mit dem Zucker in besonderer Beziehung zu stehen scheint.

C i t r o n e n s ä u r e.

Berzelius*) erhielt, als er 1 Th. citronensaures Bleioxyd, das 0,35014 Säure enthielt, verbrannte, 0,1145 Wasser und 0,533 Kohlensäure. Hieraus ergiebt sich, daß die Citronensäure besteht aus:

*) a. a. O. 93.

Sauerstoff	=	54,89
Wasserstoff	=	3,63
Kohlenstoff	=	41,48
		100,00

Gay-Lussac und *Thenard**) weichen beträchtlich hievon ab. Es ist schwer die Ursache dieser Abweichung anzugeben; es sind aber Gründe vorhanden anzunehmen, daß *Berzelius's* Analyse der Wahrheit am nächsten kommt.

Diese Verhältnisse kommen den gleichgeltenden Complexionen 63, 66, 139, 211, 250, 330, 410 am nächsten, in welchen ist

Sauerstoff	=	55,17
Wasserstoff	=	3,45
Kohlenstoff	=	41,38
		100,00

Um nun die gleichgeltenden Complexionen für 8 Verhältnistheile aufzufinden, hat man für

s die Werthe 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
 w - - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
 k - - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

zu setzen, und es ergeben sich dann folgende 54 gleichgeltende Complexionen:

d + 3b + a	7d + 6c + 3b + a	e + 3d + 2c + 8b + 2a
d + c	8d + 7c + 3b + a	e + 3d + 3c + 5b + a
2d + c + 3b + a	e + 5b + a	e + 3d + 4c + 2b
3d + c + 6b + 2a	e + c + 2b	e + 4d + 3c + 8b + 2a
3d + 2c + 3b + a	e + d + 8b + 2a	e + 4d + 4c + 5b + a
4d + 3c + 3b + a	e + d + c + 5b + a	e + 4d + 5c + 2b
5d + 3c + 6b + 2a	e + d + 2c + 2b	e + 5d + 4c + 8b + 2a
5d + 4c + 3b + a	e + 2d + c + 8b + 2a	e + 5d + 5c + 5b + a
6d + 5c + 3b + a	e + 2d + 2c + 5b + a	e + 5d + 6c + 2b
7d + 5c + 6b + 2a	e + 2d + 3c + 2b	e + 6d + 5c + 8b + 2a

*) a. a. O. 307.

$e + 6d + 6c + 5b + a$	$2e + d + 2c + 7b + a$	$2e + 6d + 7c + 7b + a$
$e + 6d + 7c + 2b$	$2e + d + 3c + 4b$	$2e + 7d + 8c + 7b + a$
$e + 7d + 6c + 8b + 2a$	$2e + 2d + 3c + 7b + a$	$3e + d + 4c + 6b$
$e + 7d + 7c + 5b + a$	$2e + 3d + 4c + 7b + a$	$3e + 2d + 5c + 6b$
$e + 7d + 8c + 2b$	$2e + 3d + 5c + 4b$	$3e + 4d + 7c + 6b$
$e + 8d + 7c + 8b + 2a$	$2e + 4d + 5c + 7b + a$	$3e + 5d + 8c + 6b$
$e + 8d + 8c + 5b + a$	$2e + 5d + 6c + 7b + a$	$4e + d + 5c + 8b$
$2e + c + 7b + a$	$2e + 5d + 7c + 4b$	$4e + 3d + 7c + 8b$

Es ist sehr merkwürdig, daß nächst dem Grundverhältnisse des Zuckers, die Citronensäure die größte Anzahl gleichgeltender Complexionen enthält. Es ist aber auch bekannt, daß man diese Säure nicht bloß im Citronensaft, sondern auch im Saft mehrerer säuerlichen Früchte findet. Vielleicht ist sie durchgängig das zunächst der Zuckerbildung vorangehende Product des Vegetationsprocesses. Wenigstens findet man die Citronensäure in vorzüglich reichlicher Menge im Saft der unreifen Weintrauben; sie verschwindet aber, so wie mit der Wärme die Reifung der Trauben fortrückt; denn in dem Saft der ganz reifen Trauben sind keine Spuren davon anzutreffen; dagegen tritt an ihre Stelle krystallisirbarer und flüssiger Zucker und ein wenig Gummi, welche durch den Vegetationsprocess aus jener Säure gebildet wurden*).

Wir finden in den Tafeln eine ziemlich große Anzahl Complexionen, welche sich mehr oder weniger der Zusammensetzung der Citronensäure nähern. Man kann daher mit vieler Wahrscheinlichkeit vermuthen, daß alle diese Complexionen Modificationen der Citronensäure sind, welche die Zwischenglieder zwischen ihr und dem Zucker und andern im Vegetationsprocess angränzenden nähern Pflanzenbestandtheilen bilden. Es ist indess zu bezweifeln, daß es uns je gelingen werde, diese unmerklichen Abstufungen und Uebergänge durch die Analyse darzuthun; denn es kann

*) S. Proust in *Gehlen's Journal für Chem. und Phys.* B. II. S. 93 — 95.

leicht seyn, daß sie, so wie sie einmal aus der lebendigen Pflanze ausgeschieden worden, stets nur unter der Form der Citronensäure auftreten, und daher die Modificationen, welche in der organisirten Pflanze Statt finden, ausserhalb derselben verschwinden. Da wir bei den Zuckerarten ein gewisses Grundverhältniß aufgefunden haben, das die größte Anzahl gleichgeltender Complexionen zuläßt; so ist auch zu vermuthen, daß bei den verschiedenen Arten der Citronensäure ein ähnliches Grundverhältniß Statt finde. Wenn es erlaubt ist, aus der größten Anzahl gleichgeltender Complexionen für eine gewisse Gruppe einander nahe komrender Verhältnisse der Elemente, auf dieses Grundverhältniß zu schließen: so könnte man annehmen, daß die oben aufgeführten 54 gleichgeltenden Complexionen diesem Grundverhältnisse entsprechen, da es nicht wahrscheinlich ist, daß irgend ein anderes Verhältniß, als das, welches diesen Complexionen zum Grunde liegt, eine so große Anzahl geben werde. Für 3 Verhältnistheile, so weit unsere Tafeln gehen, ist dieß wenigstens nicht der Fall, da nur noch ein einziges Mal 7 gleichgeltende Complexionen vorkommen, die ebenfalls 54 gleichgeltende Complexionen geben, in welchen aber die Verhältnisse der Elemente von den obigen ganz abweichen.

Weinsteinsäure.

Berzelius *) verbrannte 1,3333 weinsteinsaures Bleioxyd, die 0,5 Säure enthalten und erhielt 0,1615 Wasser und 0,6575 Kohlensäure. Dieß giebt für die Zusammensetzung der Weinsteinsäure

Sauerstoff	=	60,52
Wasserstoff	=	3,59
Kohlenstoff	=	35,89
		100,00

Hiermit stimmt sehr nahe die von *Berzelius* berichtigte Analyse *Gay-Lussac's* und *Thenard's* (Rech. S. 305. und *Thoms. Ann.* Vol. V. P. 96.)

*) a. a. O. S. 95.

überein. *Döbereiner* (*Schweigg. Journ. B. XVII. S. 374.*) weicht aber etwas ab.

Diese Verhältnisse nähern sich den gleichgeltenden Complexionen 64, 142, 213, 251, 412, in welchen ist

Sauerstoff	=	59,70
Wasserstoff	=	4,48
Kohlenstoff	=	35,82
		100,00

Um nun die gleichgeltenden Complexionen für 8 Verhältnistheile aufzufinden, haben wir für

s	die Werthe	5, 10, 15, 20, 25, 30
w	-	3, 6, 9, 12, 15, 18
k	-	4, 8, 12, 16, 20, 24

zu setzen, und es ergeben sich dann folgende 41 gleichgeltende Complexionen:

d + 3b + 2a	e + 5d + 5c + 5b + 5a	3e + 5c
2d + 2c + a	e + 6d + 5c + 8b + 7a	3e + d + 5c + 3b + 2a
3d + 2c + 3b + 3a	e + 6d + 7c + 2b + 4a	3e + 2d + 5c + 6b + 4a
4d + 2c + 6b + 5a	e + 7d + 7c + 5b + 6a	3e + 2d + 7c + a
5d + 4c + 3b + 4a	e + 8d + 7c + 8b + 8a	3e + 3d + 7c + 3b + 3a
7d + 6c + 3b + 5a	2e + d + 2c + 7b + 4a	3e + 4d + 7c + 6b + 5a
8d + 6c + 6b + 7a	2e + d + 4c + b + a	4e + 6c + 2b + a
e + c + 2b + a	2e + 2d + 4c + 4b + 3a	4e + d + 6c + 5b + 3a
e + d + c + 5b + 3a	2e + 3d + 4c + 7b + 5a	4e + 2d + 6c + 8b + 5a
e + 2d + c + 8b + 5a	2e + 3d + 6c + b + 2a	4e + 3d + 8c + 5b + 4a
e + 2d + 3c + 2b + 2a	2e + 5d + 6c + 7b + 6a	5e + 7c + 4b + 2a
e + 3d + 3c + 5b + 4a	2e + 5d + 8c + b + 3a	5e + d + 7c + 7b + 4a
e + 4d + 3c + 8b + 6a	2e + 6d + 8c + 4b + 5a	6e + 8c + 6b + 3a
e + 4d + 5c + 2b + 3a	2e + 7d + 8c + 7b + 7a	

Ueberdies findet man in den Tafeln noch eine ziemlich große Anzahl Complexionen, welche sich mehr oder weniger der Zusammensetzung der Weinsteinsäure nähern. Die beiden gleichgeltenden 222 und 535 kommen den obigen Verhältnissen der Elemente noch viel näher als die, welche ich für diese Säure gesetzt habe; da aber die Weinsteinsäure sehr verbreitet in der Natur ist, indem sie ausser im Weinstein in mehreren Obst- und Beerenarten und verschiedenen andern Pflanzen vorkommt: so habe ich die größte Anzahl gleichgeltender Complexionen nach den oben angegebenen Gründen, als das Grundverhältniß derselben angenommen. Die angränzenden Complexionen entsprechen wahrscheinlich den unmerklichen Abstufungen und Uebergängen der Weinsteinsäure in andere nähere Pflanzenbestandtheile.

S c h l e i m s ä u r e .

Berzelius*) verbrannte 1 Th. schleimsaures Bleioxyd, welches 0,4833 Säure enthält, und erhielt 0,21 Wasser und 0,894 Kohlensäure. Diefes giebt für die Zusammensetzung der Schleimsäure:

Sauerstoff	=	61,65
Wasserstoff	=	4,83
Kohlenstoff	=	33,52
		100,00

Die französischen Chemiker**) weichen nicht sehr viel von dieser Analyse ab.

Die Zusammensetzung dieser Säure kommt der Weinsteinsäure so nahe***), daß es schwer ist, mit Gewißheit zu bestimmen, welche

*) a. a. O. S. 180.

**) a. a. O. S. 298.

***) Da jedoch das Verhalten beider Säuren zu den Basen sehr verschieden sich zeigt, so glaubt Berzelius, daß die Anordnung ihrer Atome sehr verschieden seyn müsse (arrangement of their atoms is very different).

Complexionen dieser und welche jener zukommen. In den Tafeln findet man eine sehr große Anzahl Complexionen, von denen die Verhältnisse der Elemente sich mehr oder weniger der Zusammensetzung der Schleimsäure nähern. Unter allen kommt die Complexion 413 am nächsten; doch weichen auch die gleichgeltenden Complexionen 141, 215, 332, 527 nicht sehr beträchtlich ab. In jener sind die Verhältnisse der Elemente:

Sauerstoff	=	61,54
Wasserstoff	=	4,89
Kohlenstoff	=	33,57
		100,00

in diesen

Sauerstoff	=	60,95
Wasserstoff	=	4,76
Kohlenstoff	=	34,29
		100,00

Um die gleichgeltenden Complexionen für 8 Verhältnistheile aufzufinden, hat man im ersten Falle für

s	die Werthe	11, 22
w	-	7, 14
k	-	8, 16

und im zweiten Fall für

s	die Werthe	8, 16, 24, 32
w	-	5, 10, 15, 20
k	-	6, 12, 18, 24

zu setzen, und man erhält erstens folgende 18 gleichgeltende Complexionen:

$2d + 6b + 5a$	$7d + 6c + 3b + 7a$	$e + 4d + 3c + 8b + 8a$
$3d + 2c + 3b + 4a$	$e + d + c + 5b + 4a$	$e + 5d + 5c + 5b + 7a$
$4d + 4c + 3a$	$e + 2d + 3c + 2b + 3a$	$e + 6d + 7c + 2b + 6a$

$2e + 2c + 4b + 3a$	$2e + 5d + 8c + b + 5a$	$3e + 3d + 7c + 3b + 5a$
$2e + d + 4c + b + 2a$	$3e + 5c + a$	$4e + d + 6c + 5b + 5a$
$2e + 3d + 4c + 7b + 7a$	$3e + 2d + 5c + 6b + 6a$	$5e + 7c + 4b + 4a$
und zweitens folgende 25 gleichgeltende Complexionen:		
$2d + c + 3b + 3a$	$e + 4d + 5c + 2b + 4a$	$3e + 3c + 6b + 4a$
$3d + 3c + 2a$	$e + 5d + 4c + 8b + 8a$	$3e + d + 5c + 3b + 3a$
$5d + 4c + 3b + 5a$	$e + 6d + 6c + 5b + 7a$	$3e + 2d + 7c + 2a$
$7d + 5c + 6b + 8a$	$e + 7d + 8c + 2b + 6a$	$3e + 4d + 8c + 3b + 5a$
$8d + 7c + 3b + 7a$	$2e + 3c + b + a$	$4e + d + 5c + 8b + 6a$
$e + 5b + 3a$	$2e + d + 2c + 7b + 5a$	$4e + 2d + 7c + 5b + 5a$
$e + d + 2c + 2b + 2a$	$2e + 3d + 6c + b + 3a$	$5e + 6c + 7b + 5a$
$e + 2d + c + 8b + 6a$	$2e + 4d + 5c + 7b + 7a$	$5e + d + 8c + 4b + 4a$
$e + 3d + 3c + 5b + 5a$	$2e + 5d + 7c + 4b + 6a$	

Es ist noch nicht ausgemacht, ob Schleimsäure als solche in organischen Substanzen schon enthalten, oder ob sie bloß mittelst Salpetersäure aus dem Milchzucker, dem Gummi u. s. w. erzeugt wird.

Essigsäure.

Berzelius *) verbrannte 1,06 essigsaures Bleioxyd, welche 0,333 Säure enthalten, und erhielt 0,18 Wasser und 0,574 Kohlensäure. Diefes giebt für die Essigsäure die Zusammensetzung

Sauerstoff	=	46,98
Wasserstoff	=	6,01
Kohlenstoff	=	47,01
		100,00

Thenard's und *Gay-Lussac's* Analyse **) weicht etwas hievon ab.

Diese Verhältnisse kommen den gleichgeltenden Complexionen 120, 310, 447 am nächsten, in welchen ist

		Sauer-
*) a. a. O. S. 176.		
**) a. a. O. S. 311.		

Sauerstoff	=	47,06
Wasserstoff	=	5,88
Kohlenstoff	=	47,06
		100,00

Um nun die gleichgeltenden Complexionen für 8 Verhältnistheile aufzufinden, hat man für

s	die Werthe	3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24
w	-	3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24
k	-	4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32

zu setzen, und es ergeben sich dann überhaupt folgende 36 gleichgeltende Complexionen:

$2d + 2b + a$	$2e + 3d + 7b + 2a$	$4e + 8b + a$
$5d + 2c + b + a$	$2e + 4d + 2c + 4b + a$	$4e + d + 2c + 5b$
$7d + 2c + 3b + 2a$	$2e + 5d + 4c + b$	$4e + 3d + 2c + 7b + a$
$8d + 4c + a$	$2e + 7d + 4c + 3b + a$	$4e + 6d + 4c + 6b + a$
$e + d + c + b$	$2e + 8d + 2c + 8b + 3a$	$4e + 7d + 6c + 3b$
$e + 3d + c + 3b + a$	$3e + c + 4b$	$5e + 2d + 3c + 6b$
$e + 4d + 3c$	$3e + 2d + c + 6b + a$	$5e + 4d + 3c + 8b + a$
$e + 5d + c + 5b + 2a$	$3e + 4d + c + 8b + 2a$	$5e + 7d + 5c + 7b + a$
$e + 6d + 3c + 2b + a$	$3e + 5d + 3c + 5b + a$	$5e + 8d + 7c + 4b$
$e + 7d + c + 7b + 3a$	$3e + 6d + 5c + 2b$	$6e + 3d + 4c + 7b$
$e + 8d + 3c + 4b + 2a$	$3e + 7d + 3c + 7b + 2a$	$6e + 8d + 6c + 8b + a$
$2e + d + 5b + a$	$3e + 8d + 5c + 4b + a$	$7e + 4d + 5c + 8b$

Die Essigsäure kommt wohl nie schon gebildet in dem Pflanzenreiche vor; sondern sie ist als ein Product anfangender Entmischung der Pflanzenkörper, sey es durch Gährung oder durch die Wirkung des Feuers, oder der stärkeren mineralischen Säuren, zu betrachten. Da sie auf diese Weise aus einer großen Anzahl vegetabilischer Substanzen erzeugt werden kann, so ist es nicht zu verwundern, daß ihr auch eine verhältnißmäßig große Anzahl gleichgeltender Complexionen entspreche. Wie wir

im Vegetationsproceß unmerkliche Abstufungen annehmen müssen, ebenso finden wohl auch allmähliche Uebergänge Statt, wenn aus einem vegetabilischen Körper durch irgend ein Agens Essigsäure sich erzeugt, und sehr wahrscheinlich ist es daher, daß diejenigen Complexionen, deren Verhältnisse der Elemente den obigen sich mehr oder weniger nähern, diesen Uebergängen entsprechen.

B e r n s t e i n s ä u r e.

Berzelius*) verbrannte 1,294 bernsteinsaures Bleioxyd, welche 0,4 Säure enthalten, und erhielt 0,1536 Wasser und 0,7 Kohlensäure. Hieraus ergiebt sich die Zusammensetzung der Bernsteinsäure

Sauerstoff	=	48,00
Wasserstoff	=	4,27
Kohlenstoff	=	47,73
		100,00

Diese Verhältnisse nähern sich den Complexionen 458 und 462; am nächsten aber kommen sie den beiden gleichgeltenden 130, 238, in welchen ist:

Sauerstoff	=	48,00
Wasserstoff	=	4,00
Kohlenstoff	=	48,00
		100,00

Um nun die gleichgeltenden Complexionen für 8 Verhältnistheile aufzufinden, hat man für

s die Werthe 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24

w - - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

k - - 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32

zu setzen, und es ergeben sich dann überhaupt folgende 11 gleichgeltende Complexionen:

*) a. a. O. S. 100.

$2d + c + b$	$e + 3b$	$e + 6d + 3c + 6b$
$3d + 5b + a$	$e + 2d + c + 4b$	$e + 8d + 4c + 7b$
$5d + c + 6b + a$	$e + 3d + 8b + a$	$2e + 2d + c + 7b$
$7d + 2c + 7b + a$	$e + 4d + 2c + 5b$	

Es ist zu verwundern, daß die Bernsteinsäure eine verhältnißmäfsig so grofse Anzahl gleichgeltender Complexionen zuläfst, da sie doch bis jetzt ausser im Bernstein noch in keinen andern Pflanzenkörper gefunden worden. Es läfst sich aber überhaupt hierüber nichts bestimmtes sagen, denn wir wissen von dem Ursprung und der Bildung des Bernsteins wenig oder gar nichts. Da die Bernsteinsäure in ihrer Zusammensetzung am meisten der Essigsäure sich nähert: so könnte man annehmen, daß sie eine Modification derselben sey, wofür auch ihre beiderseitige Bildung spricht, indem die Essigsäure ebenfalls durch trockne Destillation vegetabilischer Substanzen entsteht. Nach *Gehlen's* Versuchen ist indess, wenn auch nicht zu läugnen ist, daß der grösste Theil der Bernsteinsäure durch die trockne Destillation erst gebildet wird, doch schon ein Theil derselben im Bernstein enthalten.

Gallussäure.

Berzelius *) verbrannte 1 Th. gallussaures Bleioxyd, welche 0,365 Säure enthalten, und erhielt 0,1568 Wasser und 0,77 Kohlensäure. Diefs giebt für die Zusammensetzung der Gallussäure

Sauerstoff	=	37,69
Wasserstoff	=	4,77
Kohlenstoff	=	57,54
		100,00

Nach einer andern Analyse dieses Chemikers besteht diese Säure aus:

Sauerstoff	=	38,48
Wasserstoff	=	4,72
Kohlenstoff	=	56,80
		100,00

*) a. a. O. S. 178.

Diese Verhältnisse kommen der Complexion 54 am nächsten, und ausserdem kommt keine in den Tafeln vor, welche sich nur einigermaassen diesen Verhältnissen näherte. In dieser ist:

Sauerstoff = 38,10

Wasserstoff = 4,76

Kohlenstoff = 57,14

100,00

Aus der Complexion 54 ergeben sich für

s der niedrigste Werth 1

w - - - 1

k - - - 2

Da nun hier $1 + 1 - 2 = 0$ ist, so lassen diese Verhältniszahlen, man mag sie auch noch so oft vervielfältigen, nach S. 111. §. 9. nur eine mögliche Complexion, nämlich d + b zu. Es ist aber gar nicht wahrscheinlich, daß die Gallussäure, die bekanntlich in allen Vegetabilien vorkommt, welche das sogenannte adstringirende Princip enthalten, nur einer einzigen Complexion entsprechen sollte. Diefß führt uns daher auf die Vermuthung, daß *Berzelius's* Analyse der Gallussäure nicht genau seyn kann, oder vielmehr, daß dieser Chemiker keine reine Säure zur Analyse anwandte. Er selbst bemerkt auch *), daß es schwierig ist, reine Gallussäure oder ein gallussaures Salz zu erhalten, das nicht durch den Einfluß der Base, womit es verbunden, etwas verändert wäre. Gallussäure in Krystallen enthielt immer etwas Gerbestoff. Es ist ferner bekannt, daß *Wuttig* die Gallussäure für identisch mit dem Gerbestoff erklärte, und wenn auch seine dafür angeführten Gründe nicht beweisen, was sie beweisen sollen, so ist doch so viel ausgemacht, daß, sofern auch beide Stoffe von einander verschieden sind, es wenigstens sehr schwierig, wo nicht unmöglich ist, sie rein von einander zu scheiden **). Für diese Bemerkungen spricht auch der Gerbestoff.

*) a. a. O. S. 176 und 177.

**) Vergl. *Klaproth's* Wörterb. die Artikel Gallussäure und Gerbestoff.

Gerbestoff.

Berzelius erhielt aus 0,4 Gerbestoff durch Verbrennung 0,1425 Wasser, und 0,7625 Kohlensäure. Diefes giebt für die Zusammensetzung des Gerbestoffs:

$$\text{Sauerstoff} = 44,05$$

$$\text{Wasserstoff} = 3,96$$

$$\text{Kohlenstoff} = 51,99$$

$$\hline 100,00$$

In den Tafeln findet man keine Complexion, welche diesen Verhältnissen nahe genug käme, um sie für dieselben setzen zu können. Sucht man daher nach der oben (S. 169.) gegebenen Anleitung, durch eine approximative Rechnung, die Verhältnistheile der Elemente, so erhält man für

$$s \text{ die Werthe } 7,14$$

$$w - - - 5,10$$

$$k - - - 11,22$$

und es ergeben sich dann nach S. 118. §. 35. für 8 Verhältnistheile folgende 2 gleichgeltende Complexionen:

$$5d + c + 5b$$

$$e + 3d + 7b$$

in welchen die Verhältnistheile der Elemente sind:

$$\text{Sauerstoff} = 44,09$$

$$\text{Wasserstoff} = 3,94$$

$$\text{Kohlenstoff} = 51,97$$

$$\hline 100,00$$

Es gilt hier dieselbe Bemerkung wie vorhin bei der Gallussäure. Diese Säure und der Gerbestoff sind bis jetzt fast immer in Verbindung in dem sogenannten adstringirenden Princip angetroffen worden; es ist daher zu vermuthen, dafs beiden, sofern sie wirklich verschiedene Substanzen sind, eine gleiche oder doch nahe gleiche Anzahl gleichgeltender Complexionen entspreche. Da für die Gallussäure nur eine und für

den Gerbestoff nur zwei nach *Berzelius's* Analysen, aufgefunden worden; beide aber so sehr verbreitete Substanzen sind, so möchte der Gerbestoff wohl eben so wenig wie die Gallussäure im reinen Zustande zur Analyse angewandt worden seyn. Weitere Versuche müssen hierüber entscheiden.

S a u e r k l e e s ä u r e.

Berzelius verbrannte 4 Th. sauerkleesaures Bleioxyd, welche 0,9816 Säure enthalten, und erhielt 0,019 — 0,02 Wasser und 1,138 — 1,14 Kohlensäure. Diefes giebt für die Zusammensetzung der Sauerkleesäure, wenn man das arithmetische Mittel nimmt, und zu dem Kohlenstoff noch diejenige Quantität addirt, die das Natron zurückgehalten, was freilich blofs nach einer Schätzung von *Berzelius* geschehen konnte,

Sauerstoff = 66,493

Wasserstoff = 0,221

Kohlenstoff = 33,286

100,000

Sucht man nun näherungsweise die Verhältnistheile für diese Elemente, so erhält man für

s den Werth 36

w - 1

k - 24

und hieraus findet man nach S. 119. §. 39. die beiden Complexionen:

$11c + 13b + a$

$d + 13c + 10b$

welche für die Zusammensetzung der Sauerkleesäure geben:

Sauerstoff = 66,513

Wasserstoff = 0,231

Kohlenstoff = 33,256

100,000

Berichtigt man aber das Resultat der Analyse von *Gay-Lussac* und *Thenard* nach *Berzelius* (weil nämlich die französischen Chemiker auf das Krystallisationswasser des sauerkleesauren Kalks, den sie zu ihrer Analyse anwandten, keine Rücksicht genommen): so erhält man für die Zusammensetzung der Sauerkleesäure

Sauerstoff	=	66,14
Wasserstoff	=	0,65
Kohlenstoff	=	33,21
		100,00

Sucht man für diese Elemente näherungsweise die Verhältnistheile, so erhält man für

s	den Werth	12
w	-	1
k	-	8

und hieraus findet man nach S. 119. §. 39. die beiden Complexionen,

$$3c + 5b + a$$

$$d + 5c + 2b$$

welche für die Zusammensetzung der Sauerkleesäure geben

Sauerstoff	=	66,21
Wasserstoff	=	0,69
Kohlenstoff	=	33,10
		100,00 *)

Je nachdem also *Berzelius's* oder *Thenard's* und *Gay-Lussac's* Analyse der Sauerkleesäure der Wahrheit am nächsten kommt, ist das Maximum der Verhältnistheile für die beiden Complexionen dieser Säure im ersten Falle = 13 und im andern = 5. Es ist hieraus abzunehmen,

*) *Döbereiner* (*Schweigg. Journ. B. XXIII. S. 70.*) sucht durch Versuche darzuthun, daß die Sauerkleesäure keine Spur Wasserstoff enthalte, sondern bloß aus gleichen Verhältnistheilen Kohlensäure und Kohlenoxyd bestehe. Seine Versuche scheinen mir aber noch nicht entscheidend.

welche Sorgfalt und Genauigkeit auf die Analyse der Sauerkleesäure verwandt werden müsse, wenn aus ihren Resultaten die wahren Complexionen abgeleitet werden sollen: die Analyse von *Berzelius* weicht noch nicht um ein halbes Procent von der der französischen Chemiker ab, und doch ist der Unterschied der Verhältnistheile in den binären Verbindungen schon 8. Dafs aber gerade sehr viel darauf ankommt, die Zusammensetzung der Sauerkleesäure so genau als nur immer möglich zu kennen, scheint sich aus folgenden Betrachtungen zu ergeben.

Man kann nicht vermuthen, dafs es ausser dieser Säure irgend eine Pflanzensubstanz geben könne, in welcher der Sauerstoff so überwiegend gegen den Wasserstoff auftritt. Denn bekanntlich lassen sich die meisten organischen Substanzen, wie namentlich alle zuckerigen, harzigen und gummösen, ferner die Extracte, Oele und das Fett, so wie sehr viele thierische Körper, und endlich die meisten, vielleicht alle Pflanzensäuren durch fortgesetzte Oxydation mittelst Salpetersäure *zuletzt* in Sauerkleesäure verwandeln; die Sauerkleesäure mufs daher als das letzte Product der Oxydation, d. i. als derjenige Körper betrachtet werden, in welchem der Sauerstoff das Maximum erreicht hat. Wenn wir aber nie eine andere Pflanzensubstanz auffinden, in welcher der Sauerstoff mehr vorwaltet, es uns auch nie gelingt, irgend einen Pflanzenkörper höher als bis zur Sauerkleesäure zu oxydiren: so sind wir im Stande, aus dieser Säure das Maximum der Verhältnistheile für die binären Verbindungen des Sauerstoffs abzuleiten.

Wenn es uns ferner gelingen sollte, ausser der Sauerkleesäure noch fünf andere Pflanzensubstanzen aufzufinden, worin in jeder derselben *ein* Element gegen *eines* der beiden übrigen *am überwiegendsten* hervortritt: so würden wir dadurch die Maxima der Verhältnistheile für die beiden übrigen Elemente kennen lernen, und auf diese Weise würden uns die Maxima der Verhältnistheile für die ganze Pflanzenwelt gegeben werden. Diese fünf Pflanzensubstanzen und die Sauerkleesäure würden daher gleichsam die Grenzen der Pflanzenwelt, (so fern wir vor der Hand von den stick-

stickstoffhaltigen Pflanzenkörpern abstrahiren) bilden; denn es ist klar, daß unter jenen Voraussetzungen, *keine einzige* Pflanzensubstanz ausser jenen Grenzen fallen könnte, und unsere Tafeln bis zu jenen Maximis erweitert, müßten dann nothwendiger Weise *alle möglichen* Pflanzenkörper von rein vegetabilischer Mischung enthalten.

Da wir nur allein auf empirischem Wege jene Pflanzensubstanzen, welche die Grenzen der Pflanzenwelt bilden, auffinden können, und das Feld der Erfahrung unbegrenzt ist: so möchte man fast zweifeln, daß uns je das wahre Maximum der Verhältnistheile bekannt werden würde. Es fragt sich aber überhaupt, ob dieses Maximum für alle binären Verbindungen dasselbe ist; denn in diesem Falle würde die möglichst genaueste Analyse der Sauerkleesäure *allein* dieses Maximum geben. A priori läßt sich hierüber nichts entscheiden; es bleibt uns daher nichts anders übrig, als auch die andern fünf Pflanzensubstanzen aufzusuchen und mit gleich großer Sorgfalt wie die Sauerkleesäure zu analysiren.

Welche Pflanzensubstanzen mögen aber wohl die wahrscheinlichen Grenzen für die Pflanzenkörper von rein vegetabilischer Mischung bilden? — Durch Vergleichung der Resultate aller bisherigen Analysen, ergiebt sich, daß in der Sauerkleesäure nicht nur der Sauerstoff gegen den Wasserstoff, sondern auch gegen den Kohlenstoff und der Kohlenstoff gegen den Wasserstoff am meisten überwiegend auftritt; ferner, daß das Wachs, Fischöl, Spermaceti, Fett und hauptsächlich die Cholesterine oder fette Substanz der Gallensteine diejenigen Pflanzenkörper *) sind, in welchen der Wasserstoff gegen den Kohlenstoff, und endlich, daß in dem Wachs, Fischöl, Spermaceti der Wasserstoff gegen den Kohlenstoff am meisten überwiegend hervortritt. So viel ersieht man überhaupt, daß die fetten, harzigen und öligen Körper nach der Reihe

*) Diese Körper sind zwar thierischen Ursprungs, gehören aber zu den Pflanzenkörpern, da sie rein vegetabilische Mischung haben.

so genau als nur immer möglich zerlegt werden müssen, wenn wir das erwünschte Ziel erreichen wollen.

Ehe ich die ebengenannten Substanzen betrachte, die ich aus Gründen, welche sich weiter unten ergeben werden, von den obigen völlig absondere, seyen mir einige allgemeine Bemerkungen erlaubt. Die Möglichkeit haben wir eingesehen, daß ein und derselbe Pflanzenkörper auf verschiedene Weise gebildet seyn könne, und doch stets die Verhältnisse der Elemente dieselben bleiben. Dieß haben schon mehrere Chemiker angedeutet (S. oben S. 35.) und durch eine verschiedene Anordnung der Grundtheile zu erklären gesucht. Die gleichgeltenden Complexionen führen die Sache auf einen klaren und bestimmten Begriff zurück. Wie ferner der Vegetationsproceß durch äussere Umstände modificirt, und die Verwandlung einer Pflanzensubstanz in die andere sich denken lasse, ergibt sich aus einer bloßen Vergleichung der gleichgeltenden Complexionen für zwei solcher Pflanzensubstanzen. Vielleicht beruhen die Verschiedenheiten *eines* und *desselben*, aber unter verschiedenen Umständen erzeugten Pflanzenkörpers, in Ansehung des Geschmacks, Geruchs, der Farbe u. s. w. bloß auf den verschiedenen Zusammensetzungen der binären Verbindungen, welche unsere gleichgeltende Complexionen geben, und die von der Natur nicht immer auf gleiche Weise und in gleichem Grade dargeboten werden.

Wir mußten uns bisher bloß auf die nähern Bestandtheile der Pflanzenkörper beschränken, da noch von keiner einzigen Pflanze selbst die Verhältnisse der Elemente bekannt sind. Daß aber eine Pflanze ebenfalls aus binären Verbindungen sich bilden lassen müsse, sofern bei allen nähern Bestandtheilen dieß der Fall ist, ist für sich klar (Vergl. S. 45.); nur möchte es aus den oben (S. 28.) angeführten Gründen sehr schwer, wenn nicht unmöglich seyn, die Summe dieser binären Verbindungen aus den nähern Bestandtheilen abzuleiten. Es bleibt uns daher, um die Complexionen für die Pflanzen selbst aufzufinden, nichts anders übrig, als dieselben *ganz so* wie die Natur sie liefert, in verschiedenen

Perioden ihres Wachstums und hauptsächlich in ihrer Reife zu analysiren, welches aber freilich, damit sie keine merkliche Entmischung erleiden können, geschehen müste, ehe noch ihr organisches Leben völlig verschwunden ist.

T e r p e n t h i n h a r z.

Da sich in unsern Tafeln keine Complexionen vorfinden, welche sich den Verhältnissen der Elemente des Terpenthinharzes, und der folgenden Substanzen nähern: so hat man die Verhältnistheile der Elemente nach S. 169. approximativ zu suchen; vorher aber zu prüfen, ob die obigen (S. 168.) Bedingungsungleichungen Statt finden.

Nach der Analyse von *Gay-Lussac* und *Thenard* *) besteht das Terpenthinharz aus:

Sauerstoff	=	13,337
Wasserstoff	=	10,719
Kohlenstoff	=	75,944
		100,000

Da hier die erste jener Bedingungsungleichungen (S. 168.) nicht Statt findet, weil

$$\frac{13,337}{8} + 10,719 < \frac{75,944}{6}$$

so lassen sich die obigen Verhältnisse der Elemente nicht aus den fünf binären Verbindungen hervorbringen. Die Bedingungsungleichungen treffen aber zu, wenn man annimmt, die Zusammensetzung des Terpenthinharzes sey:

Sauerstoff	=	14,30
Wasserstoff	=	10,70
Kohlenstoff	=	75,00
		100,00

*) a. a. O. S. 313.

und dann erhält man approximativ für

s den Werth 1

w - - 6

k - - 7

welches nach S. 111. §. 9. die *einzige mögliche* Complexion giebt:

$$6d + b$$

K o p a l.

Nach der Analyse von *Thenard* und *Gay-Lussac**) besteht der Kopal aus:

Sauerstoff = 10,606

Wasserstoff = 12,583

Kohlenstoff = 76,811

100,000

Da hier alle 3 Bedingungsungleichungen Statt finden, so lassen sich diese Verhältnisse durch die fünf binären Verbindungen darstellen**). Sucht man approximativ die Verhältniszahlen dieser Elemente, so findet sich für

s der Werth 1

w - - 10

k - - 10

und hieraus ergibt sich nach S. 118. §. 36. und §. 37. die *einzige* Complexion

$$e + 8d + b$$

in welcher die Verhältnisse der Elemente sind:

Sauerstoff = 10,26

Wasserstoff = 12,82

Kohlenstoff = 76,92

100,00

*) a. a. O. S. 313.

**) Wo in der Folge die Bedingungsungleichungen zutreffen, ist dieß nicht besonders bemerkt.

W a c h s.

Nach der Analyse von *Gay-Lussac* und *Thenard**) besteht das Wachs aus:

$$\text{Sauerstoff} = 5,544$$

$$\text{Wasserstoff} = 12,672$$

$$\text{Kohlenstoff} = 81,784$$

$$\hline 100,000$$

Da hier die erste jener Bedingungsungleichungen (S. 168.) nicht Statt findet, weil

$$\frac{5,544}{8} + 12,672 < \frac{81,784}{6}$$

so lassen sich die obigen Verhältnisse nicht aus den fünf binären Verbindungen hervorbringen. Setzen wir hingegen, die Zusammensetzung des Wachses sey:

$$\text{Sauerstoff} = 6,3$$

$$\text{Wasserstoff} = 13,39$$

$$\text{Kohlenstoff} = 80,31$$

$$\hline 100,00$$

so treffen die Bedingungsungleichungen zu und man erhält approximativ für

s den Werth 1

w - - 17

k - - 17

welches nach S. 118. §. 36. und §. 37. die *einzige* Complexion giebt

$$e + 15d + b$$

B a u m ö l.

Nach der Analyse von *Thenard* und *Gay-Lussac***) besteht das Baumöl aus:

*) a. a. O. S. 318.

**) a. a. O. S. 320.

Sauerstoff = 9,427

Wasserstoff = 13,360

Kohlenstoff = 77,213

100,000

Sucht man approximativ die Verhältniszahlen dieser Elemente, so findet sich für

s der Werth 1

w - - - 11

k - - - 11.

und hieraus ergibt sich nach S. 118. §. 36. und §. 37. die *einzig* Complexion:

e + 9d + b

in welcher die Verhältnisse der Elemente sind:

Sauerstoff = 9,41

Wasserstoff = 12,94

Kohlenstoff = 77,65

100,00

F i s c h ö l.

Nach *Berard's* Analyse *) besteht das Fischöl aus:

Sauerstoff = 6,00

Wasserstoff = 14,35

Kohlenstoff = 79,65

100,00

Sucht man approximativ die Verhältniszahlen dieser Elemente, so findet sich für

s der Werth 1

w - - - 19

k - - - 18

*) *Schweigg. Journ. B. XXII. S. 442. und 458.*

und hieraus ergeben sich nach S. 118. §. 35. die *beiden* Complexionen

$$18d + a$$

$$2e + 15d + b$$

in welchen die Verhältnisse der Elemente sind:

$$\text{Sauerstoff} = 5,93$$

$$\text{Wasserstoff} = 14,07$$

$$\text{Kohlenstoff} = 80$$

$$\hline 100,00$$

S p e r m a c e t i.

Nach *Berard's* *) Analyse besteht das *Spermaceti* aus:

$$\text{Sauerstoff} = 6,00$$

$$\text{Wasserstoff} = 13,00$$

$$\text{Kohlenstoff} = 81,00$$

$$\hline 100,00$$

Näherungsweise erhält man für

s den Werth 1

$$w - - 19$$

$$k - - 19$$

und hieraus ergibt sich nach S. 118. §. 36. und §. 37. die *einzige* Complexion

$$e + 17d + b$$

in welchen die Verhältnisse der Elemente sind:

$$\text{Sauerstoff} = 5,67$$

$$\text{Wasserstoff} = 13,48$$

$$\text{Kohlenstoff} = 80,85$$

$$\hline 100,00$$

*) a. a. O.

(*) a. a. O.

(**) a. a. O.

Nach *Berard's**) Analyse besteht die Cholesterine oder fette Substanz der Gallensteine aus

Sauerstoff	=	6,66
Wasserstoff	=	21,33
Kohlenstoff	=	72,01
		<u>100,00</u>

Näherungsweise erhält man für

s	den Werth	1
w	-	26
k	-	14

und hieraus ergeben sich nach S. 119. §. 40. die *beiden* Complexionen:

$$11e + 3d + a = \text{Sauerstoff}$$

$$13e + b = \text{Wasserstoff}$$

in welchen die Verhältnisse der Elemente sind:

Sauerstoff	=	6,78
Wasserstoff	=	22,03
Kohlenstoff	=	71,19
		<u>100,00</u>

F e t t.

Nach *Berard's***) Analyse besteht das Fett aus:

Sauerstoff	=	9,66
Wasserstoff	=	21,34
Kohlenstoff	=	69,00
		<u>100,00</u>

Näherungsweise erhält man für

s	den Werth	1
w	-	18
k	-	10

und

*) a. a. O.

**) a. a. O.

und hieraus ergeben sich nach S. 119. §. 40. die *beiden* Complexionen:

$$7e + 3d + a$$

$$9e + b$$

in welchen die Verhältnisse der Elemente sind:

$$\text{Sauerstoff} = 9,30$$

$$\text{Wasserstoff} = 20,93$$

$$\text{Kohlenstoff} = 69,77$$

$$\hline 100,00$$

B u t t e r.

Nach *Berard's* *) Analyse besteht die Butter aus:

$$\text{Sauerstoff} = 14,02$$

$$\text{Wasserstoff} = 19,64$$

$$\text{Kohlenstoff} = 66,34$$

$$\hline 100,00$$

Näherungsweise erhält man für

$$s \text{ den Werth } 1$$

$$w \text{ - - - } 11$$

$$k \text{ - - - } 6$$

und hieraus ergibt sich nach S. 119. §. 40. die *einzige* Complexion

$$4e + 2d + a$$

in welcher die Verhältnisse der Elemente sind:

$$\text{Sauerstoff} = 14,55$$

$$\text{Wasserstoff} = 20,00$$

$$\text{Kohlenstoff} = 65,45$$

$$\hline 100,00$$

*) a. a. O.

H a m m e l t a l g.

Nach *Berard's* *) Analyse besteht der Hammeltalg aus :

Sauerstoff	=	14,00
Wasserstoff	=	24,00
Kohlenstoff	=	62,00
		100,00

Da hier die letzte der obigen (S. 168.) Bedingungsungleichungen nicht Statt findet, weil

$$\frac{14,00}{8} + \frac{62,00}{3} < 24,00$$

so lassen sich diese Verhältnisse nicht durch die fünf binären Verbindungen darstellen. Setzt man hingegen die Zusammensetzung des Hammeltalgs sey:

Sauerstoff	=	14,29
Wasserstoff	=	21,43
Kohlenstoff	=	64,28
		100,00

so treffen die Bedingungsungleichungen zu, und man erhält für

s den Werth 1

w - - - 12

k - - - 6

welches nach S. 119. §. 40. die *einzige* Complexion giebt

$$5e + d + a$$

Aus den Complexionen für die 10 letztern Substanzen würde sich ergeben, daß das Maximum der Verhältnistheile von d gleich 18, und von e gleich 13, ferner daß die Cholesterine die Gränze für den Wasserstoff und das Fischöl und das Spermaceti die Gränze für den Kohlenstoff wäre, so fern nicht noch andere Substanzen aufgefunden werden,

*) a. a. O.

in welchen der Wasserstoff und Kohlenstoff noch mehr überwiegt. Es wurden durchaus nur die niedrigsten Werthe für s , w und k gesetzt, da schon diese meistens mehr als 8 Verhältnistheile geben, um so mehr höhere Werthe. Dafs übrigens nur wenige gleichgeltende Complexionen meistens nur *eine* für jede dieser Substanzen aufgefunden worden, ist begreiflich, da durchaus die Verhältniszahlen von der Art sind, dafs sie sich sehr beträchtlich von der Gleichheit der Verhältniszahlen entfernen. Wir fanden, dafs bei einigen gedachter Substanzen, die Bedingungsungleichungen nicht mehr zutrafen; doch konnten mit einer geringen, die möglichen Beobachtungsfehler nicht übersteigenden Abänderung in den Verhältnissen der Elemente noch Complexionen dargestellt werden. Unmöglich wird aber dieß bei der Benzoesäure, wenn die Analyse von *Berzelius* genau ist.

Berzelius *) verbrannte nämlich basisch benzoesaures Bleioxyd, das 0,317 Säure enthält, und erhielt 0,1414 Wasser und 0,8645 Kohlensäure. Dieß giebt für die Zusammensetzung der Benzoesäure

Sauerstoff	=	20,66
Wasserstoff	=	4,96
Kohlenstoff	=	74,38
		100,00

Da nun $\frac{20,66}{8} + 4,96 < \frac{74,38}{6}$, so läßt sich die Benzoesäure durch die fünf binären Verbindungen nicht darstellen. Möglich würde dieß nur dann werden, wenn ihre Zusammensetzung wäre:

Sauerstoff	=	33,61
Wasserstoff	=	5,88
Kohlenstoff	=	60,51
		100,00

*) e. a. O. S. 182.

Die Abweichung dieser Verhältnisse von jenen ist aber so beträchtlich, daß man sie unmöglich bloßen Beobachtungsfehlern zuschreiben kann. Indefs *Berzelius* erinnert selbst, daß er bei der Analyse dieser Säure ihrer schwachen Verwandtschaft und großen Flüchtigkeit wegen, Schwierigkeiten fand, wie noch bei keinem andern Pflanzenkörper. Stets verdunstete während des Verbrennens ein Theil der Säure, der unzersetzt blieb. Dieses Verdunsten der Säure verminderte er zwar dadurch um vieles, daß er sie mit Bleioxyd als basisches Salz verbunden zur Analyse anwandte; allein völlig konnte er es doch nicht verhindern.

Soviel ist daher wohl ausgemacht, daß *Berzelius's* Analyse kein großes Vertrauen verdienen kann; ob indess die Abweichung so beträchtlich ist als die Bedingungsungleichungen sie fordern, wage ich nicht zu entscheiden. Ist diess aber nicht der Fall, so wäre die Benzoessäure die einzige bisher bekannte Pflanzensubstanz, die sich nicht durch die fünf binären Verbindungen hervorbringen läßt.

Allein man muß sich hier noch die Frage aufwerfen: giebt es denn ausser den mehrgedachten fünf binären Verbindungen nicht noch andere unter den Elementen? — Wenn noch eine oder einige binäre Verbindungen Statt finden, worin der Kohlenstoff noch mehr als in dem Kohlenoxyd und dem ölerzeugenden Gas hervortritt: so läßt sich die Benzoessäure durch binäre Verbindungen nicht nur darstellen, sondern es werden auch wahrscheinlich mehrere gleichgeltende Complexionen für sie, so wie für die übrigen Pflanzenkörper von überwiegenden Kohlenstoff sich ergeben.

Befragen wir nun hierüber die Erfahrung. *Brugnatelli* behauptet, daß er eine Verbindung des Wasserstoffs mit Kohle durch den negativen Pol der Säule bewerkstelligt habe*) und auch dadurch, daß er glühende Kohlen in Wasser tauchte, bis sich Wasserstoffgas entwickelte. In diesem Falle soll sich ein Theil des eben entstehenden Wasserstoffs mit der

*) *Gehlen's Journ. der Chemie und Phys. B. I. S. 81.*

Kohle verbinden, während ein anderer Theil mit dem Kohlenstoff Kohlenwasserstoffgas darstellt *). Ebenso zeigen die Versuche von *Cruikshank* **), *Bertholet* ***) und *Hassenfratz* †), daß der Wasserstoff einen Bestandtheil der Kohle ausmache, und daß derselbe so innig damit verbunden sey, daß der heftigste Grad von Hitze ihn nicht abzuscheiden vermag. Endlich bestätigen auch diese Meinung die sorgfältigen Versuche von *Davy* ††), der den Diamant als reine Kohle betrachtet, die sich von der gewöhnlichen Kohle nur dadurch unterscheidet, daß letztere etwas Wasserstoff, welcher chemisch mit ihr verbunden ist, enthält.

Es fragt sich aber, ob die Wasserstoffkohle eine feste Verbindung nach einem oder mehreren Verhältnissen ist. *Lavoisier* schätzt nach einem Versuche den Wasserstoff gleich $\frac{1}{8}$ vom Gewicht der Kohle, *Clement* und *Desormes* hingegen ganz unbedeutend wenig, nämlich nur gleich $\frac{1}{1500}$. In der neuern Zeit stellte *Döbereiner* genaue Versuche an, um das Mischungsverhältniß in der Pflanzenkohle aufzufinden. Er erhitzte völlig wasserfreies Kupferoxyd mit starkgeglühter Fichtenkohle und ein andermal mit ungeglühter Kohle: im ersten Falle erhielt er für die Pflanzenkohle die Zusammensetzung

Wasserstoff =	1,44	oder	1	Verhältnistheil
Kohlenstoff =	98,56	-	12	
	100,00			

und im andern Falle

Wasserstoff =	2,15	oder	1	Verhältnistheil
Kohlenstoff =	97,85	-	8	
	100,00			

*) ebend. B. II. S. 554.

**) *Scherer's Journ.* B. VII. S. 371, fg.

***) ebend. B. X. S. 575. fg.

†) *Mem. de l'Inst. nat.* T. IV.

††) *Schweigg. Journ.* B. XII. S. 200. fg.

Unbeschadet der Genauigkeit dieses Chemikers müssen doch diese Versuche noch öfters wiederholt werden, um das genaue Mischungsverhältniß der Pflanzenkohle zu erhalten.

Es scheint übrigens, daß nicht nur eine neue binäre Verbindung des Kohlenstoffs mit Wasserstoff, sondern auch eine mit Sauerstoff Statt findet, wie aus *Brugnatelli's* *) und vorzüglich *Proust's* *) Beobachtungen erhellet. Auch hierüber müssen wiederholte genaue Untersuchungen entscheiden.

Wenn nun zu unsern fünf binären Verbindungen noch einige neue hinzukommen, so werden natürlich ganz andere Bedingungsungleichungen Statt finden als die obigen (S. 168.). Es wird sich dann auch *Rothe's* Regel ändern, indem das Problem noch unbestimmter wird; obgleich sie für alle Complexionen, worin diese neuen binären Verbindungen nicht enthalten sind, allgemeine Gültigkeit behält. Nehmen wir an, daß die Anzahl der binären Verbindungen bis auf 7 steigt, (daß nämlich die beiden neuen Wasserstoffkohle und Sauerstoffkohle seyen), so vermehrt sich die Anzahl der Complexionen für 3 Verhältnistheile, nach S. 80 oder 87 bis auf 16,129; für 8 Verhältnistheile aber nach S. 88 gar bis auf 4,689,409. Kommen nun endlich gar noch die binären Verbindungen des Stickstoffs hinzu, so wächst die Anzahl der Complexionen so ungeheuer, daß sie, wenn das Maximum der Verhältnistheile auch nicht sehr hoch ist, die fast zahllose Mannichfaltigkeit in den Mischungsverhältnissen der organischen Körper ohne Zweifel umfassen wird.

Wollten wir die Tafeln bis zu diesem Umfange erweitern, so würde dieses eine, das menschliche Leben bei weitem übersteigende Arbeit seyn, die auch, wenn es möglich wäre sie zu vollenden, auf dem gegenwärtigen Standpuncte der Wissenschaft doch nicht die große Mühe lohnen würde. *Rothe's* Regel (S. 122. §. 57.) überhebt uns dieser Mühe, da wir nach

*) a. o. a. O. S. 554.

**) ebend. B. III. S. 365. fg.

ihr für jedes durch die Analyse aufgefundenen Mischungsverhältniß die entsprechenden Complexionen direkt auffinden können; und es ist nicht zu zweifeln, daß sich diese Regel, versteht sich unter den nöthigen Modificationen, auch auf die neu hinzu kommenden binären Verbindungen anwenden lassen werde. Ehe dieß aber geschehen kann, müssen noch viele sorgfältige Untersuchungen vorausgehen.

Ich habe mich nun bisher bloß auf die Erfahrungen anderer gestützt, und ich glaube nicht, eine einzige wohlbegründete Thatsache übersehen zu haben, die im offenbaren Widerspruche mit irgend einem aufgestellten Satze stände. Da wo mich Thatsachen verließen, mußte ich mich freilich öfters mit bloßen Vermuthungen begnügen; ich gebe sie aber für nichts anders als für solche. Ich habe in diesem Schreiben mehrere Untersuchungen angedeutet, die theils zur Bestätigung meiner vorgetragenen Ansichten, theils zur weitem Ausführung derselben nothwendig sind. Es wird nun mein angelegentlichstes Bestreben seyn, diese Untersuchungen selbst vorzunehmen, und ich hoffe, daß mein neuer Beruf, in den ich gegenwärtig trete, mir die nöthige Muse hierzu verstatten werde. Vielleicht sind unsere gemeinschaftlichen Untersuchungen für die Naturforscher nicht ganz ohne Interesse, und vielleicht gefällt es geübteren und erfahreneren Chemikern gleichfalls in einem Felde zu arbeiten, das bisher so wenig kultivirt worden. Durch gemeinschaftliche Thätigkeit werden wir dann hoffentlich einem Ziele entgegen gehen, das für die Wissenschaft nicht unerreichbar ist.

A n h a n g.

Bischof an Rothe.

Die *eine* Gruppe der 7 gleichgeltenden Complexionen 63, 66, 139, 211, 250, 330, 410 in unsern Tafeln, welche der Zusammensetzung der Citronensäure entspricht, gab mir für 8 Verhältnistheile 54 gleichgeltende Complexionen. Da nur noch *eine* solche Gruppe von 7 gleichgeltenden Complexionen, nämlich 173, 230, 370, 427, 618, 671, 866 in den Tafeln vorkommt: so war es mir interessant zu erfahren, wie viel wohl diese für 8 Verhältnistheile geben würde. Hierbei machte ich die Bemerkung, daß die Werthe für s und w in beiden Gruppen sich verwechseln, während k ungeändert bleibt. Für diesen Fall ergibt sich aber aus Ihren Grundgleichungen (S. 110. §. 1.) daß die Werthe von β und δ , γ und ϵ sich ebenfalls verwechseln; es müssen daher auch die Gruppen gleichgeltender Complexionen, die für gedachte Verhältnisse gefunden worden, für *jede* Anzahl von Verhältnistheilen gleich seyn: für 3 Verhältnistheile ist diese Anzahl = 7, für 8 Verhältnistheile = 54.

So wie diese beiden Gruppen auf die angezeigte Art correspondiren, so giebt es mehrere solcher correspondirender Gruppen in unsern Tafeln; es möchte daher nicht unverdienstlich seyn, wenn Sie diese Gruppen zusammenstellen wollten. Ich wünsche aber, daß Sie die Zusammenstellung dergestalt einrichten möchten, daß diejenigen Complexionen, in welchen s größer als w , auf die linke Seite, diejenigen wo w größer als s , auf die rechte, und endlich diejenigen, in welchen s gleich w ist, in die Mitte zu stehen kommen.

Rothe an Bischof.

Man nenne zwei solche Complexionen *verwandt*, die dadurch aus einander entstehen, daß man b und d , desgleichen c und e verwechselt, a aber ungeändert läßt. So sind z. B. die Complexionen $2e + d + 3c + b + 2a$ und $3e + d + 2c + b + 2a$ verwandt.

Es giebt Complexionen, die sich selbst verwandt sind, z. B. $2e + 3d + 2c + 3b + a$. Man kann solche auch *isolirt* nennen.

Bei verwandten Complexionen sind allemal die Werthe von s und w verwechselt, der Werth von k aber bei beiden einerlei. So ist z. B. für die Complexion

$$2e + d + 3c + b + 2a \dots s = 9, w = 7, k = 7$$

$$3e + d + 2c + b + 2a \dots s = 7, w = 9, k = 7$$

Ist daher eine Complexion sich selbst verwandt oder isolirt, so ist darinnen $s = w$ und k gerade. So ist z. B. für die Complexion

$$2e + 3d + 2c + 3b + a \dots s = 8, w = 8, k = 10.$$

Welche von den obigen 961 Complexionen mit einander verwandt sind, zeigt folgende Tafel. Diejenigen, welche sich selbst verwandt oder isolirt sind, habe ich darinnen mit einem dazwischen gesetzten Sternchen bezeichnet. Es giebt solche sich selbst verwandte oder isolirte Complexionen 49. Die Anzahl dieser sich selbst verwandten oder isolirten Complexionen ist allgemein für m Atome $= \phi m$, wo man aber $n = 3$ setzen muß.

1 *	I	41	779	81	425	121 *	121	161	789	201	493
2	50	42	780	82	484	122	176	162	850	202	550
3	51	43	781	83	485	123	177	163	851	203	551
4	52	44	842	84	486	124	178	164	852	204	552
5	53	45	843	85	487	125	179	165	853	205	553
6	114	46	844	86	542	126	234	166	912	206	610
7	115	47	845	87	543	127	235	167	913	207	611
8	170	48	906	88	544	128	236	168	914	208	612
9	171	49	907	89	545	129	237	169	915	209	613
10	226	50	2	90	604	130	298	170	8	210	670
11	227	51	3	91	605	131	299	171	9	211	671
12	228	52	4	92	606	132	300	172	62	212	672
13	229	53	5	93	607	133	301	173	63	213	673
14	290	54 *	54	94	662	134	362	174	64	214	732
15	291	55 *	55	95	663	135	363	175	65	215	733
16	292	56 *	56	96	664	136	364	176	122	216	790
17	293	57 *	57	97	665	137	365	177	123	217	791
18	354	58	116	98	724	138	426	178	124	218	792
19	355	59	117	99	725	139	427	179	125	219	793
20	356	60	118	100	726	140	428	180 *	180	220	854
21	357	61	119	101	727	141	429	181 *	181	221	855
22	418	62	172	102	782	142	488	182	238	222	856
23	419	63	173	103	783	143	489	183	239	223	857
24	420	64	174	104	784	144	546	184	240	224	916
25	421	65	175	105	785	145	547	185	241	225	917
26	482	66	230	106	846	146	548	186	302	226	10
27	483	67	231	107	847	147	549	187	303	227	11
28	538	68	232	108	848	148	608	188	304	228	12
29	539	69	233	109	849	149	609	189	305	229	13
30	540	70	294	110	908	150	666	190	366	230	66
31	541	71	295	111	909	151	667	191	367	231	67
32	602	72	296	112	910	152	668	192	368	232	68
33	603	73	297	113	911	153	669	193	369	233	69
34	658	74	358	114	6	154	728	194	430	234	126
35	659	75	359	115	7	155	729	195	431	235	127
36	660	76	360	116	58	156	730	196	432	236	128
37	661	77	361	117	59	157	731	197	433	237	129
38	722	78	422	118	60	158	786	198	490	238	182
39	723	79	423	119	61	159	787	199	491	239	183
40	778	80	424	120 *	120	160	788	200	492	240	184

241	185	281	797	321	441	361	77	401	685	441	321
242	* 242	282	858	322	498	362	134	402	742	442	382
243	* 243	283	859	323	499	363	135	403	743	443	383
244	* 244	284	860	324	500	364	136	404	744	444	384
245	* 245	285	861	325	501	365	137	405	745	445	385
246	306	286	918	326	558	366	190	406	802	446	* 446
247	307	287	919	327	559	367	191	407	803	447	* 447
248	308	288	920	328	560	368	192	408	804	448	* 448
249	309	289	921	329	561	369	193	409	805	449	* 449
250	370	290	14	330	618	370	250	410	866	450	506
251	371	291	15	331	619	371	251	411	867	451	507
252	372	292	16	332	620	372	252	412	868	452	508
253	373	293	17	333	621	373	253	413	869	453	509
254	434	294	70	334	678	374	314	414	926	454	566
255	435	295	71	335	679	375	315	415	927	455	567
256	436	296	72	336	680	376	316	416	928	456	568
257	437	297	73	337	681	377	317	417	929	457	569
258	494	298	130	338	738	378	* 378	418	22	458	626
259	495	299	131	339	739	379	* 379	419	23	459	627
260	496	300	132	340	740	380	* 380	420	24	460	628
261	497	301	133	341	741	381	* 381	421	25	461	629
262	554	302	186	342	798	382	442	422	78	462	686
263	555	303	187	343	799	383	443	423	79	463	687
264	556	304	188	344	800	384	444	424	80	464	688
265	557	305	189	345	801	385	445	425	81	465	689
266	614	306	246	346	862	386	502	426	138	466	746
267	615	307	247	347	863	387	503	427	139	467	747
268	616	308	248	348	864	388	504	428	140	468	748
269	617	309	249	349	865	389	505	429	141	469	749
270	674	310	* 310	350	922	390	562	430	194	470	806
271	675	311	* 311	351	923	391	563	431	195	471	807
272	676	312	* 312	352	924	392	564	432	196	472	808
273	677	313	* 313	353	925	393	565	433	197	473	809
274	734	314	374	354	18	394	622	434	254	474	870
275	735	315	375	355	19	395	623	435	255	475	871
276	736	316	376	356	20	396	624	436	256	476	872
277	737	317	377	357	21	397	625	437	257	477	873
278	794	318	438	358	74	398	682	438	318	478	930
279	795	319	439	359	75	399	683	439	319	479	931
280	796	320	440	360	76	400	684	440	320	480	932

481	933	521	693	561	285	601	941	641	701	681	337
482	26	522	750	562	390	602	32	642	758	682	398
483	27	523	751	563	391	603	33	643	759	683	399
484	82	524	752	564	392	604	90	644	760	684	400
485	83	525	753	565	393	605	91	645	761	685	401
486	84	526	810	566	454	606	92	646	818	686	462
487	85	527	811	567	455	607	93	647	819	687	463
488	142	528	812	568	456	608	148	648	820	688	464
489	143	529	813	569	457	609	149	649	821	689	465
490	198	530	874	570	512	610	206	650	882	690	518
491	199	531	875	571	513	611	207	651	883	691	519
492	200	532	876	572	514	612	208	652	884	692	520
493	201	533	877	573	515	613	209	653	885	693	521
494	258	534	934	574	* 574	614	266	654	942	694	582
495	259	535	935	575	* 575	615	267	655	943	695	583
496	260	536	936	576	* 576	616	268	656	944	696	584
497	261	537	937	577	* 577	617	269	657	945	697	585
498	322	538	28	578	632	618	330	658	34	698	638
499	323	539	29	579	633	619	331	659	35	699	639
500	324	540	30	580	634	620	332	660	36	700	640
501	325	541	31	581	635	621	333	661	37	701	641
502	386	542	86	582	694	622	394	662	94	702	* 702
503	387	543	87	583	695	623	395	663	95	703	* 703
504	388	544	88	584	696	624	396	664	96	704	* 704
505	389	545	89	585	697	625	397	665	97	705	* 705
506	450	546	144	586	754	626	458	666	150	706	762
507	451	547	145	587	755	627	459	667	151	707	763
508	452	548	146	588	756	628	460	668	152	708	764
509	453	549	147	589	757	629	461	669	153	709	765
510	* 510	550	202	590	814	630	516	670	210	710	822
511	* 511	551	203	591	815	631	517	671	211	711	823
512	570	552	204	592	816	632	578	672	212	712	824
513	571	553	205	593	817	633	579	673	213	713	825
514	572	554	262	594	878	634	580	674	270	714	886
515	573	555	263	595	879	635	581	675	271	715	887
516	630	556	264	596	880	636	* 636	676	272	716	888
517	631	557	265	597	881	637	* 637	677	273	717	889
518	690	558	282	598	938	638	698	678	334	718	946
519	691	559	283	599	939	639	699	679	335	719	947
520	692	560	284	600	940	640	700	680	336	720	948

Setzt man in einer Gruppe gleichgeltender Complexionen, statt jeder Complexion die ihr verwandte, so bekommt man wieder eine solche Gruppe, und in einem ähnlichen Sinne kann man zwei Gruppen aus gleichviel gleichgeltenden Complexionen, deren jede aus der andern auf die angezeigte Art entsteht, *verwandt* nennen. So sind z. B. wie Sie bemerken, die beiden Gruppen von sieben gleichgeltenden Complexionen, die in den Tafeln vorkommen, verwandt.

Es giebt Gruppen, die sich selbst verwandt sind. So ist z. B. die *eine* Gruppe von 21 gleichgeltenden Complexionen, die in den Tafeln vorkommt, sich selbst verwandt. Solche Gruppen kann man auch *isolirt* nennen.

Kommt in einer Gruppe eine isolirte Complexion vor, so ist die ganze Gruppe isolirt.

So wie bei allen Complexionen, die zu *einer* Gruppe gehören, das Verhältniß $s : w : k$ dasselbe ist, eben so ist bei verwandten Gruppen das Verhältniß von $s : k$ in der einen gleich dem Verhältniß von $w : k$ in der andern, mithin ist das Verhältniß von $s : w$ in beiden umgekehrt.

Ist daher eine Gruppe sich selbst verwandt oder isolirt: so muss darinnen $s : w = 1 : 1$ sich verhalten.

Umgekehrt sind zwei Gruppen so beschaffen, daß das Verhältniß von $s : k$ in der einen gleich ist dem Verhältnisse von $w : k$ in der andern, so sind sie verwandt, und haben folglich gleichviel Complexionen.

Verhält sich in einer Gruppe $s : w = 1 : 1$, so ist selbige sich selbst verwandt oder isolirt.

Es folgt nun die von Ihnen verlangte Darstellung. Dem am Schluss Ihres Schreibens geäußerten Wunsch habe ich beim Entwurfe derselben auch genügt so *weit es möglich war*. Bei isolirten Gruppen nämlich, die sich in erwähnter Darstellung sehr deutlich dadurch vor den andern herausheben, daß sie entweder Complexionen in der mittlern Reihe, oder, wo dieß nicht der Fall ist, nur halb so viel Horizontalreihen enthalten als die andern, ist das Verhältniß von $s : w$, wie ich vorhin bemerkte, immer gleich $1 : 1$. Im Falle nun eine solche isolirte Gruppe nicht lauter isolirte Complexionen enthält, mithin darinnen verschiedene verwandte vorkommen, so mußte von letztern die eine links und die andere rechts gesetzt werden, ohngeachtet bei beiden $s = w$ ist.

1 Gruppe von 21 gleichgelt. Com- plexionen.	131	299	64	174	121	193	369	72	296
	239	183	142	488	312	392	564	259	495
	322	498	213	673	510	508	452	345	801
55	471	807	251	371	833	587	755		
127 235	583	695	412	868				75	359
188 304	772	890			126 234	204	552	262	554
242			65	175	180	320	440	351	923
311			67	231	378	403	743		
380	132	300				516	630	76	360
387 503	240	184	252	372	128 236			263	555
449	323	499	333	621	577			353	927
456 568	473	809	528	812	767	384	444		
575	585	697				467	747	79	423
643 759	774	892	124	178	136 364	579	633	154	728
705			199	491	327 559	768	826	266	614
712 824	187	303	315	375	481 933				
831	386	502	512	570	522 750	385	445	80	424
900	703		839	953		468	748	155	729
	898				140 428	580	634	267	615
2 Grup. von 7 gleichgelt. Com- plexionen.	14 Grup. von 5 gleichgelt. Com- plexionen.		125	179	214 732	769	827		
63 173			200	492	331 619			81	425
66 230	3 51		316	376	526 810	455	567	156	730
139 427	84 486		513	571	141 429	642	758	268	616
211 671	89 545		841	955	215 733				
250 370	276 736	27 Grup. von 4 gleichgelt. Com- plexionen.			332 620	457	569	120	
330 618	281 797				527 811	644	760	310	
410 866	6 114							447	
7 Grup. von 6 gleichgelt. Com- plexionen.	87 543	8 170			181	66 Grup. von 3 gleichgelt. Com- plexionen.		123	177
	96 664	82 484			379			198	499
	274 734	95 663			574	56		314	374
	283 859	282 858			960	243			
59 117	60 118				189 305	313		133	301
203 551	205 553	9 171			388 504			241	185
246 306	247 307	83 485						324	500
319 439	321 441	97 665			192 368	71 295		135	363
402 742	404 744	284 860			391 563	258 494		326	558
475 871					507 451	343 799		479	931
					586 754				

137	365	209	613	461	629	91	605	159	787	399	683
328	560	408	804	648	820	278	794	271	675	594	878
523	751	520	692	764	708						
						92	606	160	788	400	684
145	547	217	791	469	749	279	795	272	676	595	879
255	435	335	679	581	635						
338	738	530	874	770	828	93	607	161	789	401	685
						280	796	273	677	596	880
146	548	218	792	472	808						
256	436	336	680	584	696	129	237	186	302	405	745
339	739	531	875	773	891					517	631
						130	298	195	431		
147	549	219	793	473	809	238	182	394	622	409	805
257	437	337	681	585	700					521	693
340	740	532	876	774	892	143	489	202	550		
						253	373	318	438	454	566
191	367	381		28	419						
390	562	576		98	724	144	546	212	672	463	687
506	450	766				254	434	411	867	650	882
				24	420						
196	432	383	443	99	725	148	608	216	790	464	688
395	623	466	746			342	798	334	678	651	883
590	814	578	632	25	421						
				100	726	149	609	221	855	465	689
197	433	393	565			344	800	534	934	652	884
396	624	509	453	57							
591	815	588	756	244		151	667	222	856	470	806
						346	862	535	935	582	694
201	493	448		61	119						
317	377	636		248	308	152	668	223	857	476	872
514	572	830				347	863	536	936	776	950
				73	297						
207	611	459	627	260	496	153	669	329	561	477	873
406	802	646	818			348	864	524	752	777	951
518	690	762	706	77	36						
				264	556	157	731	389	505	637	
						269	617			832	
208	612	460	628								
407	803	647	819	88	544	158	786	397	625	639	699
519	691	763	707	275	735	270	674	592	816	834	894

640	700	5	53	41	779	110	908	287	919	598	938
835	895	7	115	42	780	111	909	288	920	599	939
		10	226	43	781	112	910	289	921	600	940
641	701	11	227	44	842	113	911	325	501	601	941
836	896	12	228	45	843	122	176	341	741	638	698
		13	229	46	844	134	362	349	865	653	885
645	761	14	290	47	845	138	426	350	922	654	942
		15	291	48	906	150	666	352	924	655	943
649	821	16	292	49	907	162	850	382	442	656	944
765	709	17	293	54		163	851	398	682	657	945
		18	354	58	116	164	852	413	869	702	
704		19	355	62	172	165	853	414	926	714	886
899		20	356	68	232	166	912	415	927	715	887
		21	357	69	233	167	913	416	928	716	888
710	822	22	418	70	294	168	914	417	929	717	889
		26	482	74	358	169	915	446		718	946
711	823	27	483	78	422	190	366	458	626	719	947
		28	538	85	487	194	430	462	686	720	948
713	825	29	539	86	542	206	610	474	870	721	949
		30	540	90	604	210	670	478	930	771	829
		31	541	94	662	220	854	480	932	775	893
		32	602	101	727	224	916	511		837	897
		33	603	102	782	225	917	515	573	838	952
		34	658	103	783	245		525	753	840	954
		35	659	104	784	249	309	529	813	901	
		36	660	105	785	261	497	533	877	902	956
		37	661	106	846	265	557	537	937	903	957
		38	722	107	847	277	737	589	757	904	958
		39	723	108	848	285	861	593	817	905	959
		40	778	109	849	286	918	597	881	961	

Die 298 nur
einmal vor-
kommenden
Com-
plexionen
nach ihrer
Verwandt-
schaft zusam-
mengestellt.

I

2

4

11

Bischof an den Präsidenten Nees von Esenbeck.

Diese letzteren Untersuchungen sind es, die sich zunächst an die Ihrigen anschliessen und, wie mir scheint, als vermittelndes Glied zwischen unsere aus verschiedenem Standpuncte gewonnene Ansicht über Entwicklung der Pflanzensubstanz treten.

Verwandte Complexionen, wie sie *Rothe* nennt, sind bedingt durch den Gegensatz zwischen Sauerstoff und Wasserstoff; denn sie entstehen gegenseitig aus einander, wenn man *s* und *w* (die Verhältnistheile des Sauerstoffs und Wasserstoffs) verwechselt, *k* (die Verhältnistheile des Kohlenstoffs) aber ungeändert läßt. Dieser Gegensatz spricht sich ferner aus in den binären Verbindungen des Sauerstoffs mit Kohlenstoff und des Wasserstoffs mit Kohlenstoff; denn setzt man ölerzeugendes Gas statt Kohlenoxydgas und Kohlenwasserstoffgas statt Kohlensäure, und umgekehrt, läßt aber die binäre Verbindung des Sauerstoffs mit Wasserstoff ungeändert, so erhält man *verwandte* Complexionen. Es ist ganz klar, daß sich das Wasser, da es die einzige binäre Verbindung des Sauerstoffs und Wasserstoffs und zwar nach gleichen Verhältnistheilen ist, mit keiner andern binären Verbindung verwechseln lassen könne. Es ist ferner leicht einzusehen, daß auch dann noch solche *verwandte* Complexionen Statt finden werden, wenn auch die neuen binären Verbindungen des Sauerstoffs mit Kohlenstoff und des Wasserstoffs mit Kohlenstoff, wovon wir oben (S. 218) sprachen, hinzukommen, so fern nur in denselben die Verhältnistheile des Kohlenstoffs zum Sauerstoff sich verhalten wie die des Kohlenstoffs zum Wasserstoff, wie diess bei dem Kohlenoxydgas und ölerzeugenden Gas, der Kohlensäure und dem Kohlenwasserstoffgas der Fall ist (vergl. oben S. 64).

Da alle Complexionen für jede Anzahl von Verhältnistheilen entweder *verwandte* oder *isolirte* sind, so zerfallen dieselben überhaupt in zwei Classen, und die *verwandten* lassen sich wiederum darnach ordnen, daß man alle diejenigen, in denen *s* größer als *w*, in *eine* Reihe, und diejenigen, in denen *w* größer als *s*, gleichfalls in *eine* Reihe stellt. Ich will jene die *Sauerstoff-Reihe*, diese die *Wasserstoff-Reihe* nennen; es entspricht daher in der von *Rothe* angeordneten Zusammenstellung

der 961 Complexionen in unsern Tafeln, (S. 227. fg.) die linke Reihe der Sauerstoff-Reihe und die rechte der Wasserstoff-Reihe, und die mittlere enthält die isolirten Complexionen *).

Sonach kämen wir denn auf die Classification der Pflanzensubstanzen, wie sie *Thenard* und *Gay-Lussac* (S. 33.) angeordnet, wieder zurück: diejenigen Substanzen nämlich, in welchen $s = w$, enthalten den Sauerstoff und Wasserstoff genau in eben dem Verhältnisse, worin sie im Wasser vorhanden sind; und diejenigen, in welchen $s > w$, enthalten des Sauerstoffs im Verhältnisse zum Wasserstoff mehr als im Wasser vorhanden ist; und endlich diejenigen, in welchen $w > s$, enthalten des Sauerstoffs im Verhältnisse zum Wasserstoff weniger als im Wasser vorhanden ist. Ich beziehe mich übrigens, wie sich ohnehin versteht, nicht auf den von *Gay-Lussac* und *Thenard* vorausgesetzten Zusammenhang der chemischen Natur der Pflanzensubstanzen mit dem Verhältnisse des Sauerstoffs zum Wasserstoff; denn daß die hierauf beruhende Classification keine ganz allgemeine Gültigkeit habe, haben wir oben (S. 34.) gesehen; es könnte indess doch seyn, daß diese Classification mit einigen Modificationen, die sich unter Berücksichtigung des Vegetationsprocesses ergeben werden, Plaz greifen, und vielleicht einen Zusammenhang zwischen unsern drei Reihen und Ihren Evolutionsbasen wenigstens andeuten möchte; ich wage es aber nicht hierüber, aus Mangel an genügenden Erfahrungen, etwas zu äussern.

Sollte es uns in der Folge gelingen, die den verwandten Complexionen entsprechenden Pflanzensubstanzen aufzufinden, und dadurch ein Verwandtschaftsverhältniß zwischen letzteren, in obigen Sinn genommen, zu begründen, so würden wir einen nicht unbedeutenden Vorsprung gewinnen. Unbeachtet darf es übrigens schon jetzt nicht bleiben, daß gerade diejenigen Pflanzensubstanzen, mit denen der ganze Vegetationsprocess beginnt, und die im Acte der Vegetation die wichtigste Rolle zu spielen scheinen, den isolirten Complexionen entsprechen. Mit Beziehung auf das gegenseitige Neutralitätsverhältniß des Sauerstoffs und Wasserstoffs könnte man daher sagen, daß der Vegetationsprocess mit der

*) Vergl. jedoch *Rothe's* Bemerkung in seinem Schreiben an mich (S. 226.)

Indifferenz der beiden Polarstoffe beginnt, und seine ersten Producte als sich selbst verwandt in sich selbst zurücklaufen. Mit dem Hervortreten eines der beiden Polarstoffe entfalten sich aber die Verwandtschaften, und es bilden sich zwei Reihen, in denen die Pflanzensubstanzen polar einander entgegen stehen.

Schlüsslich habe ich nur noch zu bemerken, daß unter den in meinem vorigen Schreiben angeführten, bis jetzt nur allein analysirten nähern Pflanzenbestandtheilen, die Citronensäure, Schleimsäure, Weinsäure, Sauerkleesäure, Bernsteinsäure und der Gerbestoff zur Sauerstoffreihe; die verschiedenen Zuckerarten, das arabische Gummi, die Holzfaser vom Eichen- und Buchenholz, die Essigsäure und Gallussäure zur Reihe der isolirten Complexionen; und das Stärkmehl, Terpentharz, der Kopal, das Wachs, Baumöl, Fischöl, Spermaceti, die Cholesterine, das Fett, die Butter, der Hammeltalg zur Wasserstoffreihe gehören. Unter allen denen zur Sauerstoffreihe gehörigen Substanzen ist aber keine einzige, deren entsprechende Complexionen mit denen, welche den Substanzen der Wasserstoffreihe zugehören, verwandt wäre; ehe daher eine größere Anzahl näherer Pflanzenbestandtheile der Analyse unterworfen worden, läßt sich über die Verwandtschaften zwischen den Pflanzenkörpern durchaus nichts bestimmtes sagen.

E r l a n g e n,

gedruckt mit Junge'schen Schriften.

Nees von Esenbeck, Christian Gottfried Daniel, / Bischof, Gustav, / Rothe,
Heinrich August,

Die Entwicklung der Pflanzensubstanz physiologisch, chemisch und
mathematisch dargestellt mit combinatorischen Tafeln der möglichen
Pflanzenstoffe und den Gesetzen ihrer stöchiometrischen Zusammensetzung

Erlangen 1819

4 Phyt. 96 m

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10229584-1